

Аннотация

1. Охрана репродуктивного здоровья женщины, в том числе и во время гестационного процесса, является основой профилактики преждевременного прерывания беременности.

2. Преждевременные роды относятся к основным видам акушерской патологии и продолжают оставаться главной причиной перинатальной и младенческой заболеваемости и смертности. В связи с тем, что 60-70% неонатальной заболеваемости и смертности и финансовых затрат на лечение связано с преждевременными родами до 37 недель беременности. Понимание причин и разработка эффективных методов ведения беременных с угрозой невынашивания является насущной медико-социальной проблемой.

3. Аспирант Контлокова Олеся Рамазановна, профессор Рыжков Валерий Владимирович, д.м.н. Урвачева Екатерина Евгеньевна.

4. Комплексное бюджетное и ОМС финансирование средствами: ГБОУ ВПО «Ставропольский государственный медицинский университет МЗ РФ», ГБУЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи города Ставрополя», ОАО «Ставропольский краевой клинико-диагностический центр», санаторий «Зори Ставрополя» (г.Пятигорск) и «Пятигорский НИИ курортологии и физиотерапии» ФМБА.

5. Простота, высокая эффективность, возможность повсеместного внедрения.

6. В работе показано, что общей закономерностью в патогенезе невынашивания беременности является стресс.

На основе этого разработан метод системной антистрессовой активационной терапии, включающий адаптогены и санаторно-курортные факторы, используемые в лечении и реабилитации беременных женщин с риском невынашивания беременности.

7. По теме научно-исследовательской работы опубликовано 17 статей, в центральной и местной печати, а также в изданиях, рецензируемых ВАК.