

Клинико-психологическая характеристика родителей подростков, совершивших суицидальную попытку.

Данное исследование соответствует целям и задачам тематики

Психиатрия и зависимости.

Актуальность.

Исходя из данных ВОЗ, ежегодно совершается около 800 тысяч суицидов. В диапазоне от 15 до 44 лет суицид является четвертой причиной смерти в мире. Согласно статистическим данным, в нашей стране происходит 50 самоубийств на 100 тысяч населения в течение года, что является критическим показателем, который к тому же имеет тенденцию к росту. С начала 90-х годов почти вдвое увеличился коэффициент самоубийств среди подростков. Подростковые суициды составляли: 19,8 случаев на 100 тысяч человек в 2005 году, 19,3 случая – в 2006-м, 20,1 – в 2007-м, 19,4 – в 2008-м, 19,8 – в 2009 году. За последние 5 лет частота подростковых суицидов находится на том же уровне. По мнению некоторых исследователей, с 1960 по 2000 год частота суицидов среди подростков в возрасте от 15 до 22 лет увеличилась на 265%. По уровню подростковых самоубийств Россия занимает первое место в мире, так как средний показатель суицидальной активности среди подростков более чем в 3 раза превышает средний показатель в мире.

Нужно учитывать тот факт, что на один заверченный суицид в среднем приходится до 150-200 суицидальных попыток, а вероятность повторной попытки суицида у подростка возрастает в 5-20 раз.

На фоне этих удручающих данных, в нашей стране суицидологическая служба только развивается, а так же не существует четкого определения кризисных стационаров. Так же не существует конкретных алгоритмов работы с подростками, совершившими суицидальную попытку, их родителями. Не разработаны меры превентивной диагностики самоубийств.

Из немногочисленных работ зарубежных и отечественных авторов, известно, что подростки, воспитывающиеся в неблагополучных по наркологическим показателям семьях, имеют повышенный риск суицидальной активности. Имеющиеся исследования носят констатирующий характер и более глубоких исследований не проводилось. Предполагается, что в «деструктивной» семье не происходит «обучение» детей позитивным паттернам поведения, именно поэтому подростки находят выход в попытке расстаться с жизнью.

Таким образом, затрагиваемые в диссертационном исследовании вопросы являются актуальными и имеют большое медико-социальное значение в контексте как суицидологии, так и наркологической практики.

Научный коллектив.

- профессор кафедры психиатрии РязГМУ, д.м.н. А.В. Меринов,
 - Число публикаций автора в РИНЦ – 37
 - Число публикаций автора с учетом статей, найденных в списках литературы – 40
 - Число цитирований публикаций автора в РИНЦ – 68
 - Суммарное число цитирований автора – 116
 - Число публикаций, процитировавших работы автора – 69
 - Индекс Хирша - 5
- очный аспирант кафедры психиатрии РязГМУ А.В. Лукашук

Финансовая модель.

Работа несет огромную медико-социальную значимость. Исследование этих аспектов стабилизирует социальную обстановку в стране. Поскольку будущее нашей страны находится в руках молодежи, принципиальное значение имеет ее психологическая гармония, а так же улучшение демографической ситуации. Конечной целью исследования является создание психотерапевтических алгоритмов работы с подростками и их родителями, то это поспособствует улучшению семейного фона на более благополучный, существенно повысит здоровье нации, что в свою очередь снизит расходы государства по многим аспектам. Сроки проведения полноценного исследования с 2014 по 2017 годы.

Инновационность.

Тематика проекта конкурентоспособна, так как таких глубоких исследований не проводилось и все данные, которые мы имеем, носят констатирующий характер.

- Впервые будет изучена клиническая характеристика родителей детей, совершивших суицидальную попытку;
- Впервые будет изучена личностно-психологическая характеристика родителей детей, совершивших суицидальную попытку;
- Впервые с учетом полученных данных будут разработаны прицельные конкретные точки психотерапевтического воздействия на функционирование семьи, столкнувшейся с такой проблемой;
- Впервые будут определены возможные «угрожающие» характеристики родителей по суицидальному риску их детей.

Ожидаемые результаты: в результате исследования предполагается расширить наше представление о значении родительских фигур в возникновении и формировании суицидальных попыток и выявить наиболее значимые для терапии точки психотерапевтического воздействия.

Возможная область применения: суицидология, наркология, психиатрия.

Формы внедрения: статьи, доклады на конференциях, методические указания.

Ожидаемая медико-социальная эффективность: предполагается, что результатом работы будет выяснение конкретных характеристик родителей подростков с суицидальной попыткой в анамнезе. Соответственно по этим характеристикам можно будет оценить степень суицидального риска их детей и понять направление психотерапевтической коррекции семейного функционирования.

Социальное значение: поскольку будущее нашей страны находится в руках молодежи, принципиальное значение имеет ее психологическая гармония, а так же улучшение демографической ситуации

Информация о профильных публикациях.

1. Меринов А.В., Шустов Д.И., Васяткина Н.Н. Эпискрипт как вариант внутрисемейной динамики аутоагрессивных паттернов в семьях мужчин, страдающих алкогольной зависимостью / А.В. Меринов, Д.И. Шустов, Н.Н. Васяткина // Суицидология. – 2012. - № 1. – С. 28-39
2. Меринов А.В., Шустов Д.И., Федотов И.А. Суицидологические и личностно-психологические особенности девушек, выросших в семьях, где родитель страдал алкогольной зависимостью // Психическое здоровье. - 2011. - № 5 (60). - С. 53-55
3. Меринов А.В., Шустов Д.И., Федотов И.А. Суицидологические и личностно-психологические особенности юношей, выросших в семьях, где родитель страдал алкогольной зависимостью // Психическое здоровье. - 2011. - № 4 (59). - С. 48-50
4. Меринов А.В. Суицидологические характеристики молодых людей, воспитанных в семьях, где родитель страдал алкогольной зависимостью / А.В. Меринов // Суицидология. – 2012. - № 4. – С. 22-28