## Cuestionario tipo test - MF0490\_3 - Capítulo 4

1.	¿Qué es una métrica en el contexto de indicadores?
<b>V</b>	<ul> <li>a) Un objetivo específico.</li> <li>b) Una forma de calcular el tiempo.</li> <li>c) Una cantidad que mide características cuantitativas.</li> <li>d) Un tipo de informe financiero.</li> </ul>
2.	¿Cuál de los siguientes no es un paso básico para crear un indicador?
٧	<ul> <li>a) Validar los indicadores con criterios técnicos.</li> <li>b) Establecer áreas de desempeño irrelevantes.</li> <li>c) Comunicar los resultados del indicador.</li> <li>d) Señalar la fuente de los datos.</li> </ul>
3.	¿Qué diferencia hay entre medidas cualitativas ordinales y nominales?
<b>\</b>	<ul> <li>a) Las ordinales no se pueden clasificar.</li> <li>b) Las nominales no tienen orden lógico.</li> <li>c) Las nominales siempre son numéricas.</li> <li>d) Las ordinales son subjetivas.</li> </ul>
4.	¿Qué parte de un indicador corresponde a 'la fórmula utilizada para obtener los datos'?
<b>/</b>	a) Periodicidad. b) Modo de cálculo. c) Fuente de los datos. d) Definición.
5.	¿Qué característica no pertenece a los objetivos SMART?
<b>V</b>	a) Medible. b) Alcanzable. c) Costoso. d) Relevante.
6.	¿Cuál es un valor umbral típico?
<b>~</b>	<ul> <li>a) 50 procesos por hora como máximo.</li> <li>b) Valor inferior que refleja necesidad de mejora.</li> <li>c) Valor sin utilidad para el análisis.</li> <li>d) Meta esperada sin base comparativa.</li> </ul>

- 7. ¿Qué definición corresponde a los límites legales de un umbral?
  - a) Valores ideales esperados por la organización.
  - b) Valores insuficientes para evaluar.
- √c) Valores definidos por la normativa.
  - d) Objetivos anuales internos.
- 8. ¿Cuál de las siguientes acciones no es recomendable al analizar resultados de indicadores?
  - a) Proponer mejoras.
  - b) Analizar causas.
  - c) Comparar valores con metas.
  - √d) Ignorar desviaciones detectadas.