+ Facultad de Ciencias Puras - UMSA



Datos personales	Número de matrícula
Apellidos:	
Nombre:	
Firma:	2
	3
Controlado	4
	5
Este campo no se debe modificar.	6
Tipo Identificación del examen(EST-145)	
110 21032900019	
Marque de una forma clara. Ejemplo: No marcado:	
Este examen será corregido por un sistema automatizado	
la hoja. Para marquear, por favor use un bolígrafo azul o	negro.
Solo las marcas legibles y bien posicionadas serán ev	aluadas.
Respuestas 1 - 10	
a b c d e 1	
3	
5 [] [] []	
6 🔲 🔲 🔲 🔲	
7 🔲 🔲 🔲 🔲	
8	
9	
10	
a b c d e	

- 1
- 1. *(3 puntos)* Debe responder de forma correcta todas las sentencias para que la pregunta sea considerada correcta. Determine la veracidad de las siguientes sentencias:
 - a) Para el caso continuo $\int_{Rx} f(x,y) dx = f(y)$
 - b) f(x,y) = f(x) * f(y) siempre
 - c) Para el caso continuo $\int_{Rx} f(x,y)dx = f(x)$
 - d) Si dos variables aleatorias X, Y son independientes, entonces cov(x, y) = 0
 - e) Para el caso discreto si la variable X toma 6 valores y la variable Y toma 9 valores, entonces su distribución conjunta tiene 55 combinaciones
- 2. *(3 puntos)* Sea (X,Y) va continuas definidas ambas para los reales positivos, con función de densidad:

$$f(x,y) = \frac{1}{4}(x+y)xye^{-x-y}$$

La marginal f(x) es:

- a) Falta información
- b) $f_X(x) = \frac{x^2 + 2x}{4}e^{-x}$
- c) Ninguna
- d) $f_X(x) = \frac{x^2 + x}{4}e^{-x}$
- e) $f_X(x) = \frac{x^2 + 2x}{4}e^x$
- 3. *(3 puntos)* Sean dos variables aleatorias X, Y independientes, con E[X] = 8, E[Y] = 3, E[X,Y] = 29, la covarianza es:
 - a) -5
 - b) 24
 - c) Ninguna o la información dada es incorrecta
 - d) Falta información
 - e) 53
- 4. (3 puntos) Para la siguiente tabla de probabilidad conjunta, calcule la esperanza de X

- a) 1.68
- b) Falta información
- c) Ninguna o la información dada es incorrecta
- d) 1.97
- e) 0.99
- 5. (3 puntos) Dada la función de distribución conjunta:

$$f(x,y) = \frac{x(1+3y^2)}{4}, \quad 0 < x < 2, \quad 0 < y < 1$$

Calcule

$$P(1/4 < X < 1/2|Y = 1/3)$$

- a) 0,17
- **b**) 0
- c) 3/64
- d) 1/3
- e) La función no es una función de probabilidad
- 6. *(3 puntos)* Sea X una va tal que $X \sim \chi^2(v=4)$. Calcular la probabilidad que X se encuentren entre 4 y 17
 - a) 0.5939942
 - b) 0.4040729
 - c) Ninguna
 - d) Falta información
 - e) 0.9980671
- 7. *(3 puntos)* Sea X una va tal que $X \sim t(v=6)$. Calcular la probabilidad que X sea mayor a 2.53
 - a) 0.0223398
 - b) Falta información
 - c) Ninguna
 - d) 0.9988447
 - e) 0.9776602
- 8. *(3 puntos)* Sea X una va tal que $X \sim F(v_1 = 25, v_2 = 25)$. Calcular la probabilidad que X sea 6.2
 - a) 1.0532193 × 10-5
 - b) Falta información
 - c) 0.9999895
 - d) 0.9999895
 - e) Ninguna
- 9. *(3 puntos)* Si $\hat{S_1}^2$ y $\hat{S_2}^2$ representan las varianzas de muestras aleatorias independientes de tamaños $n_1=$ 12 y $n_2=$ 14, tomadas de poblaciones normales con varianzas iguales, calcule: $P(\hat{S_1}^2/\hat{S_2}^2<$ 2.68)
 - a) Ninguna
 - b) 0.9528217
 - c) 0.9892959
 - d) 0.0471783
 - e) Falta información
- 10. (3 puntos) La distribución de alturas de cierta raza de perros terrier tiene una media de 71.14 centímetros y una desviación estándar de 9.3 centímetros; en tanto que la distribución de alturas de cierta raza de poodles tiene una media de 44.89 centímetros con una desviación estándar de 5.36 centímetros. Calcule la probabilidad de que la media muestral de una muestra aleatoria de alturas de 68 terriers exceda la media muestral para una muestra aleatoria de alturas de 68 poodles a lo sumo 26.45 centímetros.
 - a) 0.4389444
 - b) 1.1221111
 - c) 0.5610556
 - d) Información insuficiente
 - e) Ninguna