Facultad de Ciencias Puras - UMSA



Examen Final. ESTADISTICA - II (b). Lic. Chirino 2021-06-16

Datos personales	Número de matrícula
Apellidos:	
Nombre:	
Firma:	2
Controlado	3
Controlado	
Este campo no se debe modificar.	
Tipo Identificación del examen(EST-145)	7 🔲 🔲 🔲 🔲 🖂 7
115 21061600017	
Marque de una forma clara. Ejemplo: X No marcado:] 9
Este examen será corregido por un sistema automatizado	o, por lo que no se ha de arrugar, doblar ni ensuciar
la hoja. Para marquear, por favor use un bolígrafo azul o Solo las marcas legibles y bien posicionadas serán ev	negro. valuadas.
Respuestas 1 - 15	
a b c d e 1	
2 🗌 🗎 🔲	
3	
4	
5	
6	
7 🔲 🗎 🗎 🗎	
9	
12 <u> </u> <u> </u> <u> </u> <u> </u> <u> </u> <u> </u> 13 <u> </u> <u> </u> <u> </u> <u> </u> <u> </u> <u> </u>	
14	
15	
a b c d e	

- 1. *(2 puntos)* Debe responder de forma correcta todas las sentencias para que la pregunta sea considerada correcta. Determine la veracidad de las siguientes sentencias:
 - a) f(x,y) = f(x) * f(y) siempre
 - b) Para el caso continuo $\int_{Rx} f(x,y) dx = f(y)$
 - c) Si dos variables aleatorias X, Y son independientes, entonces cov(x, y) = 0
 - d) Para el caso discreto si la variable X toma 4 valores y la variable Y toma 6 valores, entonces su distribución conjunta tiene 25 combinaciones
 - e) Para el caso continuo $\int_{Bx} f(x,y) dx = f(x)$
- 2. (2 puntos) Para la siguiente tabla de probabilidad conjunta, calcule la esperanza de X

```
## x 1 2 3 4
## 1 0.21 0.02 0.03 0.07
## 2 0.20 0.05 0.02 0.06
## 3 0.25 0.05 0.03 0.02
```

- a) 2.04
- b) Ninguna o la información dada es incorrecta
- c) Falta información
- d) 1.01
- e) 1.74
- 3. *(2 puntos)* Sean dos variables aleatorias X, Y, con E[X] = 3, E[Y] = 8, E[X, Y] = 27, la covarianza es:
 - a) 24
 - b) 3
 - c) Falta información
 - d) 51
 - e) Ninguna o la información dada es incorrecta
- 4. *(2 puntos)* Sea X una va tal que $X \sim \chi^2(v=5)$. Calcular la probabilidad que X se encuentren entre 8 y 20
 - a) 0.1549859
 - b) 0.8437644
 - c) 0.9987503
 - d) Falta información
 - e) Ninguna
- 5. (2 puntos) La distribución de alturas de cierta raza de perros terrier tiene una media de 65.68 centímetros y una desviación estándar de 10.43 centímetros; en tanto que la distribución de alturas de cierta raza de poodles tiene una media de 35.19 centímetros con una desviación estándar de 11.76 centímetros. Calcule la probabilidad de que la media muestral de una muestra aleatoria de alturas de 50 terriers exceda la media muestral para una muestra aleatoria de alturas de 44 poodles a lo sumo 31.69 centímetros.
 - a) Ninguna
 - b) 1.3971618
 - c) 0.6985809
 - d) 0.3014191
 - e) Información insuficiente

- 6. *(2 puntos)* Sea X una va tal que $X \sim \chi^2(v=8)$. Calcular la probabilidad que X se encuentren entre 4 y 23
 - a) 0.9966358
 - b) Ninguna
 - c) 0.4363203
 - d) Falta información
 - e) 0.1428765
- 7. (2 puntos) Entre los métodos de momentos y máxima verosimilitud cúal de ellos emplea un proceso basada en comparar las esperanzas con sus equivalentes de la muestra según sus potencias, para en encontrar la estimación
 - a) Depende
 - b) Maxima Verosimilitud
 - c) Ninguno
 - d) Ambos
 - e) Momentos
- 8. *(2 puntos)* La diferencia entre las estimaciones puntuales y las estimaciones por intervalos es:
 - a) Para ambos casos se requiere una muestra aleatoria
 - b) Son exactamente iguales
 - c) Todas
 - d) Las estimaciones puntuales trabajan en base a un margen de error y los intervalos no
 - e) Las estimaciones por intervalos trabajan en base métodos de optimización e igualdad de momentos
- 9. (2 puntos) La media muestral de una muestra tomada de una población normal con desviación estándar de 29, siempre es: (Seleccione una o más de una)
 - a) Un estimador insesgado de la media poblacional
 - b) Todas
 - c) Un estimador sesgado de la media poblacional
 - d) Un estimador insesgado de la media muestral
 - e) Un estimador sesgado de la media muestral
- 10. (2 puntos) una muestra aleatoria de tamaño 49 de una población normal tiene media $\bar{X}=628.59$ y una varianza muestral de $\hat{S}^2=61.72$. Encuentre un intervalo de confianza al 99 % de confiabilidad.
 - a) Ninguna
 - b) Falta información
 - c) 626.3902618, 630.7897382
 - d) 625.6944263, 631.4855737
 - e) 626.7494028, 630.4305972
- 11. (2 puntos) Se extraen muestras aleatorias de tamaños $n_1=n_2=27$ de dos poblaciones normales independientes. Las varianzas muestrales son $\hat{S}_1^2=29.86$ y $\hat{S}_2^2=44.71$. Construye un intervalo de confianza de dos lados del 99 % respecto al cociente de las varianzas de las poblaciones σ_1^2/σ_2^2
 - a) 0.4355622, 2.0934974
 - b) Ninguna
 - c) 0.0471124, 0.3786995
 - d) Falta información
 - e) 0.2355622, 1.8934974

- 12. (2 puntos) Los intervalos de confianza para la proporción usa los siguientes supuestos:
 - a) n es grande
 - b) Falta información
 - c) Se usa el parámetro P para el error estándar del intervalo
 - d) Los datos son normales
 - e) Ninguna
- 13. (2 puntos) Se está estudiando el rendimiento de un proceso químico. De la experiencia previa se sabe que la varianza del rendimiento con este proceso es 5. Los últimos diez días de operación de la planta han dado como resultado los siguientes rendimientos (en porcentajes):
 - **##** [1] 93.52 87.80 87.56 87.82 89.21 90.84 87.25 88.16 92.02 93.54

¿Hay razón para creer que el rendimiento es menor al 89 %? (asuma un error de tipo I del 1 %)

- a) No se rechaza H0
- b) Ejercicio mal planteado
- c) Ninguna
- d) Falta información
- e) Se rechaza H0
- 14. (2 puntos) Seleccione los criterios correctos para controlar los errores de tipo I y de tipo II
 - a) Todas
 - b) El error de tipo I reduce con una muestra más grande
 - c) El error de tipo I y II se fijan al momento de calcular el tamaño de muestra para la prueba
 - d) El error de tipo II reduce con una muestra más grande
 - e) Una vez obtenido la muestra no es posible controlar el error de tipo I
- 15. *(2 puntos)* Seleccione los supuestos correctos para la prueba de hipótesis de igualdad de dos varianzas
 - a) Las variables de las dos poblaciones se distribuyen como normal
 - b) Las variables de las dos poblaciones se distribuyen como chi cuadrado
 - c) La estadística de prueba se distribuye como una F de Fisher
 - d) Las variables de las dos poblaciones se distribuyen como t student
 - e) El tamaño de muestra de ambas poblaciones son iguales