### 1. Problem

Se tienen los salarios de un grupo de 20 trabajadores para el 2020, distribuidos como:

- ## Grupo 1: 2508 2500 2518 2124 2613 1921 2153 2810 2751 2629
- ## Grupo 2: 3168 5202 4319 4900 4343 3791
- ## Grupo 3: 8457 6647 7906 6150

Si se decide hacer un incremento para el 2021 de 400Bs a todos y además incrementar al salario 2020 en 18%. ¿Cuál es el promedio esperado para 2021 de estos 20 trabajadores?

- (a) 3970.5
- (b) 20
- (c) 4370.5
- (d) 5085.19
- (e) 4685.19

#### Solution

## [1] 5085.19

Se usa la propiedad:

$$\bar{x}_{2021} = \bar{x}_{2020} * 1.18 + 400$$

## 2. Problem

¿Qué clase de variable se define como una variable numérica numerable (se puede contar)?

- (a) Cualitativa ordinal
- (b) Cuantitativa continua
- (c) Cualitativa discreta
- (d) Cuantitativa discreta
- (e) Cualitativa nominal

## Solution

- (a) NO
- (b) NO
- (c) NO
- (d) SI
- (e) NO

#### 3. Problem

Cuando se envían mensajes codificados, estos aveces presentan errores de transmisión. En particular, la clave Morse usa puntos "." y rayas "-". Suponga que ocurren en una proporción de 7:2 (punto:raya). Suponer que la interferencia sobre la transmisión ocurre con una probabilidad 1/12 tanto para puntos como para rayas. Calcular:

$$P(Enviar \quad punto/recibio \quad punto)$$

Nota: (a:b) puede tomarse como  $P(a) = \frac{a}{a+b}$ ,  $P(b) = \frac{b}{a+b}$ 

Determinar cual es el valor correcto entre:

- (a) 0.975
- (b) 0.111
- (c) 0.778
- (d) 0.713
- (e) 0.731

#### Solution

Sean los eventos ep: se envio punto, er: se envio raya, rp: se recibio punto, rr: se recibio raya. Como información se tiene: P(ep) = 0.7777778, P(er) = 0.2222222, la interferencia se puede entender como los casos en que se envia punto pero se recibe raya, o se envia raya y se recibe punto, así P(rp/er) = P(rr/ep) = 1/12, tener en cuenta P(rp/ep) = 1/12 como complemento de P(rr/ep). Se pide:

$$P(ep/rp) = \frac{P(ep)P(rp/ep)}{P(rp)} = \frac{P(ep)P(rp/ep)}{P(ep)P(rp/ep) + P(er)P(rp/er)}$$

Así, P(ep/rp) = 0.9746835

### 4. Problem

Al responder una pregunta de alternativas múltiples, un estudiante o bien conoce la respuesta o la adivina. La probabilidad de que el estudiante sepa la respuesta correcta es 0.83 y 0.17 de que termine adivinando. Supongamos que el estudiante que responde adivinando la pregunta tiene una probabilidad de 1/5 de responder la pregunta de forma correcta. ¿Cuál es la probabilidad de que el estudiante conozca la respuesta de la pregunta, dado que el responde correctamente?

- (a) 0.864
- (b) 0.034
- (c) 0.961
- (d) 0.17
- (e) 0.83

## Solution

Sean los eventos: C: Conoce la respuesta,  $\sim C$ : No conoce la respuesta, lo adivina. RC: Respuesta correcta,  $\sim RC$ : Respuesta incorrecta.

Se sabe, 
$$P(C) = 0.83$$
,  $P(\sim C) = 0.17$ ,  $P(RC/\sim C) = 1/5$  y  $P(RC/C) = 1$ .

$$P(RC) = P(C)P(RC/C) + P(\sim C)P(RC/\sim C)$$

Así, P(RC) = 0.864.

Se pide:

$$P(C/RC) = \frac{P(C)P(RC/C)}{P(RC)}$$

Así, P(C/RC) = 0.961.

- (a) FALSO
- (b) FALSO
- (c) VERDADERO
- (d) FALSO
- (e) FALSO

#### 5. **Problem**

La probabilidad de 3 jugadores de que conviertan un penal son respectivamente 2/3, 4/5 y 8/10. Si cada uno cobra una unica vez, ¿Cuál es la probabilidad que solo uno de ellos convierta?

- (a) Ninguna
- (b) 28/75
- (c) 2/15
- (d) 1/50
- (e) 1/6

### Solution

- (a) FALSO
- (b) FALSO
- (c) VERDADERO
- (d) FALSO
- (e) FALSO

## 6. Problem

Una urna A contiene 4 bolas rojas y 3 negras, mientras que en la urna B contiene 4 bolas rojas y 6 negras. Si una bola es extraida aleatoriamente de cada urna, ¿cuál es la probabilidad de que las bolas sean del mismo color?

- (a) 12/70
- (b) 28/70
- (c) 4/10
- (d) 1/5
- (e) 1/2

### Solution

- (a) Falso
- (b) Verdadero
- (c) Falso
- (d) Falso
- (e) Falso

#### 7. Problem

En una carrera de la UMSA los estudiantes se dividen en 3 grupos; los acádemicos (25%), los políticos (40%) y el resto (35%). El 2020 se realiza una elección para la dirección de carrera y se obtuvo mediante una encuesta que para el candidato X el 70% de los académicos lo apoyan, el 50% de los políticos y el 40% del resto de los estudiantes. Según la encuesta, que probabilidad de apoyo se espera que tenga el candidato X

- (a) 0.525
- (b) 0.515
- (c) 0.450
- (d) 0.400
- (e) 0.548

### Solution

- (a) FALSO
- (b) VERDADERO
- (c) FALSO
- (d) FALSO
- (e) FALSO

#### 8. Problem

La funcion de probabilidad de una variable aleatoria X es dado por

$$P(X = x) = \frac{C * \lambda^x}{x!}$$

 $x=0,1,2,\ldots$ , donde  $\lambda$  es un número positivo. Encontrar el valor de C:

- (a)  $C = \lambda$
- (b) C = e
- (c)  $C = e^{-\lambda}$
- (d)  $C = e^{\lambda}$
- (e)  $C = -\lambda$

## Solution

- (a) FALSO
- (b) FALSO
- (c) VERDADERO
- (d) FALSO
- (e) FALSO

## 9. **Problem**

Sea X una v.a. con función de distribución acumulada:

$$F(x) = \frac{x}{x+1} \quad ; x \ge 0$$

La función de densidad es:

- (a)  $\frac{1}{(x+1)} + \frac{1}{(x+1)^2}$
- (b)  $\frac{1}{(x+1)^2}$
- (c)  $\frac{x}{(x+1)^2}$
- (d)  $\frac{x}{(x-1)^2}$
- (e)  $\frac{1}{(x-1)^2}$

## Solution

Por definición:

$$f(x) = \frac{dF}{dx} = \frac{1}{(x+1)^2}$$

- (a) FALSO
- (b) VERDADERO
- (c) FALSO
- (d) FALSO
- (e) FALSO

## 10. **Problem**

Juan y Maria juegan el siguiente juego. Juan arroja dos dados legales y Maria le paga k bolivianos, donde k es el producto de los dos números que muestran los dados. ¿Cuánto debe pagar Juan a Maria por cada juego para que este sea parejo?

- (a) 6
- (b) 15
- (c) 7
- (d) 12.25
- (e) 0

Solution

- (a) FALSO
- (b) FALSO
- (c) FALSO
- (d) VERDADERO
- (e) FALSO

# $11. \ \, \textbf{Problem}$

Sea X una v.a. con función generatriz de momentos:

$$M_x(t) = \frac{1}{4} \left( 3e^t + e^{-t} \right)$$

la varianza de X esta definida como:

- (a) 1/2
- (b) 3/4
- (c) 1/4
- (d) 6/7

(e) 2/4

Solution

- (a) FALSO
- (b) VERDADERO
- (c) FALSO
- (d) FALSO
- (e) FALSO

## 12. **Problem**

Sea X una variable aleatoria que denota el número que aparece al lanzar un dado legal. Para la desigualdad de Chebyshev:

$$P(|X - E(X) \ge 2.5|) \le \theta$$

el valor de  $\theta$  es:

- (a) 0.47
- (b) 0.40
- (c) 2.50
- (d) 1.70
- (e) 1/6

Sea  $E[X] = \sum_{x=1}^6 x*1/6 = 3.5, \ E[X^2] = \sum_{x=1}^6 x^2*1/6 = 15.1667.$  Así  $V(X) = 15.1667 - 3.5^2$ 

- (a) VERDADERO
- (b) FALSO
- (c) FALSO
- (d) FALSO
- (e) FALSO