



Álgebra Lineal

Apuntes y Boletines




Vázquez Gómez-Reino, Álvaro

09.04.2026 • v0.1.0 • draft



Contents

1	Espacios Vectoriales	3
2	Aplicaciones Lineales	53
3	Sistemas de ecuaciones lineales	97
4	Determinantes	107
5	Clasificación de endomorfismos	108
6	Boletín 1	109
7	Boletín 3	111



1 | Espacios Vectoriales

Definición 1.1 – Espacio Vectorial

Se dice que un conjunto $V \neq \emptyset$ es un espacio vectorial sobre un cuerpo $(K, +, \cdot)$ o que es un K -espacio vectorial si:

1. En V está definida una operación interna aditiva denotada por $+$ de modo que $(V, +)$ es un grupo abeliano.
2. Existe una operación externa llamada producto de escalares por vectores:

$$\begin{aligned} K \times V &\longrightarrow V \\ (\alpha, v) &\rightsquigarrow \alpha \cdot v \end{aligned} \quad (1)$$

Tales que, para todo $v, w \in V$ y $\alpha, \beta \in K$, tenemos:

$$\begin{aligned} (\alpha + \beta) \cdot v &= \alpha v + \beta v \\ \alpha(v + w) &= \alpha v + \alpha w \\ \alpha(\beta v) &= (\alpha\beta)v \\ 1_K \cdot v &= v \end{aligned} \quad (2)$$

Idea


$$K \text{ cuerpo} \iff \begin{cases} (K, +) \text{ abeliano} \\ (K \setminus \{0\}) \text{ abeliano} \end{cases} \quad (3)$$

┘

Definición 1.3 – Subespacio vectorial

Sea $U \neq \emptyset$ y $U \subset V$. U es un subespacio vectorial de V si es un espacio vectorial con las operaciones de V :

$$\begin{aligned} \forall u, u' \in U, \quad u + u' &\in U \\ \forall \lambda \in K, \quad \lambda u &\in U \end{aligned} \quad (4)$$



o equivalentemente:

$$\forall \lambda, \mu \in K, \forall u, u' \in U, \quad \lambda u + \mu u' \in U \quad (5)$$

Observación 1.4

Trivialmente, si U es un espacio o un subespacio vectorial, siempre se va a tener:

$$0 \in U \quad (6)$$

┘

Observación 1.5

$$\begin{aligned} K &\text{ es } K\text{-espacio vectorial} \\ K^n &\text{ es } K\text{-espacio vectorial} \\ \mathbb{R}^n &\text{ es } \mathbb{R}\text{-espacio vectorial} \\ K' \leq K, K &\text{ es } K'\text{-espacio vectorial} \end{aligned} \quad (7)$$

┘

Idea

Si V es espacio vectorial sobre K y A es un conjunto:


$$V^A = \{f : A \longrightarrow V : f \text{ es aplicación}\} \quad (8)$$

┘

Idea

Por lo general, en lo que respecta a la notación:

$$\begin{aligned} \lambda \in K, \lambda &\text{ escalar} \\ v \in V, v &\text{ vector} \\ 0 &\text{ vector cero o nulo} \end{aligned} \quad (9)$$



Ejemplo 1.8

Para todo $\lambda, \mu \in K$:

- $\{0\}$ es el subespacio trivial, pues se tiene:

$$\lambda \cdot 0 + \mu \cdot 0 \in \{0\} \quad (10)$$

- $U = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x = 0\}$ es subespacio porque:

$$(0, 0, 0) \in U$$

$$\begin{aligned} \lambda \cdot (0, b, c) + \mu \cdot (0, b', c') &= \\ = (0, \lambda b, \lambda c) + (0, \mu b', \mu c') &= (0, \lambda b + \mu b', \lambda c + \mu c') \end{aligned} \quad (11)$$

- $U = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x + y = 1\}$ se tiene que $U \neq \emptyset$ pero como $0 + 0 \neq 1 \Rightarrow (0, 0) \notin U$ no es un espacio vectorial.

Proposición 1.9

Para todo $\lambda \in K$ y $v \in V$ se verifica:

$$1. \quad \lambda \cdot 0 = 0 = 0 \cdot v \quad (12)$$

$$2. \quad (-\lambda)v = \lambda(-v) = -(\lambda v) \quad (13)$$

$$3. \quad \lambda v = 0 \iff \lambda = 0 \vee v = 0 \quad (14)$$

Demostración 1.10

$$1. \quad \lambda \cdot 0 = \lambda(v - v) = \lambda v - \lambda v = 0 \quad (15)$$


$$\begin{aligned} 2. \quad (-\lambda)v = \lambda(-v) &\iff (-\lambda)v + \lambda v = \lambda(-v) + \lambda v \iff \\ &\iff (-\lambda + \lambda)v = \lambda(-v + v) \iff 0 = 0. \end{aligned} \quad (16)$$

3. « $\implies$ » Supongamos que $\lambda \neq 0$,

$$\lambda v = 0 \Rightarrow \lambda^{-1}\lambda v = \lambda^{-1}0 \Rightarrow v = 0 \quad (17)$$

Por lo contrario, suponiendo que $\lambda = 0$, ya es trivial.

« $\impliedby$ » La demostración es trivial para ambos casos.



Observación 1.11

Sean $\{U_i\}_{i \in I}$ una familia de subespacios de V , entonces

$$\forall i \in I, \bigcap_{i \in I} U_i \text{ es un subespacio} \quad (18)$$

pero

$$\bigcup_{i \in I} U_i \text{ no tiene porque ser un subespacio} \quad (19)$$

┘

Definición 1.12 – Subespacio generado

Sea $S \subset V$, se llama subespacio generado por S o $\langle S \rangle$ al menor subespacio de V que contiene a S

$$\langle S \rangle = \bigcap \{U_i : U_i \text{ es subespacio de } V \wedge S \subset U_i\} \quad (20)$$

Si $\langle S \rangle = U$, luego S es el conjunto de generadores de U .

Cuando $S = \emptyset$, $\langle S \rangle = \{0\}$


Sean $V_1, V_2, \dots, V_n$ K-espacios vectoriales, entonces $V_1 \times V_2 \times \dots \times V_n$ es un K-espacio vectorial y puede operar de la siguiente manera:

Dados $(v_1, v_2, \dots, v_n), (v'_1, v'_2, \dots, v'_n) \in V_1 \times V_2 \times \dots \times V_n$

$$\begin{aligned} (v_1, v_2, \dots, v_n) + (v'_1, v'_2, \dots, v'_n) &= \\ &= (v_1 + v'_1, v_2 + v'_2, \dots, v_n + v'_n) \in V_1 \times V_2 \times \dots \times V_n \\ \lambda \cdot (v_1, v_2, \dots, v_n) &= (\lambda \cdot v_1, \lambda \cdot v_2, \dots, \lambda \cdot v_n) \in V_1 \times V_2 \times \dots \times V_n \end{aligned} \quad (21)$$

Definición 1.13

Sea $S \subset V$, $S \neq \emptyset$. Una combinación lineal de elementos de S es un vector de V de la forma:



$$\langle S \rangle = \left\{ \sum_{i=1}^n \lambda_i \cdot v_i : \lambda_i \in K, v_i \in S, \forall i \in \{1, \dots, n\} \right\} \quad (22)$$

equivalentemente:

$$\lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 + \dots + \lambda_n v_n : \begin{cases} \lambda_i \in K \\ v_i \in S \\ 1 \leq i \leq n \end{cases} \quad (23)$$

Definición 1.14

Diremos que V es un espacio vectorial finitamente generado si tienen un conjunto de generadores finito, es decir, $S \subset V$ es finito y $\langle S \rangle = V$.

Observación 1.15

- Si $S, S' \subset V$ y $S \subset S' \Rightarrow \langle S \rangle \subset \langle S' \rangle$
- Si $S, S' \subset V$:

$$\langle S \rangle = \langle S' \rangle \iff \begin{cases} \langle S \rangle \subset \langle S' \rangle \\ \langle S' \rangle \subset \langle S \rangle \end{cases} \iff \begin{cases} S \subset \langle S' \rangle \\ S' \subset \langle S \rangle \end{cases} \quad (24)$$

Particularmente, si $S \subset V$ y $v, w \in V$, $w \in S$, se verifica

$$\langle S \rangle = \langle S \cup \{w\} \rangle \iff w \in \langle S \rangle \quad (25)$$


idem

$$\langle S \rangle = \langle S \setminus \{w\} \rangle \iff w \in \langle S \setminus \{w\} \rangle \quad (26)$$

generalmete, $0 \in S$, así

$$\langle S \rangle = \langle S \setminus \{0\} \rangle. \quad (27)$$

- Si $U, W \leq V$, $W + U$ es el menor subespacio de V que contiene a U y W , por lo tanto



$$U + W = \langle U \cup W \rangle. \quad (28)$$

- Sin $U = \langle S \rangle$ y $W = \langle T \rangle \leq V$, entonces

$$U + W = \langle S \cup T \rangle. \quad (29)$$

┘

Definición 1.16 – Suma directa

Sean U y W subespacios de V . Llamamos suma directa de U y W a su subespacio suma si su intersección es $\{0\}$. Es decir

$$U \cap W = \{0\} \Rightarrow U \oplus W \quad (30)$$

Definición 1.17 – Subespacios suplementarios

Se dice que U y W son suplementarios si

$$U \oplus W = V \quad (31)$$

o para una familia arbitraria de $\{U_i\}_{i \in I}$


$$\bigoplus_{i \in I} U_i = V \Leftrightarrow U_i \cap \left[\sum_{j \neq i} U_j \right] = 0 \quad (32)$$

Teorema 1.18

Si existe $U \oplus W$, todo vector de $U + W$ se puede escribir de forma única como $u + w$ con $u \in U$ y $w \in W$

Demostración 1.19

Sean $u, u' \in U$ y $w, w' \in W$ tales que $\exists U \oplus W$, luego



$$\begin{aligned}
 u + w = u' + w' &\Rightarrow u - u' (\in U) = w - w' (\in W) \Rightarrow \\
 &\Rightarrow \left. \begin{aligned} u - u' = w - w' &\in U \cap W \\ W \cap U = 0 \end{aligned} \right\} \Rightarrow \\
 \Rightarrow \begin{cases} u - u' = 0 \\ w - w' = 0 \end{cases} &\Rightarrow u - u' + w - w' = 0 \Rightarrow u + w = 0 \Rightarrow \\
 &\Rightarrow u = 0 = w = u' = w'
 \end{aligned} \tag{33}$$

■

Definición 1.20

Sean V y V' K -espacios vectoriales. Se dice que la aplicación $f : V \rightarrow V'$ es un aplicación lineal si se verifica:

$$1. \quad f(u + v) = f(u) + f(v) \tag{34}$$

$$2. \quad f(\lambda \cdot u) = \lambda \cdot f(u) \tag{35}$$

Esta aplicación es también un homomorfismo de espacios vectoriales ($V \rightarrow V'$)

Ejemplo 1.21

- Para cualquier espacio vectorial existe la identidad:

$$\text{id}_V : V \rightarrow V, \quad \text{id}_V(v) = v, \quad \forall v \in V \tag{36}$$

que es lineal.

- Para f, g aplicaciones lineales tal que que existe $g \circ f$, entonces la composición es lineal.


┘

Observación 1.22

Para cualquier f lineal, se cumple:

$$\bullet \quad f(0) = 0 \tag{37}$$

$$\bullet \quad f(-v) = -f(v) \tag{38}$$



Proposición 1.23

Sea $f : V \rightarrow V'$ es un aplicación lineal

1. Si U es un subespacio de V , entonces $f(U) = \{f(u) : u \in U\}$ es un subespacio de V' . También, si $U = \langle S \rangle$, se cumple $f(U) = \langle f(S) \rangle$.
2. Si W es un subespacio de V' , entonces $f^{-1}(W)$ es subespacio de V .

Demostración 1.24

1. Sabemos que $f(U) \subset V'$, ya que, por lo menos, $f(0) = 0$

$$\begin{aligned} \forall f(u), f(u') \in f(U), \quad f(u) + f(u') &= f(u + u') \in f(U), \\ \forall \lambda \in K, \forall f(u) \in f(U), \quad \lambda f(u) &= f(\lambda u) \in f(U) \end{aligned} \quad (39)$$

2. Es análogo.

Definición 1.25

Sea $f : V \rightarrow V'$ una aplicación lineal.

Se llama imagen de f , y se denota por $\text{Im}(f)$, al subespacio $f(V)$ de V' , es decir,


$$\text{Im}(f) \stackrel{\text{def}}{=} \{f(v) : v \in V\} \quad (40)$$

Se llama núcleo o Kernel de f , y se denota por $\text{Ker}(f)$, al subespacio $f^{-1}(\{0\}) \subset V$, es decir,

$$\text{Ker}(f) \stackrel{\text{def}}{=} \{v \in V : f(v) = 0\} \quad (41)$$

Proposición 1.26

Sea $f : V \rightarrow V'$ una aplicación lineal.



1. f es inyectiva $\Leftrightarrow \text{Ker}(f) = 0$
2. f es sobreyectiva $\Leftrightarrow \text{Im}(f) = V'$

Demostración 1.27

1. « $\Rightarrow$ » Si $v \in \text{Ker}(f)$, $f(v) = 0$. Como es lineal, $f(0) = 0$ y f es inyectiva, se debe tener que $v = 0$ y $\text{Ker}(f) = \{0\}$
- « $\Leftarrow$ » Sean $u, v \in V$ tales que $f(u) = f(v)$, es decir, $f(u - v) = 0$ o, equivalentemente, $u - v \in \text{Ker}(f)$, por lo que $u = v$, y en consecuencia f es inyectiva.
2. Es trivial.

Definición 1.28 – Isomorfismo

Una aplicación lineal $f : V \rightarrow V'$ se dice que es un isomorfismo cuando es biyectiva. Si además $V = V'$ se dice que es un automorfismo de V .

Idea


V y V' son isomorfos ($V \cong V'$) si existe $f : V \rightarrow V'$ isomorfismo

Observación 1.30

No tiene por qué ser:

$$\left. \begin{array}{l} V \cong V' \\ f : V \rightarrow V' \text{ linear} \end{array} \right\} \not\Rightarrow f \text{ isomorfismo} \quad (42)$$

Proposición 1.31



f isomorfismo $\iff f^{-1}$ isomorfismo

Definición 1.32

Si V es un K -espacio vectorial y U un subespacio de V , U define en V la siguiente relación de equivalencia:

Dados $v, v' \in V$:

$$v \sim v' :\Leftrightarrow v - v' \in U \quad (43)$$

Así:

$$\begin{aligned} [v] &= \{v' \in V : v \sim v'\} = \{v' \in V : v - v' \in U\} = \\ &= \{v' \in V : [\exists u \in U : v' = v + u]\} = \{v + u : u \in U\} \end{aligned} \quad (44)$$

Al conjunto de clases de se le denota V/U

Ejemplo 1.33


Este concepto se puede interpretar como una laminación infinita del espacio V mediante traslaciones del subespacio U . Si consideramos el $\mathbb{R}$ -espacio vectorial $V = \mathbb{R}^2$ y el subespacio $U = \{(x, 0) : x \in \mathbb{R}\}$, el subespacio U correspondería con el eje de abscisas en $\mathbb{R}^2$, luego cada una de las clases de equivalencia como se define mediante:

$$x \sim y :\Leftrightarrow x - y \in U \quad (45)$$

Es decir, cada clase contiene todos los vectores que difieren de x en algo que está dentro de U .

- Por lo tanto, una clase de equivalencia es U mismo (la del 0).
- Las demás son traslaciones de U por vectores de V

Luego V sería laminado en todas las rectas horizontales del plano, pues para cualquier $x = (a, b)$ e $y = (c, d)$, para que $(a, b) - (c, d) \in U$, necesariamente $b - d = 0 \Rightarrow b = d$.



Por lo que cada $b \in \mathbb{R}$ tal que $\{(x, b) : x \in \mathbb{R}\}$ tendrá su propia clase de equivalencia que traslada la recta horizontal con altura b .

- $b = 0 \rightarrow$ el propio subespacio U ,
- $b = 1 \rightarrow$ otra recta,
- $b = 2 \rightarrow$ otra,
- $b = \pi \rightarrow$ otra,
- etc.




Figura 1 - Representación gráfica de las clases de equivalencia de V/U

┘

Proposición 1.34

V/U es espacio vectorial, para todo $v + U \in V/U$, se tiene


$$\begin{aligned} \forall v' \in V, \quad v' + U \in V/U \quad (v + U) + (v' + U) &= v + v' + U \\ \forall \lambda \in K, \quad \lambda(v + U) &= \lambda v + U. \end{aligned} \quad (46)$$

Demostración 1.35

Sea

$$\begin{aligned} V/U \times V/U &\longrightarrow V/U \\ (v + U, v' + U) &\rightsquigarrow v + v' + U \end{aligned} \quad (47)$$

luego



$$\left. \begin{array}{l} v + U = u + U \\ v' + U = u' + U \end{array} \right\} \Rightarrow (v + U) + (v' + U) \stackrel{?}{=} (u + U) + (u' + U) \Leftrightarrow \quad (48)$$

$$\Leftrightarrow (v + v') + U \stackrel{?}{=} (u + u') + U \Rightarrow$$

$$\Rightarrow (v + v') - (u + u') \in U \Rightarrow (v + v') + (u + u') = \quad (49)$$

$$= v - u + v' - u' \in U$$

Por lo que la suma está bien definida.

El producto es análogo.

■

Definición 1.36

La aplicación de paso al cociente

$$\begin{aligned} \pi : V &\longrightarrow V/U \\ v &\rightsquigarrow v + U \end{aligned} \quad (50)$$

es lineal y sobreyectiva. Entonces,

$$\text{Ker}(\pi) = \{v \in V : \pi(v) = [0]\} = \{v \in V : v + U = 0\} = U \quad (51)$$

Idea


Retomando el Ejemplo 45, se puede apreciar fácilmente de qué manera la ausencia de translación del subespacio U es el propio subespacio, por eso este coincide con el $\text{Ker}(\pi)$.

Dicho de otra manera, los únicos vectores de V que difieren 0 de U son los que pertenecen a U .

┘

Proposición 1.38

Sea $f : V \longrightarrow V'$ una aplicación lineal,



$$\begin{aligned} v \sim_f u &\Leftrightarrow f(v) = f(u) \Leftrightarrow f(v) - f(u) = 0 \Leftrightarrow f(v - u) = 0 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow v - u \in \text{Ker}(f) \Leftrightarrow v \sim_{\text{Ker}(f)} u \end{aligned} \quad (52)$$

luego

$$V / \sim_f = V / \text{Ker}(f) \quad (53)$$

Idea

Como dos elementos están relacionados si y solo si sus imágenes son iguales, entonces cada clase de equivalencia de $V / \sim_f$ se corresponde con los elementos de V que tienen la misma imagen, es decir, con los elementos de V que difieren en algo que está dentro del $\text{Ker}(f)$.

Por lo tanto, cada clase de equivalencia de $V / \sim_f$ es una translación del subespacio $\text{Ker}(f)$ y, finalmente, $V / \sim_f = V / \text{Ker}(f)$.

┘

Proposición 1.40


Sean los factores canónicos de la aplicación f :

$$\left. \begin{array}{l} f_1 \text{ aplicación sobreyectiva} \\ f_2 \text{ aplicación biyectiva} \\ f_3 \text{ aplicación inyectiva} \end{array} \right\} \Rightarrow f_3 \circ f_2 \circ f_1 = f \quad (54)$$

equivalentemente,

$$\begin{aligned} V &\xrightarrow{f_1} V / \text{Ker}(f) \xrightarrow{f_2} f(V) \xrightarrow{f_3} V' \\ v &\rightsquigarrow v + \text{Ker}(f) \rightsquigarrow f(v) \rightsquigarrow f(v) \end{aligned} \quad (55)$$

Observación 1.41



Como ya se ha hecho en repetidas ocasiones, quedaría demostrar que f_1, f_2 y f_3 son respectivamente sobreyectivas, biyectivas e inyectivas.

┘

Proposición 1.42

Sean U, W subespacios vectoriales de un K -espacio vectorial V tales que $U \subset W$. Entonces,

$$\frac{V/U}{W/U} \cong V/W \quad (56)$$

Demostración 1.43

Sea

$$\begin{aligned} V/U &\xrightarrow{f} V/W \\ v+U &\rightsquigarrow f(v+U) = v+W \end{aligned} \quad (57)$$

Si $v+U = v'+U$, $v+W \stackrel{?}{=} v'+W$, veamos

$$v+U = v'+U \Leftrightarrow v-v' \in U \subset W \Rightarrow v-v' \in W \Rightarrow v+W = v'+W \quad (58)$$

luego f está bien definida.

¿Es f lineal?

Tenemos que para todo $v \in U$:


$$v'+U \in V/U \begin{cases} f((v+U) + (v'+U)) \stackrel{?}{=} f(v+U) + f(v'+U) \\ f(\lambda(v+U)) \stackrel{?}{=} \lambda f(v+U) \end{cases} \quad (59)$$

Veámoslo para la suma:

$$\begin{aligned} f((v+U) + (v'+U)) &= f(v+v'+U) \stackrel{\text{def}}{=} v+v'+W = \\ &= (v+W) + (v'+W) = f(v+U) + f(v'+U) \end{aligned} \quad (60)$$

Para el producto:

$$f(\lambda(v+U)) = f(\lambda v+U) = \lambda v+W = \lambda(v+W) = \lambda f(v+U) \quad (61)$$



Luego f es lineal.

¿Es f biyectiva?

Para demostrarlo, veremos si es sobreyectiva y inyectiva.

¿Es f sobreyectiva?

Ahora para todo $v + W \in V/W$

$$\exists v + U \in V/U : f(v + U) = v + W \Rightarrow \text{Im}(f) = V/W \quad (62)$$

Luego sí lo es.

¿Es f inyectiva?

$$\begin{aligned} \text{Ker}(f) &= \{v + U \in V/U : f(v + U) = 0\} = \\ &= \{v + U \in V/U : v + W = 0\} \\ &= \{v + U \in V/U : v \in W\} = W/U \end{aligned} \quad (63)$$

Luego por el primer Teorema de Isomorfía

$$\frac{V/U}{\text{Ker}(f)} = \frac{V/U}{W/U} \cong V/W \quad (64)$$

■

Idea

Recordemos que el primer Teorema de Isomorfía decía que siendo $f : A \rightarrow B$ isomorfismo, se cumple

$$A / \text{Ker}(f) \cong B \quad (65)$$


┘

Ejemplo 1.45

Sea $V = \mathbb{R}^3$ y consideremos los subespacios

$$\begin{aligned} W &= \{(x, y, 0) : x, y \in \mathbb{R}\}, \\ U &= \{(x, 0, 0) : x \in \mathbb{R}\}. \end{aligned} \quad (66)$$

Entonces se tiene claramente que $U \subset W \subset V$.



Al cocientar V por U , dos vectores son equivalentes si difieren en un vector de la forma $(x, 0, 0)$. Por tanto cada clase de V/U tiene un representante de la forma $(0, y, z)$, y las clases quedan determinadas por el par (y, z) . Así,

$$V/U \cong \mathbb{R}^2. \quad (67)$$

Consideremos ahora W/U . Sus elementos son clases de vectores de W :

$$(x, y, 0) + U = (0, y, 0) + U. \quad (68)$$

Por lo tanto, bajo la identificación anterior,

$$W/U = \{(y, 0) : y \in \mathbb{R}\} \subset \mathbb{R}^2, \quad (69)$$

que corresponde al subespacio generado por el eje y .

Al formar el cociente $\frac{V/U}{W/U}$, se identifican los pares (y, z) que difieren en un vector de la forma $(y, 0)$, por lo que las clases quedan determinadas únicamente por la coordenada z . En consecuencia,

$$\frac{V/U}{W/U} \cong \mathbb{R}. \quad (70)$$

Por otra parte, al cocientar $V = \mathbb{R}^3$ por el plano W (el plano xy), sólo queda la dirección del eje z , por lo que

$$V/W \cong \mathbb{R}. \quad (71)$$

Así se verifica en este caso que


$$\frac{V/U}{W/U} \cong V/W. \quad (72)$$

┘

Teorema 1.46

Sean U_1 y U_2 subespacios del K -espacio vectorial V , se tiene

$$\frac{U_1 + U_2}{U_1} \cong \frac{U_2}{U_1 \cap U_2} \quad (73)$$



Demostración 1.47

Sea la siguiente descomposición

$$U_2 \xrightarrow{i} U_2 + U_1 \xrightarrow{\pi} \frac{U_1 + U_2}{U_1} \quad (74)$$

tal que $\pi \circ i = f$. Luego f es lineal por ser composición de lineales.

$$\begin{aligned} \text{Ker}(f) &= \{u \in U_2 : f(u) = 0\} = \{u \in U_2 : u + U_1 = 0\} = \\ &= \{u \in U_2 : u + U_1 = U_1\} = \{u \in U_2 : u \in U_1\} = U_1 \cap U_2 \end{aligned} \quad (75)$$

f es sobreyectiva pues

$$\forall u_1 + u_2 + U_1 \in \frac{U_1 + U_2}{U_1}, \quad \exists u_2 \in U_2 : f(u_2) = u_1 + u_2 + U_1 \quad (76)$$

luego

$$\begin{aligned} f(U_2) &= u_2 + U_1, \quad u_1 + u_2 + U_1 = u_2 + U_1, \text{ porque} \\ u_1 - u_2 + u_2 &= u_1 \in U_1 \end{aligned} \quad (77)$$

Por lo tanto,

$$\text{Im}(f) = \frac{U_1 + U_2}{U_1} \quad (78)$$

Y, finalmente, por el primer Teorema de la Isomorfía:

$$U_2 / \text{Ker}(f) \cong \text{Im}(f) \quad (79)$$

Sustituyendo:


$$\frac{U_2}{U_1 \cap U_2} \cong \frac{U_1 + U_2}{U_1} \quad (80)$$

■

Definición 1.48

Sea V un K -espacio vectorial y $S \subset V$. Se dice que S es un conjunto de vectores linealmente independiente (L.I. de ahora en adelante) si:

$$\sum \lambda_i s_i = 0 \quad (\lambda_i \in K, s_i \in S) \Rightarrow \lambda_i = 0 \quad \forall i \in I \quad (81)$$



Definición 1.49

S es linealmente independiente si existe $\sum \lambda_i s_i = 0, \lambda_i \in K, s_i \in S, \lambda_i = 0 \quad \forall^{**} i \in I$ (con algún $\lambda_i \neq 0$)

Idea

S será linealmente dependiente si existen por lo menos dos vectores $v_1, v_2 \in S$ tales que:

$$v_1 = \lambda v_2 \quad (\lambda \in K) \quad (82)$$

┘

Ejemplo 1.51

1. El vector 0 es linealmente dependiente, pues $1 \cdot 0 = 0$ pero $1 = 0$ no se cumple.
2. $0 \in S \Rightarrow S$ linealmente dependiente.
3. Para $S = \{v\}$ es L.I. $\Leftrightarrow v \neq 0$
4. Sea $S = \{v_1, \dots, v_n\}, n \geq 2$, es linealmente dependiente $\Leftrightarrow \exists v_i \in S : v_i \in \langle S \setminus \{v_i\} \rangle$ y en tal caso se da que $\langle S \rangle = \langle S \setminus \{v_i\} \rangle$. Por lo que v_i es «redundante».

Demostración 1.52


4. « $\Rightarrow$ »

Supongamos que $S = \{v_1, \dots, v_n\}$ linealmente dependiente, esto significa que

$$\Rightarrow \exists \lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_n v_n = 0 \text{ con algún } \lambda_i \neq 0 \quad (83)$$

Supongamos que $\lambda_j \neq 0$ luego

La notación « $\forall^$ » significa «para casi todo». Referido a que existe una cantidad finita de elementos que no cumplen la condición



$$\begin{aligned}
 \exists \lambda_j^{-1} \in K &\Rightarrow \lambda_j^{-1}(\lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_n v_n) = \lambda_j^{-1} \cdot 0 = 0 \Leftrightarrow \\
 &\Leftrightarrow \lambda_j^{-1} \lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_j^{-1} \lambda_n v_n = 0 \Leftrightarrow \\
 &\Leftrightarrow v_j = -(\lambda_j^{-1} \lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_j^{-1} \lambda_n v_n) \Rightarrow v_j \in \langle S \setminus \{v_j\} \rangle
 \end{aligned} \tag{84}$$

« $\Leftarrow$ »

Veamos que $v_j = \sum_{(i=1)_{i \neq j}}^n \lambda_i v_i \Rightarrow v_j - \lambda_1 v_1 - \lambda_{j-1} v_{j-1} - \lambda_{j+1} v_{j+1} - \lambda_n v_n = 0$

Luego S es linealmente dependiente.



Proposición 1.53

Sean $S_1 \subset V$, $S_2 \subset V$ tales que $S_1 \subset S_2$ y V es un K -espacio vectorial. Entonces

1. Si S_1 es linealmente dependiente $\Rightarrow S_2$ es linealmente dependiente.
2. Si S_2 es L.I. $\Rightarrow S_1$ es L.I..

Ejemplo 1.54

1. Si $S = \{(1, 2, 0), (0, 0, 1), (3, 5, 4)\} \subset \mathbb{R}^3$. Para verificar la dependencia lineal:

$$\lambda(1, 2, 0) + \mu(0, 0, 1) + \xi(3, 5, 4) = (0, 0, 0) \tag{85}$$


Por lo que si $\exists \lambda, \mu, \xi \in \mathbb{R} \setminus \{0\} \Rightarrow S$ es linealmente dependiente.

2. El conjunto $S = \{v_1, v_2, v_3\}$ es L.I..

¿Es $\{v_1 + v_2 + v_3, v_1 - v_3, v_2 - 2v_3\}$ L.I.?

$$\begin{aligned}
 \lambda(v_1 + v_2 + v_3) + \mu(v_1 - v_3) + \xi(v_2 - 2v_3) &= 0 \Rightarrow \\
 \Rightarrow \lambda v_1 + \lambda v_2 + \lambda v_3 + \mu v_1 - \mu v_3 + \xi v_2 - 2\xi v_3 &= 0 \Rightarrow \\
 \Rightarrow \lambda v_1 + \mu v_1 + \lambda v_2 + \xi v_2 + \lambda v_3 - \mu v_3 - 2\xi v_3 &= 0
 \end{aligned} \tag{86}$$

luego



$$(\lambda + \mu)v_1 + (\lambda + \xi)v_2 + (\lambda - \mu - 2\xi)v_3 = 0 \implies \begin{cases} \lambda + \mu = 0 \\ \lambda + \xi = 0 \\ \lambda - \mu - 2\xi = 0. \end{cases} \quad (87)$$

Resolviendo

$$\mu = -\lambda, \quad \xi = -\lambda \quad (88)$$

Sustituyendo en la tercera:

$$\begin{aligned} \lambda - (-\lambda) - 2(-\lambda) &= 0 \implies \\ \lambda + \lambda + 2\lambda &= 4\lambda = 0 \implies \lambda = 0 \implies \mu = \xi = 0 \end{aligned} \quad (89)$$

Por lo que la única solución posible es

$$\lambda = \mu = \xi = 0 \quad (90)$$

y es L.I..

3. En $\mathbb{R}[X]$, $\{1\}$ es L.I. y $\{1, 2\}$ no lo es.

┘

Definición 1.55

Sea V un K -espacio vectorial y $S \subset V$. Diremos que S es una base de V si y solo si:


- S es L.I.,
- $\langle S \rangle = V$.

Generalmente, se denotará por $\mathcal{B}$.

Proposición 1.56

$$\begin{aligned} \mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_n\} \text{ es base de } V &\Leftrightarrow \\ \forall v \in V, \quad \exists! \lambda_1, \dots, \lambda_n \in K : \quad v &= \lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_n v_n \end{aligned} \quad (91)$$

Idea



Esto quiere decir que para cada elemento de V , solo existe una única forma de ser representado por combinaciones lineales de la base.

┘

Demostración 1.58

« $\Rightarrow$ »

Existencia

Supongamos que $\mathcal{B}$ base de V , luego $\langle \mathcal{B} \rangle = V$ y

$$\left. \begin{matrix} v \in V \\ \langle \mathcal{B} \rangle = V \end{matrix} \right\} \Rightarrow \exists \left. \begin{matrix} \lambda_1, \dots, \lambda_n \in K \\ v_1, \dots, v_n \in \mathcal{B} \end{matrix} \right\} : v = \sum_{i=1}^n \lambda_i v_i \quad (92)$$

Unicidad

Si existe $v = \sum_{i=1}^n \lambda_i v_i = \sum_{i=1}^n \mu_i v_i$ se tiene

$$\sum_{i=1}^n \lambda_i v_i - \sum_{i=1}^n \mu_i v_i = 0 \Rightarrow (\lambda_1 - \mu_1)v_1 + \dots + (\lambda_n - \mu_n)v_n = 0 \quad (93)$$

Pero como $\mathcal{B}$ es linealmente independiente

$$\lambda_1 - \mu_1 = \dots = \lambda_n - \mu_n = 0 \Rightarrow \lambda_i = \mu_i \quad \forall i \in I \quad (94)$$

« $\Leftarrow$ »

Supongamos que $\forall v \in V$

$$\exists! \lambda_1, \dots, \lambda_n \in K : \sum_{i=1}^n \lambda_i v_i, \quad v_i \in \mathcal{B} \quad (95)$$


Por definición $V \subset \langle \mathcal{B} \rangle$. También es claro que $\langle \mathcal{B} \rangle \subset V$, pues $\mathcal{B} \subset V$ y V es un K -espacio vectorial. Por lo tanto $\langle \mathcal{B} \rangle = V$.

Como la combinación lineal de elementos de $\mathcal{B}$ igual a 0 es única, $\mathcal{B}$ es L.I., y por lo tanto es base de V .

■

Ejemplo 1.59

La proposición sobre la unicidad en la base se aprecia fácilmente en $\mathbb{R}^3$ sobre la base canónica, es decir $\mathcal{B} = \{e_1, e_2, e_3\} = \{(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)\}$.



Esta es base pues para todo elemento $v = (x, y, z)$ de $\mathbb{R}^3$ se puede expresar de forma única mediante la combinación lineal de los elemento de $\mathcal{B}$:

$$(x, y, z) = \sum_{i=1}^3 \lambda_i e_i = \lambda_1(1, 0, 0) + \lambda_2(0, 1, 0) + \lambda_3(0, 0, 1) \quad (96)$$

En concreto con $\lambda_1 = x$, $\lambda_2 = y$ e $\lambda_3 = z$.

Además, $\mathcal{B}$ es L.I. pues $(1, 0, 0) \neq k_1(0, 1, 0)$, $(1, 0, 0) \neq k_2(0, 0, 1)$ y $(0, 1, 0) \neq k_3(0, 0, 1)$.

Si $\mathcal{B}$ no fuese L.I., por ejemplo

$$\mathcal{B}_1 = \{(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1), (2, 0, 3)\} \quad (97)$$

que es linealmente dependiente porque $(2, 0, 3) = 2(1, 0, 0) + 3(0, 0, 1)$. Aquí se cumple que $\langle \mathcal{B}_1 \rangle = \mathbb{R}^3$ pero existen elemento que se pueden expresar de más de una manera, por ejemplo $(4, 3, 8) \in \mathbb{R}^3$:

$$\begin{aligned} 4(1, 0, 0) + 3(0, 1, 0) + 8(0, 0, 1) + 0(2, 0, 3) &= (4, 3, 8) \\ 0(1, 0, 0) + 3(0, 1, 0) + 2(0, 0, 1) + 2(2, 0, 3) &= (4, 3, 8) \end{aligned} \quad (98)$$

Por lo que no se cumple la unicidad.

De ser L.I. pero no generar el espacio vectorial, habría elementos de V que no se podrían expresar como combinación lineal de elementos del conjunto, por lo que no sería base.

┘

Proposición 1.60


Son equivalentes

1. S es una base de V ,
2. S es un conjunto minimal de generadores,
3. S es un conjunto maximal de vectores L.I.s.

Demostración 1.61

1. $\implies$ 2.

Sabemos que $\langle S \rangle = V$, si existe $\langle T \rangle = V$ tal que $T \subset S$ ¿ $T = S$?



Suponiendo que $T \neq S \Rightarrow \exists v \in S : v \notin T$, por lo que

$$\left. \begin{array}{l} T \subset S \setminus \{v\} \\ \langle T \rangle = V \end{array} \right\} \Rightarrow \langle S \setminus \{v\} \rangle = V \quad (99)$$

Pero S es L.I., por lo que se da una contradicción.

2. $\Rightarrow$ 1.

Sabiendo que S es conjunto minimal de generadores de V , ¿es S L.I.?

Suponiendo que no lo es, $\exists v \in S : v \in \{S \setminus \{v\}\}$, luego

$$V = \langle S \rangle = \langle S \setminus \{v\} \rangle \quad (100)$$

Lo que se contradice con que S es minimal.

1. $\Rightarrow$ 3.

Sea T L.I. tal que $S \subset T$ ¿ $T = S$?

Si $S \subsetneq T \Rightarrow \exists v \in T : v \notin S$:

$$\left. \begin{array}{l} S \cup \{v\} \subset T \\ T \text{ L.I.} \end{array} \right\} \Rightarrow S \cup \{u\} \text{ L.I.} \quad (101)$$

Pero esto contradice que $\langle S \rangle = V$, luego T es linealmente dependiente.

3. $\Rightarrow$ 1.

Si $\exists v \in V : v \notin \langle S \rangle \Rightarrow \langle S \setminus \{v\} \rangle = \langle S \rangle$, pero $S \cup \{v\}$ sería L.I., lo que contradice que S sea maximal de L.I.s.


El resto de implicaciones se deducen de las anteriores.

■

Corolario 1.62

Si $\mathcal{B}, \mathcal{B}'$ son bases y $\mathcal{B} \subset \mathcal{B}'$ luego se tiene $\mathcal{B} = \mathcal{B}'$

Teorema 1.63



[†] Sea V un K -espacio vectorial tal que $T, L \subset V$ con T L.I. y $\langle L \rangle = V$, luego

$$\exists L_0 \subset L : T \cup L_0 \text{ es base de } V \quad (102)$$

Idea

Recordemos que el Axioma de elección dice que si $\{A_i\}_{i \in I}$ es una familia de conjuntos no vacíos disjuntos dos a dos, entonces existe un conjunto $B \subset \bigcup_{i \in I} A_i$ tal que $B \cap A_i$ tiene exactamente un elemento para cada $i \in I$ (es decir, se puede elegir un elemento de cada A_i). Alternativamente, si $\{A_i\}_{i \in I}$ es una familia de conjuntos no vacíos, entonces $\prod_{i \in I} A_i \neq \emptyset$.

┘

Es equivalente el enunciado del Lema de Zorn.

Idea

Recordemos que el Lema de Zorn dice que si A es un conjunto ordenado no vacío en el que cada cadena tiene una cota superior, entonces A tiene algún elemento maximal.

┘

Demostración 1.66

Queremos buscar un conjunto L.I. que contenga a T y este formado por vectores de L , para ello usaremos el lema de Zorn.


Consideremos

$$\Sigma = \{L' \subset L : T \cup L' \text{ es L.I.}\} \quad (103)$$

ordenado por inclusión $(\Sigma, \subset)$. Se cumple que $\emptyset \in \Sigma$ porque T es L.I., luego $\Sigma \neq \emptyset$.

Sea

[†]Este teorema requiere asumir el Axioma de elección



$$\{L'_\alpha\}_{\alpha \in \Lambda} \quad (104)$$

una cadena en Σ .

Definimos

$$L^* = \bigcup_{\alpha \in \Lambda} L'_{\alpha \in \Lambda} \quad (105)$$

Claramente $L^* \subset L$, ahora queremos probar que $T \cup L^*$ es linealmente independiente.

Por reducción al absurdo, supongamos que no es L.I., entonces existe un subconjunto finito

$$T^* \subset T, \quad L^*_{fin} \subset L^* \quad (106)$$

tal que

$$T^* \cup L^*_{fin} \quad (107)$$

es linealmente dependiente. Pero L^*_{fin} es finito y

$$L^* = \bigcup_{\alpha} L'_{\alpha} \quad (108)$$

por lo que existe un β tal que

$$L^*_{fin} \subset L'_{\beta} \quad (109)$$

(porque la familia es una cadena). Entonces

$$T^* \cup L^*_{fin} \subset T \cup L'_{\beta} \quad (110)$$

luego

$$T \cup L'_{\beta} \quad (111)$$

es linealmente dependiente.


Pero $L'_{\beta} \in \Sigma$, así que debe ser linealmente independiente. Contradicción.

Así que L^* es cota superior de la cadena.

Como toda cadena tiene cota superior, por el lema de Zorn implica que existe

$$L_0 \in \Sigma \quad (112)$$

maximal, es decir que $T \cup L_0$ es L.I. y no se puede añadir ningún vector de L .



$$\langle T \cup L_0 \rangle = V?$$

Supongamos por reducción al absurdo que $T \cup L_0$ no genera a V , como $\langle L \rangle = V$, existe $v \in L$ tal que $v \notin \langle T \cup L_0 \rangle$. Entonces

$$T \cup L_0 \cup \{v\} \quad (113)$$

sigue siendo linealmente independiente. Pero esto significa que

$$L_0 \cup \{v\} \in \sum \quad (114)$$

y

$$L_0 \subsetneq L_0 \cup \{v\} \quad (115)$$

lo que contradice la maximalidad de L_0 . Por lo tanto

$$\langle T \cup L_0 \rangle = V \quad (116)$$

luego es base de V .

■

Ejemplo 1.67

Sea $V = \mathbb{R}^3$, tomemos

$$T = \{(2, 0, 0)\} \quad (117)$$

que es un conjunto linealmente independiente.

Ahora tomemos un L que sea base de V (la canónica):

$$L = \{(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)\} \quad (118)$$

Claramente,


$$\langle L \rangle = \mathbb{R}^3 = V \quad (119)$$

El Teorema 86 afirma que existe $L_0 \subset L$ tal que $T \cup L_0$ es base de V .

Ya tenemos $T = \{(2, 0, 0)\}$ y para formar una base de $\mathbb{R}^3$ necesitamos 3 vectores linealmente independientes, luego podemos añadir, por dos vectores de L :

$$L_0 = \{(0, 1, 0), (0, 0, 1)\} \quad (120)$$

Entonces



$$T \cup L_0 = \{(2, 0, 0), (0, 1, 0), ((0, 0, 1))\} \quad (121)$$

que genera V y es L.I. luego es base de V .

┘

Idea

En otras palabras, el Teorema 86 dice que si tienes algunos vectores independientes, siempre puedes completarlos hasta una base usando vectores de cualquier conjunto generador.

┘

Corolario 1.69

Todo espacio vectorial tiene una base.

Demostración 1.70

Tomando $T = \emptyset$ que es linealmente independiente y $L = V$ tal que $\langle L \rangle = V$. Por el Teorema 86 existe $L_0 \subset V$ tal que

$$T \cup L_0 = L_0 \quad (122)$$


es una base de V .

■

Corolario 1.71

Si V tiene un conjunto de generadores finito, V tiene una base finita

Corolario 1.72



Si U es un subespacio de V , toda base de U puede completarse a una base de V .

Demostración 1.73

Sea $\mathcal{B}$ base de U , entonces $\mathcal{B}$ es linealmente independiente.

Sea $\langle L \rangle = V$, luego

$$\exists L_0 \subset L : \mathcal{B} \cup L_0 \text{ es base de } V \quad (123)$$

■

Definición 1.74

Una operación elemental en el K -espacio vectorial V es cualquiera de las siguientes transformaciones:

1. $v_i \leftrightarrow v_j \quad (i \neq j)$
2. $v_i \mapsto \lambda v_i, \quad (\lambda \in K \setminus \{0\})$
3. $v_i \leftrightarrow v_i + \beta v_j \quad (\beta \in K, i \neq j)$

Teorema 1.75

Si S' es un conjunto obtenido haciendo un número finito de operaciones elementales sobre $S \subset V$, se verifica


$$\langle S \rangle = \langle S' \rangle \quad (124)$$

Demostración 1.76

Tenemos que demostrar que aplicando una operación elemental a un conjunto no cambia el subespacio generado, luego no lo hará si se aplica repetidamente.

1.

Para la operación intercambio de vectores



$$v_i \leftrightarrow v_j \quad (i \neq j) \quad (125)$$

solo se reordenan los vectores del conjunto, por tanto el conjunto de combinaciones lineales posibles no cambia:

$$\langle S \rangle = \langle S' \rangle \quad (126)$$

2.

Para la multiplicación por un escalar no nulo

$$v_i \mapsto \lambda v_i \quad (\lambda \neq 0) \quad (127)$$

Sea

$$S' = (S \setminus \{v_i\}) \cup \{\lambda v_i\} \quad (128)$$

Veamos que son iguales.

$$\langle S' \rangle \subset \langle S \rangle$$

Como λv_i es una combinación lineal de $v_i \in \langle S \rangle$, entonces $\lambda v_i \in \langle S \rangle$.

Luego todo vector generado por S' está en $\langle S \rangle$.

$$\langle S \rangle \subset \langle S' \rangle$$

Como $\lambda \neq 0$,

$$v_i = \frac{1}{\lambda}(\lambda v_i) \quad (129)$$

Por lo tanto $v_i \in \langle S' \rangle$ y cualquier combinación lineal de S pertenece a $\langle S' \rangle$.

Finalmente $\langle S \rangle = \langle S' \rangle$.

3.

Para la suma de un múltiplo de otro vector:

$$v_i \mapsto v_i + \beta v_j \quad (i \neq j) \quad (130)$$


Sea

$$S' = (S \setminus \{v_i\}) \cup \{v_i + \beta v_j\} \quad (131)$$

Veamos que son iguales.

$$\langle S' \rangle \subset \langle S \rangle$$

Se cumple porque $v_i + \beta v_j$ es una combinación lineal de vectores de S .



$$\langle S \rangle \subset \langle S' \rangle$$

Podemos observar que $v_i = (v_i + \beta v_j) - \beta v_j$, como los vectores del lado derecho pertenecen a $\langle S' \rangle$, se tiene

$$v_i \in \langle S' \rangle \quad (132)$$

Por lo que cualquier combinación lineal de S pertenece a $\langle S' \rangle$.

Finalmente, $\langle S \rangle = \langle S' \rangle$.

En conclusión, como cada operación elemental conserva el subespacio generado, si S' se obtiene aplicando un número finito de estas operaciones, entonces en cada paso el subespacio generado se mantendrá igual, por lo que en general, se tendrá:

$$\langle S \rangle = \langle S' \rangle \quad (133)$$

■

Definición 1.77 – Pivote

Sea $K^n \ni v = (\alpha_1, \dots, \alpha_n) \neq 0$. Un pivote de V es un $\alpha_i : \alpha_i \neq 0$ y $\alpha_j = 0 \quad \forall j < i$

Definición 1.78 – Escalonado


El conjunto de vectores $\{v_1, \dots, v_m\} \subset K^n$ está escalonado si se cumple lo siguiente:

1. Los vectores nulos están al final.
2. El pivote de cada vector está a la derecha del pivote de los vectores precedentes.

Todo conjunto de vectores escalonados no nulos es linealmente independiente

Ejemplo 1.79

Implementemos el método de escalonado.



Tenemos $S = \{(2, 3, 4, 1), (1, 1, 1, 1), (2, 3, 5, 0), (1, 0, 1, 0), (1, 0, 3, 5)\}$ y queremos obtener una base del conjunto S . Luego:

$$\begin{array}{l}
(F_{-1}) \quad 2 \ 3 \ 4 \ 1 \rightarrow 1 \ 0 \ 1 \ 0 \rightarrow F_1 \rightarrow 1 \ 0 \ 1 \ 0 \rightarrow \\
(F_{-2}) \quad 1 \ 1 \ 1 \ 1 \rightarrow 1 \ 1 \ 1 \ 1 \rightarrow F_2 - 1F_1 \rightarrow 0 \ 1 \ 0 \ 1 \rightarrow \\
(F_{-3}) \quad 2 \ 3 \ 5 \ 0 \rightarrow 2 \ 3 \ 5 \ 0 \rightarrow F_3 - 2F_1 \rightarrow 0 \ 3 \ 3 \ 0 \rightarrow \\
(F_{-4}) \quad 1 \ 0 \ 1 \ 0 \rightarrow 2 \ 3 \ 4 \ 1 \rightarrow F_4 - 2F_1 \rightarrow 0 \ 3 \ 2 \ 1 \rightarrow \\
(F_{-5}) \quad 1 \ 0 \ 3 \ 5 \rightarrow 1 \ 0 \ 3 \ 5 \rightarrow F_5 - 1F_1 \rightarrow 0 \ 0 \ 2 \ 5 \rightarrow \\
\\
F_1 \rightarrow 1 \ 0 \ 1 \ 0 \rightarrow F_1 \rightarrow 1 \ 0 \ 1 \ 0 \rightarrow \\
F_2 \rightarrow 0 \ 1 \ 0 \ 1 \rightarrow F_2 \rightarrow 0 \ 1 \ 0 \ 1 \rightarrow \\
F_3 - 3F_2 \rightarrow 0 \ 0 \ 3 \ -3 \rightarrow F_3 \div 3 \rightarrow 0 \ 0 \ 1 \ -1 \rightarrow \\
F_4 - 3F_2 \rightarrow 0 \ 0 \ 2 \ -2 \rightarrow F_4 \rightarrow 0 \ 0 \ 2 \ -2 \rightarrow \\
F_5 \rightarrow 0 \ 0 \ 2 \ 5 \rightarrow F_5 \rightarrow 0 \ 0 \ 2 \ 5 \rightarrow \\
\\
F_1 \rightarrow 1 \ 0 \ 1 \ 0 \qquad 1 \ 0 \ 1 \ 0 \\
F_2 \rightarrow 0 \ 1 \ 0 \ 1 \qquad 0 \ 1 \ 0 \ 1 \\
F_3 \rightarrow 0 \ 0 \ 1 \ -1 \qquad 0 \ 0 \ 1 \ -1 \\
F_4 - 2F_3 \rightarrow 0 \ 0 \ 0 \ 0 \rightarrow 0 \ 0 \ 0 \ 3 \\
F_5 - 2F_3 \rightarrow 0 \ 0 \ 0 \ 3 \rightarrow 0 \ 0 \ 0 \ 0
\end{array} \tag{134}$$

Por lo que la base obtenida es $\langle S' \rangle = \{(1, 0, 1, 0), (0, 1, 0, 1), (0, 0, 1, -1), (0, 0, 0, 3)\}$


1

Idea

Para la facilitación en la aplicación de este método, es recomendable colocar los números mas sencillos de operar arriba (como los 1). También resulta mejor evitar las fracciones.

Ejemplo 1.81

Queremos una base a partir de $T = \{(1, 2, 3, 4), (0, 1, 0, 0)\}$ para generar $\mathbb{R}^4$, luego buscamos 4 vectores linealmente independientes.



$$\begin{array}{cccc} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{array} \qquad \begin{array}{cccc} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \qquad (135)$$

Por lo que hemos completado con la canónica, que al estar escalonada, es L.I. y $\langle T^+ \rangle = \mathbb{R}^4$

┘

Teorema 1.82 – Teorema de Steinitz

Sea V un K -espacio vectorial, $\{u_1, \dots, u_n\}$ un conjunto linealmente independiente y sea $\mathcal{B} = \{v_i\}_{i \in I}$ una base de V .

Entonces existen índices $i_1, \dots, i_n \in I$ tales que

$$\left(\mathcal{B} \setminus \{v_{i_1}, \dots, v_{i_n}\} \cup \{u_1, \dots, u_n\} \right) \qquad (136)$$

es una base de V .

Demostración 1.83

Para la demostración de este teorema, procederemos por inducción sobre n (índices de los vectores de V). Por lo tanto:

- Para el caso $n = 1$:

Sea $\mathcal{B} = \{v_i\}_{i \in I}$ una base de V . Como $\mathcal{B}$ genera V , se tiene


$$u_1 = \sum_{i \in I} \lambda_i v_i \qquad (137)$$

tal que $u_1 \neq 0$ (porque el conjunto es independiente). Por esto, existe $i_1 \in I$ tal que $\lambda_{i_1} \neq 0$. Entonces

$$v_{i_1} = \lambda_{i_1}^{-1} u_1 - \sum_{i \in I \setminus \{i_1\}} \lambda_{i_1}^{-1} \lambda_i v_i \qquad (138)$$

Por lo que definimos

$$I_1 = I \setminus \{i_1\} \qquad (139)$$



y

$$\mathcal{B}_1 = \{u_1\} \cup \{v_i\}_{i \in I_1} \quad (140)$$

$$\langle \mathcal{B}_1 \rangle = V?$$

De la igualdad anterior se deduce que $v_{i_1} \in \langle \mathcal{B}_1 \rangle$ y como los demás v_i pertenecen a $\mathcal{B}_1$

$$\mathcal{B} \subset \langle \mathcal{B}_1 \rangle \quad (141)$$

Dado que $\mathcal{B}$ genera V ,

$$\langle \mathcal{B}_1 \rangle = V \quad (142)$$

¿Es $\mathcal{B}_1$ linealmente independiente?

Supongamos que

$$\mu u_1 + \sum_{i \in I_1} \mu_i v_i = 0 \quad (143)$$

Sustituyendo por Ecuación 137 obtenemos

$$\mu \sum_{i \in I} \lambda_i v_i + \sum_{i \in I_1} \mu_i v_i = 0 \quad (144)$$

Extrayendo y separando el término i_1 :

$$\mu \lambda_{i_1} v_{i_1} + \sum_{i \in I_1} (\mu \lambda_i + \mu_i) v_i = 0 \quad (145)$$

Lo que es una combinación lineal de vectores de la base $\mathcal{B}$. Como $\mathcal{B}$ es linealmente independiente,

$$\mu \lambda_{i_1} = 0 \quad (146)$$

y


$$\mu \lambda_i + \mu_i = 0 \quad (i \in I_1) \quad (147)$$

Como $\lambda_i \neq 0$, se deduce

$$\mu = 0 \quad (148)$$

y entonces

$$\mu_i = 0 \quad (149)$$



Por lo que $\mathcal{B}_1$ es linealmente independiente.

Concluyendo así que $\mathcal{B}_1$ es base de V .

- Paso inductivo

Supongamos que el resultado es cierto para $n - 1$ ($n \geq 2$).

Sea $\{u_1, \dots, u_n\}$ un conjunto linealmente independiente.

Por el caso anterior, existe $i_1 \in I$ tal que

$$\mathcal{B}_1 = (\mathcal{B} \setminus \{v_{i_1}\}) \cup \{u_1\} \quad (150)$$

es una base de V .

Aplicando la hipótesis de inducción sobre el conjunto independiente $\{u_2, \dots, u_n\}$ y a la base $\mathcal{B}_1$, existen índices $i_2, \dots, i_n$ tales que

$$(\mathcal{B}_1 \setminus \{v_{i_2}, \dots, v_{i_n}\}) \cup \{u_1, \dots, u_n\} \quad (151)$$

es una base de V .

Sustituyendo $\mathcal{B}_1$ obtenemos

$$(\mathcal{B} \setminus \{v_{i_1}, \dots, v_{i_n}\}) \cup \{u_1, \dots, u_n\} \quad (152)$$

que es base de V .

■

Ejemplo 1.84

Tomemos la base canónica en $\mathbb{R}^3$

$$v_1 = (1, 0, 0), \quad v_2 = (0, 1, 0), \quad v_3 = (0, 0, 1) \quad (153)$$


Supongamos ahora que queremos obtener una nueva base de $\mathbb{R}^3$ tal que contenga $u_1 = (1, 1, 0)$.

Por el teorema de Steinitz podemos sustituir por algún v_n , en este caso por v_1 o v_2 (porque en concreto $u_1 = v_1 + v_2$). Luego al sustituir por v_1

$$\{(1, 1, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)\} \quad (154)$$

Sigue siendo base.

Ahora podemos introducir otro vector independiente



$$u_2 = (0, 1, 1) \quad (155)$$

De la misma manera, podemos sustituir por otro vector de la base, como v_2 , luego

$$\{(1, 1, 0), (0, 1, 1), (0, 0, 1)\} \quad (156)$$

que sigue siendo base.

┘

Idea

Necesariamente, cada uno de los nuevos vectores u_n pertenece al espacio generado por la base original, por lo tanto depende de los vectores de la base. Por lo que se podrán eliminar esos nuevos vectores dependientes de la base.

┘

Corolario 1.86

Sea V un K -espacio vectorial con $\mathcal{B}$ y $\mathcal{B}'$ bases de V , entonces $\mathcal{B}$ y $\mathcal{B}'$ son equipotentes, es decir,

$$|\mathcal{B}| = |\mathcal{B}'| \quad (157)$$

Demostración 1.87

Sean $\mathcal{B} = \{u_1, \dots, u_n\}$ y $\mathcal{B}' = \{v_i\}_{i \in I}$ bases de V . Por ser $\mathcal{B}$ base:


$$\left. \begin{array}{l} \mathcal{B} \text{ es L.I.} \\ \mathcal{B} = \{u_1, \dots, u_n\} \\ \mathcal{B}' \text{ base de } V \end{array} \right\} \text{ por el teorema de Steinitz } \Rightarrow \quad (158)$$

$$\Rightarrow \mathcal{B} = \{u_1, \dots, u_n\} \cup \{v_i\}_{i \in I_n}, \quad (I_n = I - \{i_1, \dots, i_n\})$$

es base de V . Luego

$$\{v_i\}_{i \in I_n} \subset \mathcal{B} \Rightarrow I_n \text{ finito} \Rightarrow I \text{ finito} \Rightarrow \mathcal{B} \text{ es base finita.} \quad (159)$$

$$n = |\mathcal{B}| = |\mathcal{B}'|?$$



Supongamos que $n = |\mathcal{B}|$ y $m = |\mathcal{B}'|$, por Steinitz:

$$\left. \begin{array}{l} \mathcal{B} \text{ L.I.} \\ \mathcal{B}' \text{ es base} \end{array} \right\} \Rightarrow n \leq m \quad (160)$$

y

$$\left. \begin{array}{l} \mathcal{B}' \text{ L.I.} \\ \mathcal{B} \text{ es base} \end{array} \right\} \Rightarrow m \leq n \quad (161)$$

Por lo que $m = n$

■

Observación 1.88

Siendo $\mathcal{B}$ una base de V ,

$$|\mathcal{B}| = \dim(V) \quad (162)$$

┘

Teorema 1.89

Sean V y V' K -espacios vectoriales tales que $\mathcal{B} = \{u_i\}_{i \in I}$ es base de V y $S = \{v_i\}_{i \in I} \subset V'$. Entonces existe una única aplicación lineal

$$f : V \longrightarrow V' \text{ tal que } f(u_i) = v_i \quad (163)$$

Además:


1. f es inyectiva $\Leftrightarrow S$ es linealmente independiente,
2. f es sobreyectiva $\Leftrightarrow \langle S \rangle = V'$,
3. f es isomorfismo $\Leftrightarrow S$ es base de V' .

Idea

Una base determina completamente una aplicación lineal. Como $\forall v \in V$

$$v = \sum_{i \in I} \lambda_i u_i \quad (164)$$

Necesariamente



$$f(v) = \sum_{i \in I} \lambda_i f(u_i) \quad (165)$$

┘

Demostración 1.91

Demostremos primero la existencia de f . Sea $v \in V$

Como $\mathcal{B} = \{u_i\}_{i \in I}$ es base,

$$v = \sum_{i \in I} \lambda_i u_i \quad (166)$$

con $\lambda_i = 0, \quad \forall^* i \in I$. Así definimos

$$f(v) \stackrel{\text{def}}{=} \sum_{i \in I} \lambda_i v_i \quad (167)$$

¿Es f lineal? Sean $v, w \in V$, tales que

$$v = \sum_{i \in I} \lambda_i u_i, \quad w = \sum_{i \in I} \mu_i u_i. \quad (168)$$

Luego

$$v + w = \sum_{i \in I} (\lambda_i + \mu_i) u_i \Rightarrow f(v + w) = \sum_{i \in I} (\lambda_i + \mu_i) v_i, \quad (169)$$

además

$$f(v) + f(w) = \sum_{i \in I} \lambda_i v_i + \sum_{i \in I} \mu_i v_i = \sum_{i \in I} (\lambda_i + \mu_i) v_i, \quad (170)$$

por lo que

$$f(v + w) = f(v) + f(w). \quad (171)$$


Análogamente

$$f(\lambda v) = \lambda f(v) \quad (\forall \lambda \in K). \quad (172)$$

Luego f es lineal.

¿Es f única? Supongamos que existe $g : V \rightarrow V'$ lineal con $g(u_i) = v_i$.

Sea



$$v = \sum_{i \in I} \lambda_i u_i. \quad (173)$$

Entonces

$$g(v) = g\left(\sum_{i \in I} \lambda_i u_i\right) = \sum_{i \in I} \lambda_i g(u_i) = \sum_{i \in I} \lambda_i v_i = f(v). \quad (174)$$

Luego $f = g$.

■

Demostración 1.92

Veamos ahora la equivalencia 1. « $\Rightarrow$ » Supongamos que f es inyectiva, luego si

$$\sum_{i \in I} \lambda_i v_i = 0 \quad (175)$$

entonces

$$\sum_{i \in I} \lambda_i f(u_i) = 0 \Rightarrow f\left(\sum_{i \in I} \lambda_i u_i\right) = 0 \Rightarrow \sum_{i \in I} \lambda_i u_i \in \text{Ker}(f). \quad (176)$$

Por ser f inyectiva

$$\text{Ker}(f) = \{0\} \quad (177)$$

luego

$$\sum_{i \in I} \lambda_i u_i = 0 \quad (178)$$

pero como $\mathcal{B}$ es base,

$$\lambda_i = 0 \quad (179)$$


Por lo que S es linealmente independiente.

« $\Leftarrow$ »

Supongamos que S es linealmente independiente, si $f(v) = 0$ y $v = \sum_{i \in I} \lambda_i u_i$, entonces

$$0 = f(v) = \sum_{i \in I} \lambda_i v_i \quad (180)$$

Como S es L.I., se tiene $\lambda_i = 0$ y por tanto $v = 0$.



Luego

$$\text{Ker}(f) = \{0\} \quad (181)$$

y f es inyectiva.

■

Demostración 1.93

Sigamos con la equivalencia 2.

« $\implies$ »

Si f es sobreyectiva, para todo $y \in V'$ existe $v \in V$ tal que

$$f(v) = y \quad (182)$$

Pero

$$v = \sum_{i \in I} \lambda_i u_i \quad (183)$$

entonces

$$y = f(v) = \sum_{i \in I} \lambda_i v_i \quad (184)$$

Luego y está en el subespacio generado por S , por lo que

$$\langle S \rangle = V' \quad (185)$$

« $\impliedby$ »

Supongamos que

$$\langle S \rangle = V' \quad (186)$$


Sea $y \in V'$. Entonces

$$y = \sum_{i \in I} \lambda_i v_i \quad (187)$$

Tomemos

$$v = \sum_{i \in I} \lambda_i u_i \quad (188)$$

Luego



$$f(v) = \sum_{i \in I} \lambda_i v_i = y \quad (189)$$

Por lo que f es sobreyectiva

■

Demostración 1.94

Sabemos que

$$f \text{ isomorfismo} \iff f \text{ inyectiva y sobreyectiva} \quad (190)$$

Por las equivalencias 1. y 2. esto ocurre cuando S es linealmente independiente y $\langle S \rangle = V'$

■

Ejemplo 1.95

Tomemos $V = V' = \mathbb{R}^2$ y consideremos la base canónica para V .

Definimos $f : V \rightarrow V'$ lineal tal que $f(x, y) = (x, x + y)$, así

$$\begin{aligned} (1, 0) &\rightsquigarrow f(1, 0) = (1, 1) \\ (0, 1) &\rightsquigarrow f(0, 1) = (0, 1) \end{aligned} \quad (191)$$

Cualquier vector $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ se escribe como

$$(x, y) = x(1, 0) + y(0, 1) \quad (192)$$

luego


$$\begin{aligned} f(x, y) &= f(x(1, 0) + y(0, 1)) \Rightarrow \\ \Rightarrow f(x, y) &= xf(1, 0) + yf(0, 1) \Rightarrow \\ \Rightarrow f(x, y) &= x(1, 1) + y(0, 1) \end{aligned} \quad (193)$$

Por lo que se determina completamente la aplicación.

Al ser f inyectiva, $S = \{(1, 1), (0, 1)\}$ es linealmente independiente.

Si hubiesemos considerado $f'(x, y) = (1, x + y)$ que no es inyectiva, se tendría $S' = \{(1, 1), (1, 1)\}$ que es linealmente dependiente.

Por otro lado, como f es sobreyectiva, $\langle (1, 1), (0, 1) \rangle = V' = \mathbb{R}^2$, pero si volvemos a considerar f' , esto tampoco se cumpliría por no ser esta sobreyectiva.



Corolario 1.96

Sea $f : V \rightarrow V'$, se tiene que

$$V \cong V' \iff \dim(V) = \dim(V') \quad (194)$$

Demostración 1.97

« $\implies$ »

Supongamos que existe $f : V \rightarrow V'$ isomorfismo.

Sea

$$\mathcal{B} = \{u_i\}_{i \in I} \quad (195)$$

base de V , luego

$$\mathcal{B}' = \{f(u_i)\}_{i \in I} \quad (196)$$

también base de V' , por lo que se tiene

$$|\mathcal{B}| = |\mathcal{B}'| \Rightarrow \dim(V) = \dim(V') \quad (197)$$

« $\impliedby$ »

Sea $\mathcal{B} = \{u_i\}_{i \in I}$ base de V y $\mathcal{B}' = \{v_i\}_{i \in I}$ base de V' .

Sea $f : V \rightarrow V'$, por el Teorema 122 es isomorfismo.


■

Ejemplo 1.98

Consideremos $f : \mathbb{R}_2[X] \rightarrow \mathbb{R}^3$ tal que $\mathbb{R}_2[X] \cong \mathbb{R}^3$ con

$$a_0 + a_1X + a_2X^2 \rightsquigarrow (a_0, a_1, a_2) \quad (198)$$

podemos pasar de base en base por ser isomorfismo



$$\begin{aligned} 1 &\longrightarrow e_1 \\ X &\longrightarrow e_2 \\ X^2 &\longrightarrow e_3 \end{aligned} \tag{199}$$

luego

$$\dim(\mathbb{R}_2[X]) = \dim(\mathbb{R}^3) \tag{200}$$

┘

Teorema 1.99

Sea $f : V \longrightarrow V'$ una aplicación lineal, luego

$$\dim(\text{Ker}(f)) + \dim(\text{Im}(f)) = \dim(V) \tag{201}$$

Demostración 1.100

Sea

$$\mathcal{B} = \{u_i\}_{i \in I} \tag{202}$$

base de $\text{Ker}(f)$ y

$$\mathcal{B}' = \{u_\alpha\}_{\alpha \in \Lambda} \tag{203}$$

base de $\text{Im}(f)$.

Como $u_\alpha \in \text{Im}(f)$, sabemos que existe $w_\alpha \in V$ tal que $f(w_\alpha) = u_\alpha$.

Así, consideramos el conjunto


$$\{u_i\}_{i \in I} \cup \{w_\alpha\}_{\alpha \in \Lambda} \tag{204}$$

el cual queremos probar que es base de V .

¿Es linealmente independiente?

Supongamos que

$$\sum_{i \in I} \lambda_i u_i + \sum_{\alpha \in \Lambda} \mu_\alpha w_\alpha = 0 \tag{205}$$



Si aplicamos f :

$$0 = f\left(\sum_{i \in I} \lambda_i u_i + \sum_{\alpha \in \Lambda} \mu_\alpha w_\alpha\right) = \quad (206)$$

por linealidad

$$= \sum_{i \in I} \lambda_i f(u_i) + \sum_{\alpha \in \Lambda} \mu_\alpha f(w_\alpha) \quad (207)$$

pero $f(u_i) = 0$ por pertenecer al kernel, entonces

$$0 = \sum_{\alpha \in \Lambda} \mu_\alpha u_\alpha \quad (208)$$

Como $\{u_\alpha\}$ es base de la imagen de f , es linealmente independiente. Luego se tiene que $\mu_\alpha = 0$, $\forall \alpha \in \Lambda$, así

$$\sum_{i \in I} \lambda_i u_i = 0 \quad (209)$$

pero como $\{u_i\}$ es base del kernel de f , entonces $\lambda_i = 0$, $\forall i \in I$.

Por lo tanto es un conjunto linealmente independiente.

¿Genera V ?

Sea $v \in V$, luego $f(v) \in \text{Im}(f)$. Como $\{u_\alpha\}$ es base de la imagen de f :

$$f(v) = \sum_{\alpha \in \Lambda} \lambda_\alpha u_\alpha \quad (210)$$


pero $u_\alpha = f(w_\alpha)$, por lo que

$$f(v) = \sum_{\alpha \in \Lambda} \lambda_\alpha f(w_\alpha) = f\left(\sum_{\alpha \in \Lambda} \lambda_\alpha w_\alpha\right) \quad (211)$$

Luego

$$\begin{aligned} f\left(v - \sum_{\alpha \in \Lambda} \lambda_\alpha w_\alpha\right) &= 0 \Rightarrow \\ \Rightarrow v - \sum_{\alpha \in \Lambda} \lambda_\alpha w_\alpha &\in \text{Ker}(f) \end{aligned} \quad (212)$$

Como $\{u_i\}$ es base del kernel,



$$\begin{aligned}
 v - \sum_{\alpha \in \Lambda} \lambda_{\alpha} w_{\alpha} &= \sum_{i \in I} \mu_i u_i \Rightarrow \\
 \Rightarrow v &= \sum_{\alpha \in \Lambda} \lambda_{\alpha} w_{\alpha} + \sum_{i \in I} \mu_i u_i
 \end{aligned} \tag{213}$$

Entonces

$$\langle \{u_i\}_{i \in I} \cup \{w_{\alpha}\}_{\alpha \in \Lambda} \rangle = V \tag{214}$$

Así, concluimos que

$$\dim(V) = |I| + |\Lambda| \tag{215}$$

tales que

$$|I| = \dim(\text{Ker}(f)), \quad |\Lambda| = \dim(\text{Im}(f)) \tag{216}$$

Por lo que

$$\dim(\text{Ker}(f)) + \dim(\text{Im}(f)) = \dim(V) \tag{217}$$

■

Idea

Podemos interpretar el $\text{Ker}(f)$ como los vectores que se anulan tras la aplicación, luego son las dimensiones perdidas.

Asimismo, podemos interpretar la $\text{Im}(f)$ como las dimensiones que se mantienen tras la aplicación.

El teorema nos dice que

$$\dim(\text{Ker}(f)) + \dim(\text{Im}(f)) = \dim(V) \tag{218}$$


que bajo esta interpretación:

$$\text{dim. perdida} + \text{dim. mantenida} = \text{dim. total} \tag{219}$$

┘

Ejemplo 1.102

Definamos la aplicación lineal



$$\begin{aligned} f : \mathbb{R}^3 &\longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ f(x, y, z) &= (x, y) \end{aligned} \quad (220)$$

Que proyecta todos los puntos sobre el plano xy .

Tenemos que

$$\dim(V) = 3 \quad (221)$$

El kernel de la aplicación son los vectores que se envían al 0, es decir $f(x, y, z) = (0, 0)$, luego $x = 0$, $y = 0$. Por lo tanto son de la forma

$$(0, 0, z) \quad (222)$$

Así

$$\text{Ker}(f) = \{(0, 0, z) : z \in \mathbb{R}\} \quad (223)$$

Una base es $\{(0, 0, 1)\}$, luego

$$\dim(\text{Ker}(f)) = 1 \quad (224)$$

La imagen de la aplicación son todos los valores resultantes de

$$f(x, y, z) = (x, y), \quad (225)$$

que puede obtener cualquier vector de $\mathbb{R}^2$.

Luego

$$\text{Im}(f) = \mathbb{R}^2 \Rightarrow \dim(\text{Im}(f)) = 2 \quad (226)$$

El teorema dice

$$\dim(\text{Ker}(f)) + \dim(\text{Im}(f)) = \dim(V) \quad (227)$$

En este caso


$$1 + 2 = 3 \quad (228)$$

Luego se verifica perfectamente.

┘

Corolario 1.103

Si U es un subespacio de V , se verifica:



$$\dim(U) + \dim(V/U) = \dim(V) \quad (229)$$

Demostración 1.104

Sea $\pi : V \rightarrow V/U$ una aplicación lineal.

Sabemos que

$$\text{Ker}(\pi) = U \quad \text{y} \quad \text{Im}(\pi) = V/U \quad (230)$$

Luego

$$\dim(U) + \dim(V/U) = \dim(V) \quad (231)$$

■

Corolario 1.105

Sea U un subespacio de V , se verifican:

1. $\dim(U) \leq \dim(V)$
2. $\dim(U) = \dim(V) \iff U = V$

Demostración 1.106

1.

Sabemos que

$$\dim(U) + \dim(V/U) = \dim(V) \quad (232)$$

y


$$\dim(V/U) \geq 0 \quad (233)$$

Luego

$$\dim(U) \leq \dim(V) \quad (234)$$

2.

Directamente



$$\begin{aligned}\dim(U) = \dim(V) &\Rightarrow \dim(V/U) = 0 \Rightarrow \\ &\Rightarrow V/U = \{0\} \Rightarrow V = U\end{aligned}\quad (235)$$

■

Teorema 1.107 – Formula de Grassman

Sean U_1, U_2 subespacios vectoriales de V . Se tiene que:

$$\dim(U_1) + \dim(U_2) = \dim(U_1 + U_2) + \dim(U_1 \cap U_2) \quad (236)$$

Demostración 1.108

Por el Teorema 64, sabemos que

$$\frac{U_1 + U_2}{U_1} \cong \frac{U_2}{U_1 \cap U_2} \quad (237)$$

luego

$$\dim\left(\frac{U_1 + U_2}{U_1}\right) = \dim\left(\frac{U_2}{U_1 \cap U_2}\right) \quad (238)$$


por 2. del Corolario 143

$$\begin{aligned}\dim(U_1) + \dim\left(\frac{U_1 + U_2}{U_1}\right) &= \dim(U_1 + U_2) \Rightarrow \\ \dim\left(\frac{U_1 + U_2}{U_1}\right) &= \dim(U_1 + U_2) - \dim(U_1)\end{aligned}\quad (239)$$

y

$$\begin{aligned}\dim(U_1 \cap U_2) + \dim\left(\frac{U_2}{U_1 \cap U_2}\right) &= \dim(U_2) \Rightarrow \\ \dim\left(\frac{U_2}{U_1 \cap U_2}\right) &= \dim(U_2) - \dim(U_1 \cap U_2)\end{aligned}\quad (240)$$

así



$$\begin{aligned}
 \dim\left(\frac{U_1 + U_2}{U_1}\right) &= \dim\left(\frac{U_2}{U_1 \cap U_2}\right) \Rightarrow \\
 \Rightarrow \dim(U_1 + U_2) - \dim(U_1) &= \dim(U_2) - \dim(U_1 \cap U_2) \Rightarrow \\
 \Rightarrow \dim(U_2) + \dim(U_1) &= \dim(U_1 + U_2) + \dim(U_1 \cap U_2)
 \end{aligned} \tag{241}$$

■

Proposición 1.109

Sea V un K -espacio vectorial tal que $\dim(V) = n$ y $\mathcal{B} = \{u_1, \dots, u_n\}$ es base de V .

Entonces todo vector $v \in V$ se escribe de forma única como

$$v = \sum_{i=1}^n \lambda_i u_i \tag{242}$$

con $\lambda_i \in K$. Definimos la aplicación

$$\begin{aligned}
 \chi_{\mathcal{B}} : V &\longrightarrow K^n \\
 \chi_{\mathcal{B}}(v) &= (\lambda_1, \dots, \lambda_n)
 \end{aligned} \tag{243}$$

Entonces $\chi_{\mathcal{B}}$ es un isomorfismo

Idea

La aplicación $\chi_{\mathcal{B}}$ está convirtiendo los vectores de V en sus coordenadas.

┘

Demostración 1.111


Veamos que $\chi_{\mathcal{B}}$ es un isomorfismo.

¿Es lineal?

Sean $v, w \in V$ tales que

$$v = \sum_{i \in I} \lambda_i u_i, \quad w = \sum_{i \in I} \mu_i u_i \tag{244}$$

entonces



$$\chi_{\mathcal{B}}(v + w) = (\lambda_1 + \mu_1, \dots, \lambda_n + \mu_n) = \chi_{\mathcal{B}}(v) + \chi_{\mathcal{B}}(w) \quad (245)$$

Luego es lineal.

¿Es inyectiva?

Sí, porque

$$\chi_{\mathcal{B}}(v) = 0 \quad (246)$$

significa

$$(\lambda_1, \dots, \lambda_n) = (0, \dots, 0) \quad (247)$$

luego $v = 0$.

¿Es sobreyectiva?

También, porque todo vector

$$(\lambda_1, \dots, \lambda_n) \in K^n \quad (248)$$

corresponde con el vector definido como

$$\sum_{i \in I} \lambda_i u_i \quad (249)$$

■

Ejemplo 1.112

Sea $V = \mathbb{R}^2$ con base $\mathcal{B} = \{(1, 1), (1, -1)\}$. Tomemos

$$v = (3, 1) \quad (250)$$

Expresado en función de la base


$$v = \lambda_1(1, 1) + \lambda_2(1, -1) \quad (251)$$

Luego

$$\begin{aligned} (3, 1) &= (\lambda_1 + \lambda_2, \lambda_1 - \lambda_2) \Rightarrow \\ &\Rightarrow \begin{cases} \lambda_1 + \lambda_2 = 3 \\ \lambda_1 - \lambda_2 = 1 \end{cases} \end{aligned} \quad (252)$$

Resolviendo

$$\lambda_1 = 2, \quad \lambda_2 = 1 \quad (253)$$




Entonces

$\chi_{\mathcal{B}}(v) = (2, 1)$

(254)

┐



2 | Aplicaciones Lineales

Definición 2.113 – Matriz

Una matriz de orden (o tipo o tamaño) $m \times n$ con coeficientes en el cuerpo K es un conjunto de $m \times n$ escalares colocados en filas o en columnas.

$$A = (a_{ij})_{\substack{1 \leq i \leq m \\ 1 \leq j \leq n}}^{\dagger} = \begin{pmatrix} a_{1,1} & \cdots & a_{1,n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m,1} & \cdots & a_{m,n} \end{pmatrix} \quad (255)$$

En concreto, si:

- $m = n$, se denomina *matriz cuadrada*,
- $m \times 1$, es *matriz columna*,
- $1 \times n$, es *matriz fila*

Definición 2.114 – Conjunto de matrices

El conjunto de todas las matrices $m \times n$ se denota $M_{m \times n}(K)$ (también $M_m(K)$ si es cuadrada) y es un K -espacio vectorial que verifica:

$$(a_{ij})_{\substack{1 \leq i \leq m \\ 1 \leq j \leq n}} + (b_{ij})_{ij} = (a_{ij} + b_{ij})_{ij} \quad (256)$$


Y para todo $\lambda \in K$:

$$\lambda(a_{ij})_{ij} = (\lambda a_{ij})_{ij} \quad (257)$$

Definición 2.115 – Matriz identidad

Sea $I_m \in M_m(K)$ una matriz cuadrada llamada identidad:

[†]en general, emplearemos la notación $(a_{ij})_{ij}$ para representar $(a_{ij})_{\substack{1 \leq i \leq m \\ 1 \leq j \leq n}}$ por comodidad.



$$I_m = (\delta_{ij})_{ij} : \delta_{ij} \stackrel{\text{def}}{=} \begin{cases} 1, & i = j \\ 0, & i \neq j \end{cases} \quad (258)$$

$$I_m = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (259)$$

Definición 2.116 – Matriz elemental

Sea $E_{ij} \in M_{m \times n}(K)$ una matriz llamada elemental:

$$E_{ij} = (e_{ij})_{ij} : e_{ij} \stackrel{\text{def}}{=} \begin{cases} 1, & \text{en la posición } ij \\ 0, & \text{en todas las demás} \end{cases} \quad (260)$$

$$E_{ij} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \dots & e_{1j} & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ e_{i,1} & 0 & \dots & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 0 & \dots & 0 \end{pmatrix} \quad (261)$$


Proposición 2.117 – Dimensión del espacio de matrices

Para toda matriz, se tiene

$$\dim(M_{m \times n}(K)) = m \cdot n \quad (262)$$

Demostración 2.118

Consideremos el conjunto



$$\left\{ E_{ij} : E_{ij} \in M_{m \times n}(K), \begin{matrix} 1 \leq i \leq m \\ 1 \leq j \leq n \end{matrix} \right\} \quad (263)$$

que contiene las matrices elementales de cada posición.

Sea $A = (a_{ij}) \in M_{m \times n}(K)$, entonces podemos escribir

$$A = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n a_{ij} E_{ij} \quad (264)$$

Es decir, cualquier matriz es una combinación lineal de las matrices elementales y

$$\langle \{ E_{ij} \}_{\substack{1 \leq i \leq m \\ 1 \leq j \leq n}} \rangle = M_{m \times n}(K) \quad (265)$$

Luego

$$\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n \lambda_{ij} E_{ij} = 0 \Rightarrow (\lambda_{ij}) = 0 \Rightarrow \lambda_{ij} = 0, \quad \forall i, j \quad (266)$$

Por lo que es linealmente independiente.

Como el conjunto $\{ E_{ij} \}_{\substack{1 \leq i \leq m \\ 1 \leq j \leq n}}$ tiene $m \cdot n$ elementos y es base,

$$\dim(M_{m \times n}(K)) = m \cdot n \quad (267)$$

■

Definición 2.119 – Matriz asociada a una aplicación lineal

Sea $f : V \rightarrow V'$ una aplicación K-lineal tal que


$$\begin{aligned} \mathcal{B} &= \{v_1, \dots, v_n\} \text{ base de } V \\ \mathcal{B}' &= \{v'_1, \dots, v'_m\} \text{ base de } V' \end{aligned} \quad (268)$$

Llamamos matriz asociada a f respecto de $\mathcal{B}$ y $\mathcal{B}'$

$$(f)_{\mathcal{B}\mathcal{B}'} = (a_{ij}) \in M_{m \times n}(K) \quad (269)$$

tal que

$$f(v_j) = \sum_{i=1}^m a_{ij} v'_i, \quad (1 \leq j \leq n) \quad (270)$$



Idea

Sea $f : V \longrightarrow V'$ una aplicación lineal tal que

$$\begin{aligned}\mathcal{B} &= \{u_1, \dots, u_n\} \text{ base de } V \\ \mathcal{B}' &= \{u'_1, \dots, u'_m\} \text{ base de } V'\end{aligned}\tag{271}$$

Entonces cada imagen de un vector de la base del dominio se puede escribir como combinación lineal de la base del codominio:

$$\begin{aligned}f(u_1) &= a_1 u'_1 + a_2 u'_2 + \dots + a_n u'_n \\ f(u_2) &= b_1 u'_1 + b_2 u'_2 + \dots + b_n u'_n \\ &\vdots \\ f(u_m) &= m_1 u'_1 + m_2 u'_2 + \dots + m_n u'_n\end{aligned}\tag{272}$$

y la matriz sería

$$(f)_{\mathcal{B}\mathcal{B}'} = \begin{pmatrix} a_1 & b_1 & \dots & m_1 \\ a_2 & b_2 & \dots & m_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_n & b_n & \dots & m_n \end{pmatrix}\tag{273}$$

┘


Observación 1.121 – (Cálculo de la imagen mediante coordenadas)

Sea $v \in V$.

Queremos saber $f(v)$ a partir de la matriz asociada a f .

$$\begin{aligned}v = \sum_{j=1}^n \lambda_j u_j &\Rightarrow f(v) = f\left(\sum_{j=1}^n \lambda_j u_j\right) = \sum_{j=1}^n \lambda_j f(u_j) = \\ &= \sum_{j=1}^n \lambda_j \left(\sum_{i=1}^m a_{ij} u'_i\right) = \sum_{i=1}^m \left(\sum_{j=1}^n \lambda_j a_{ij}\right) u'_i = \\ &= \left(\sum_{j=1}^n \lambda_j a_{1j}\right) u'_1 + \dots + \left(\sum_{j=1}^n \lambda_j a_{mj}\right) u'_m\end{aligned}\tag{274}$$

Donde cada término $\sum_{j=1}^n \lambda_j a_{ij} = (x_1 a_{i1} + \dots + x_n a_{in})$, por lo que



$$\begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 a_{11} + \dots + x_n a_{1n} \\ \vdots \\ x_1 a_{m1} + \dots + x_n a_{mn} \end{pmatrix} \quad (275)$$

Concluyendo

$$(f(v))_{\mathcal{B}'} = (f)_{\mathcal{B}\mathcal{B}'}(u)_{\mathcal{B}} \quad (276)$$

┘

Ejemplo 2.122

Definimos la aplicación $f : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ tal que $f(x, y, z) = (x + y, y, z)$.

Queremos encontrar la matriz asociada a f respecto a la base canónica. Considerando

$$e_1 = (1, 0, 0), \quad e_2 = (0, 1, 0), \quad e_3 = (0, 0, 1) \quad (277)$$

La idea consiste en obtener la matriz que se obtiene al calcular f sobre los vectores de la base.

La imagen de cada vector:

$$\begin{aligned} f(e_1) &= (1, 0, 0) \\ f(e_2) &= (1, 1, 0) \\ f(e_3) &= (0, 0, 1) \end{aligned} \quad (278)$$

Las columnas de la matriz son las coordenadas de estas imagenes:


$$(f)_{\mathcal{E}\mathcal{E}} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (279)$$

Luego para verificar, se debería cumplir $f(v) = (f)_{\mathcal{E}\mathcal{E}} \cdot v$, así

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x + y + 0 \\ 0 + y + 0 \\ 0 + 0 + z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x + y \\ y \\ z \end{pmatrix} \quad (280)$$

┘

Ejemplo 2.123



Consideremos la aplicación identidad

$$\text{id} : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3 \quad (281)$$

con bases

$$\begin{aligned} \mathcal{B} &= \{e_1, e_2 + e_3, e_3\} \\ \mathcal{C} &= \{e_1, e_2, e_3\} \end{aligned} \quad (282)$$

En este caso, las columnas de la matriz serán las coordenadas en $\mathcal{C}$ de las imágenes de los vectores de $\mathcal{B}$.

Aplicando $\text{id}_{\mathbb{R}^3}$ a $\mathcal{B}$ se obtiene:

$$\begin{aligned} \text{id}(e_1) &= e_1 = (1, 0, 0) \\ \text{id}(e_2 + e_3) &= e_2 + e_3 = (0, 1, 1) \\ \text{id}(e_3) &= e_3 = (0, 0, 1) \end{aligned} \quad (283)$$

luego

$$(\text{id}_{\mathbb{R}^3})_{\mathcal{B}\mathcal{C}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad (284)$$

La inversa de esta aplicación sería

$$\begin{aligned} \text{id}(e_1) &= (1, 0, 0) \\ \text{id}(e_2) &= (0, 1, 0) \\ \text{id}(e_3) &= (0, 0, 1) \end{aligned} \quad (285)$$


y expresando la imagen de $\mathcal{C}$ con la base $\mathcal{B}$

$$\begin{aligned} e_1 &= 1e_1 + 0(e_2 + e_3) + 0e_3 \\ e_2 &= 0e_1 + 1(e_2 + e_3) + (-1)e_3 \\ e_3 &= 0e_1 + 0(e_2 + e_3) + 1e_3 \end{aligned} \quad (286)$$

luego

$$(\text{id}_{\mathbb{R}^3})_{\mathcal{C}\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \quad (287)$$

┘



Ejemplo 2.124

Sea

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R}^3 &\longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ (x, y, z) &\rightsquigarrow (x + y, z) \end{aligned} \quad (288)$$

tal que

$$\begin{aligned} \mathcal{B}_3 &= \{(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 1, 1)\} \\ \mathcal{B}_2 &= \{(1, 1), (0, 1)\} \end{aligned} \quad (289)$$

luego

$$f(\mathcal{B}_3) = \{(1, 0), (1, 0), (1, 1)\} \quad (290)$$

que escrito en función de $\mathcal{B}_2$

$$\begin{aligned} (1, 0) &= 1(1, 1) + (-1)(0, 1) \\ (1, 1) &= 1(1, 1) + 0(0, 1) \end{aligned} \quad (291)$$

por lo tanto

$$(f)_{\mathcal{B}_3 \mathcal{B}_2} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & -1 & 0 \end{pmatrix} \quad (292)$$

┘

Definición 2.125 – Espacio de aplicaciones lineales

Sean V, V' K -espacios vectoriales.


El conjunto de las aplicaciones lineales entre V y V' se denota:

$$\mathcal{L}_K(V, V') = \{f : V \longrightarrow V' : f \text{ es aplicación lineal}\} \quad (293)$$

Definición 2.126 – Endomorfismo

Sea V un K -espacio vectorial.

Un endomorfismo de V es una aplicación lineal



$$f : V \longrightarrow V \quad (294)$$

El conjunto de todos los endomorfismos de V se denota

$$\text{End}_K(V) = \mathcal{L}_K(V, V) \quad (295)$$

Observación 2.127

Sean V, V' K -espacios vectoriales.

Para $f, g \in \mathcal{L}_K(V, V')$ definimos

$$(f + g)(v) = f(v) + g(v), \quad \forall v \in V \quad (296)$$

y la aplicación nula

$$0(v) = 0, \quad \forall v \in V \quad (297)$$

Para $f \in \mathcal{L}_K(V, V')$ definimos

$$(-f)(v) = -f(v) \quad (298)$$

Con estas operaciones se tiene que $(\mathcal{L}_K(V, V'), +)$ es un grupo abeliano.

También para $\lambda \in K$ y $f \in \mathcal{L}_K(V, V')$ definimos

$$(\lambda f)(v) = \lambda f(v) \quad (299)$$

Con esta operación externa, $\mathcal{L}_K(V, V')$ es un K -espacio vectorial.

Finalmente, si ahora consideramos

$$\text{End}_K(V) = \mathcal{L}_K(V, V) \quad (300)$$


entonces para $f, g \in \text{End}_K(V)$ se cumple que

$$g \circ f \in \text{End}_K(V) \quad (301)$$

Además la composición satisface la propiedad distributiva

$$\begin{aligned} (f + g) \circ h &= f \circ h + g \circ h \\ f \circ (g + h) &= f \circ g + f \circ h \end{aligned} \quad (302)$$

Por lo que $(\text{End}_K(V), +, \circ)$ es un anillo no conmutativo.



Proposición 2.128

Sean V, V' K -espacios vectoriales tales que

$$\mathcal{B} \text{ es base de } V, \quad \mathcal{B}' \text{ es base de } V' \quad (303)$$

y

$$\dim(V) = n, \quad \dim(V') = m \quad (304)$$

Luego la aplicación

$$\begin{aligned} \varphi_{\mathcal{B}\mathcal{B}'} : \mathcal{L}_K(V, V') &\longrightarrow M_{m \times n}(K) \\ f &\rightsquigarrow (f)_{\mathcal{B}\mathcal{B}'} \end{aligned} \quad (305)$$

es un isomorfismo.

Demostración 2.129

Sea $\varphi_{\mathcal{B}\mathcal{B}'}$ una aplicación, luego para todo $f, g \in \mathcal{L}_K(V, V')$,

¿Es $\varphi_{\mathcal{B}\mathcal{B}'}$ lineal?

Por definición

$$\begin{aligned} \varphi_{\mathcal{B}\mathcal{B}'}(f + g) &\stackrel{\text{def}}{=} (f + g)_{\mathcal{B}\mathcal{B}'} = (f)_{\mathcal{B}\mathcal{B}'} + (g)_{\mathcal{B}\mathcal{B}'} = \\ &= \varphi_{\mathcal{B}\mathcal{B}'}(f) + \varphi_{\mathcal{B}\mathcal{B}'}(g) \end{aligned} \quad (306)$$

Análogamente se verifica para el producto por escalares

$$\varphi_{\mathcal{B}\mathcal{B}'}(\lambda f) = \lambda \varphi_{\mathcal{B}\mathcal{B}'}(f), \quad (\forall \lambda \in K) \quad (307)$$

Luego $\varphi_{\mathcal{B}\mathcal{B}'}$ es lineal.


¿Es $\varphi_{\mathcal{B}\mathcal{B}'}$ inyectiva?

Supongamos

$$\varphi_{\mathcal{B}\mathcal{B}'}(f) = 0 \Rightarrow (f)_{\mathcal{B}\mathcal{B}'} = 0 \quad (308)$$

lo que significa que todas las columnas de la matriz son nulas. Por tanto

$$f(v_j) = 0, \quad (1 \leq j \leq n) \quad (309)$$



Sea ahora $v \in V$. Como $\mathcal{B}$ es bas,

$$v = \sum_{j=1}^n x_j v_j \quad (310)$$

entonces

$$f(v) = f\left(\sum_{j=1}^n x_j v_j\right) = \sum_{j=1}^n x_j f(v_j) = \sum_{j=1}^n x_j 0 = 0 \quad (311)$$

Por lo que $f = 0$ y

$$\text{Ker}(\varphi_{\mathcal{B}\mathcal{B}'}) = \{0\} \quad (312)$$

Luego $\varphi_{\mathcal{B}\mathcal{B}'}$ es inyectiva.

¿Es $\varphi_{\mathcal{B}\mathcal{B}'}$ sobreyectiva?

Sea $A = (a_{ij}) \in M_{m \times n}(K)$. Definimos $f : V \rightarrow V'$ como la única aplicación lineal tal que

$$f(v_j) = \sum_{i=1}^m a_{ij} v'_i, \quad (1 \leq j \leq n) \quad (313)$$

Por construcción, las coordenadas de $f(v_j)$ en la base $\mathcal{B}'$ son precisamente

$$(a_{1,j}, \dots, a_{m,j}) \quad (314)$$

que forman la columna j de A . En general


$$(f)_{\mathcal{B}\mathcal{B}'} = A = \varphi_{\mathcal{B}\mathcal{B}'}(f) \quad (315)$$

Así que $\varphi_{\mathcal{B}\mathcal{B}'}$ es sobreyectiva.

En conclusión, $\varphi_{\mathcal{B}\mathcal{B}'}$ es un isomorfismo. ■

Proposición 2.130 – Matriz de la composición de aplicaciones lineales

Sean V, V', V'' K -espacios vectoriales tales que



$$\begin{aligned}\mathcal{B} &= \{u_1, \dots, u_n\} \text{ es base de } V \\ \mathcal{B}' &= \{u'_1, \dots, u'_m\} \text{ es base de } V' \\ \mathcal{B}'' &= \{u''_1, \dots, u''_p\} \text{ es base de } V''\end{aligned}\tag{316}$$

Definamos las aplicaciones K-lineales

$$\begin{aligned}f &: V \longrightarrow V' \\ g &: V' \longrightarrow V''\end{aligned}\tag{317}$$

Luego la composición de aplicaciones lineales $(g \circ f)$ induce por isomorfismo un producto en el espacio de matrices.

Es decir:

$$(g \circ f)_{\mathcal{B}\mathcal{B}''} = (g)_{\mathcal{B}\mathcal{B}'}(f)_{\mathcal{B}'\mathcal{B}''}\tag{318}$$

Demostración 1.131 – (Demostración de la regla de composición matricial)

Sean

$$\begin{aligned}A &= (f)_{\mathcal{B}\mathcal{B}'} = (a_{ij}) \in M_{m \times n}(K), \\ B &= (g)_{\mathcal{B}'\mathcal{B}''} = (b_{ki}) \in M_{p \times m}(K)\end{aligned}\tag{319}$$

Por definición de la matriz asociada:

$$f(u_j) = \sum_{i=1}^m a_{ij}u'_i\tag{320}$$


Aplicando g :

$$g(f(u_j)) = g\left(\sum_{i=1}^m a_{ij}u'_i\right) = \sum_{i=1}^m a_{ij}g(u'_i) =\tag{321}$$

Como

$$g(u'_i) = \sum_{k=1}^p b_{ki}u''_k\tag{322}$$

Se tiene



$$g(f(u_j)) = \sum_{i=1}^m a_{ij} \left(\sum_{k=1}^p b_{ki} u''_k \right) = \sum_{k=1}^p \left(\sum_{i=1}^m b_{ki} a_{ij} \right) u''_k \quad (323)$$

Donde los coeficientes

$$\sum_{i=1}^m b_{ki} a_{ij} \quad (324)$$

son precisamente las entradas del producto de matrices BA . Por lo tanto

$$(g \circ f)_{\mathcal{B}\mathcal{B}''} = BA \quad (325)$$

■

Idea 1.132 – (Interpretación operativa de la composición BA)

Esto podemos interpretarlo paso a paso, como ya hemos visto que

$$f(v) = (f)_{\mathcal{C}\mathcal{C}}(v)_{\mathcal{C}} = A(v)_{\mathcal{C}} \quad (326)$$

De la misma manera

$$g(f(v)) = (g)_{\mathcal{C}\mathcal{C}}(f(v))_{\mathcal{C}} = B(f(v))_{\mathcal{C}} \quad (327)$$

Sustituyendo

$$g(f(v)) = B(A(v)_{\mathcal{C}}) = (BA)(v)_{\mathcal{C}} \quad (328)$$

┘

Ejemplo 2.133

Veamos como esto se produce tomando


$$V = \mathbb{R}^3, \quad V' = \mathbb{R}^3, \quad V'' = \mathbb{R}^3 \quad (329)$$

con la base canónica y definimos f tal que

$$f(x, y, z) = (x + y, y, z) \quad (330)$$

Luego su matriz ya calculada es

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (331)$$



Y g tal que

$$g(x, y, z) = (2x, y, 2z) \quad (332)$$

Luego su matriz

$$\begin{aligned} (2, 0, 0) &= 2e_1 + 0e_2 + 0e_3 \\ (0, 1, 0) &= 0e_1 + 1e_2 + 0e_3 \\ (0, 0, 2) &= 0e_1 + 0e_2 + 2e_3 \end{aligned} \quad (333)$$

$$B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

La composición de las funciones

$$(g \circ f)(x, y, z) = g(x + y, y, z) = (2(x + y), y, 2z) \quad (334)$$

su matriz es

$$(g \circ f)_{\mathcal{C}\mathcal{C}} = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \quad (335)$$

que efectivamente verifica

$$BA = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \quad (336)$$

┘

Definición 2.134 – Matriz invertible


Sea $A \in M_n(K)$, si existe $B \in M_n(K)$ tal que

$$AB = I_n = BA \quad (337)$$

se dice que A es invertible o no singular y que B es la inversa de A .

Tambien se denota

$$B = A^{-1} \quad (338)$$


Idea 1.135 – (Condición necesaria: matriz cuadrada)

Para que una matriz sea invertible debe ser cuadrada. Las matrices no cuadradas nunca tienen inversa.

┘

Ejemplo 1.136 – (Cálculo de la inversa por operaciones elementales)

Consideremos la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 2 & 2 & 0 \end{pmatrix} \quad (339)$$

Queremos buscar la inversa de A .


Para ello, podemos hacer, secuencialmente, las mismas transformaciones elementales (similares a las que usabamos para escalar) a A y a I , intentando transformar a A en I , con lo que I se transformará en A^{-1} .

La demostración y explicación de este método se verá más avanzada esta unidad.

Luego veamos:

$$\begin{aligned} A \parallel I &\rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 4 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 2 & 2 & 0 \end{pmatrix} \parallel \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 2 & 2 & 0 \end{pmatrix} \parallel \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &\xrightarrow{F_3 - F_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \parallel \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -\frac{1}{2} & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_1 \leftrightarrow F_3} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \end{pmatrix} \parallel \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\ &\xrightarrow{F_2 - F_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \end{pmatrix} \parallel \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & 0 & 1 \\ \frac{1}{2} & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_3 - F_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \end{pmatrix} \parallel \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ \frac{3}{2} & 0 & -1 \end{pmatrix} \\ &\xrightarrow{\frac{F_3}{2}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \parallel \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ \frac{3}{4} & 0 & -\frac{1}{2} \end{pmatrix} \xrightarrow{F_3 \leftrightarrow F_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \parallel \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ \frac{3}{4} & 0 & -\frac{1}{2} \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \end{aligned} \quad (340)$$

Así, la matriz inversa de A es



$$A^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ \frac{3}{4} & 0 & -\frac{1}{2} \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \quad (341)$$

┘

Proposición 2.137 – Isomorfismo y matriz invertible

Sean V, V' K -espacios vectoriales tales que

$$\dim(V) = n = \dim(V') \quad (342)$$

Sea $\mathcal{B}$ base de V y $\mathcal{B}'$ base de V' . Para $f \in \mathcal{L}_K(V, V')$ se tiene:

$$f \text{ es isomorfismo} \iff (f)_{\mathcal{B}\mathcal{B}'} \text{ es invertible} \quad (343)$$

Demostración 2.138

« $\implies$ »

Sea f un isomorfismo, luego existe

$$f^{-1} : f^{-1} \circ f = \text{id}_V, \quad f \circ f^{-1} = \text{id}_{V'} \quad (344)$$

Así, tenemos

$$\begin{aligned} f^{-1} \circ f = \text{id}_V &\Rightarrow (f^{-1} \circ f)_{\mathcal{B}\mathcal{B}} = (\text{id}_V)_{\mathcal{B}\mathcal{B}} \Rightarrow \\ &\Rightarrow (f^{-1})_{\mathcal{B}'\mathcal{B}} (f)_{\mathcal{B}\mathcal{B}'} = (\text{id}_V) = I_n \end{aligned} \quad (345)$$

Equivalentemente

$$(f)_{\mathcal{B}\mathcal{B}'} (f^{-1})_{\mathcal{B}'\mathcal{B}} = (\text{id}_{V'}) = I_n \quad (346)$$


« $\impliedby$ »

Supongamos que existe C tal que

$$(f)_{\mathcal{B}\mathcal{B}'} C = I_n = C (f)_{\mathcal{B}\mathcal{B}'} \quad (347)$$

definida para $g : V' \longrightarrow V$ como

$$C = (g)_{\mathcal{B}'\mathcal{B}} \quad (348)$$



Luego

$$\varphi_{\mathcal{B}'\mathcal{B}'} = I_n = (f)_{\mathcal{B}\mathcal{B}'}(g)_{\mathcal{B}'\mathcal{B}} = (f \circ g)_{\mathcal{B}'\mathcal{B}'} = \varphi_{\mathcal{B}'\mathcal{B}'}(f \circ g) \quad (349)$$

Se tiene que $f \circ g = \text{id}_V$, es un isomorfismo por $\varphi_{\mathcal{B}'\mathcal{B}'}$ siempre serlo. ■

Definición 2.139 – Matriz de cambio de base

Consideremos la función identidad en un K -espacio vectorial V tal que $\mathcal{B}$ es base del dominio y $\mathcal{B}'$ es base del codominio.

Luego $(\text{id}_V)_{\mathcal{B}\mathcal{B}'}$ es la matriz de cambio de base y esta es siempre invertible por ser id_V un isomorfismo.

Además:

$$\left((\text{id}_V)_{\mathcal{B}\mathcal{B}'}\right)^{-1} = (\text{id}_V)_{\mathcal{B}'\mathcal{B}} \quad (350)$$

Ejemplo 2.140

Sea $V = \mathbb{R}^3$ y


$$\begin{aligned} \mathcal{B} &= \{(1, 2, 0), (2, 0, 1), (0, 0, 1)\} \\ \mathcal{B}' &= \{(1, 1, 1), (0, 0, 1), (0, 1, 0)\} \end{aligned} \quad (351)$$

Luego la matriz asociada a la identidad:

$$\begin{aligned} (1, 2, 0) &= 1(1, 1, 1) + (-1)(0, 0, 1) + 1(0, 1, 0) \\ (2, 0, 1) &= 2(1, 1, 1) + (-1)(0, 0, 1) + (-2)(0, 1, 0) \\ (0, 0, 1) &= 0(1, 1, 1) + 1(0, 0, 1) + 0(0, 1, 0) \end{aligned} \quad (352)$$

$$(\text{id}_V)_{\mathcal{B}\mathcal{B}'} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ -1 & -1 & 1 \\ 1 & -2 & 0 \end{pmatrix}$$

┘



Proposición 2.141 – Imagen de una base bajo aplicación invertible

Sea $A \in M_n(K)$ una matriz no singular tal que A es una matriz de cambio de base y

$$\begin{aligned} \mathcal{B} \text{ base de } V \\ \dim(V) = n \end{aligned} \quad (353)$$

Luego si $f : V \rightarrow V$ una aplicación tal que $(f)_{\mathcal{B}\mathcal{B}} = A$ se tiene que

$$\left. \begin{aligned} A \text{ invertible} \Rightarrow f \text{ isomorfismo} \\ \mathcal{B} \text{ base de } V \end{aligned} \right\} \Rightarrow f(\mathcal{B}) \text{ es base de } V \quad (354)$$

Proposición 2.142 – Factorización por cambio de base

Sean V, V' K -espacios vectoriales y $f : V \rightarrow V'$ una aplicación lineal tal que

$$\begin{aligned} \mathcal{B}, \mathcal{B}_1 \text{ base de } V \\ \mathcal{B}' \mathcal{B}'_1 \text{ base de } V' \end{aligned} \quad (355)$$


Luego se tendrá que

$$(f)_{\mathcal{B}_1 \mathcal{B}'_1} = (1_{V'} \circ f \circ 1_V)_{\mathcal{B}_1 \mathcal{B}'_1} = (\text{id}_{V'})_{\mathcal{B}'_1 \mathcal{B}'_1} (f)_{\mathcal{B} \mathcal{B}'} (\text{id}_V)_{\mathcal{B}_1 \mathcal{B}} \quad (356)$$

Gráficamente:

$$\begin{array}{ccc} V_{\mathcal{B}} & \xrightarrow{f} & V_{\mathcal{B}'} \\ \uparrow \text{id}_{\mathcal{B}_1 \mathcal{B}} & & \uparrow \text{id}_{\mathcal{B}'_1 \mathcal{B}'} \\ V_{\mathcal{B}_1} & \xrightarrow{f} & V_{\mathcal{B}'_1} \end{array}$$

Ejemplo 1.143 – (Interpretación geométrica del cambio de base en $\mathbb{R}^2$)



Veamos como se puede interpretar el cambio de base.

Supongamos primero un vector $v \in V$ con la base habitual en $\mathbb{R}^2$. Es decir


$$\mathcal{C} = \{(1, 0), (0, 1)\} \quad (357)$$

y

$$\mathcal{B} = \{(1, 1), (0, 2)\} \quad (358)$$

Luego v gráficamente

$$V_{\mathcal{C}} = \mathbb{R}^2$$



$$V_{\mathcal{B}} = \mathbb{R}^2$$




Figura 2 - Representación gráfica de los cambios de base.

Veamos como para $(v)_{\mathcal{C}} = (2, 3)$, a través del cambio de base

$$\begin{aligned} (1, 1) &= 1(1, 0) + 1(0, 1) \\ (0, 2) &= 0(1, 0) + 2(0, 1) \end{aligned} \quad (359)$$


$$(\text{id})_{\mathcal{C}\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

se obtiene que

$$(\text{id})_{\mathcal{C}\mathcal{B}}(v)_{\mathcal{C}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 + 0 \\ 2 + 2 \cdot 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 8 \end{pmatrix} = (v)_{\mathcal{B}} \quad (360)$$

Como se aprecia gráficamente.

┘



Definición 2.144 – Equivalencia de matrices

Dadas $A, B \in M_{m \times n}(K)$ se dice que las matrices son equivalentes si existen matrices no singulares $P \in M_n(K), Q \in M_m(K)$ tales que

$$QAP = B \quad (361)$$

Proposición 2.145 – Equivalencia y cambio de bases en una aplicación lineal

Sean $A, B \in M_{m \times n}(K)$, luego

$$\begin{aligned} &A \text{ y } B \text{ son equivalentes} \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \exists f : V \rightarrow V' \text{ lineal : } \begin{cases} \dim(V) = n \\ \dim(V') = m \end{cases} \text{ con} \end{aligned} \quad (362)$$

$\mathcal{B}$ y $\mathcal{B}_1$ bases de V y $\mathcal{B}'$ y $\mathcal{B}'_1$ bases de V' tales que

$$\begin{aligned} (f)_{\mathcal{B}\mathcal{B}'} &= A \\ (f)_{\mathcal{B}_1\mathcal{B}'_1} &= B \end{aligned} \quad (363)$$

Demostración 2.146

« $\Rightarrow$ »

Supongamos que existen Q, P no singulares tales que se verifica que $QAP = B$. Sean V, V' K -espacios vectoriales tales que

$$\dim(V) = n, \quad \dim(V') = m \quad (364)$$


con $\mathcal{B}$ base de V y $\mathcal{B}'$ base de V' tal que

$$(f)_{\mathcal{B}\mathcal{B}'} = A \quad (365)$$

Definimos

$$P = (\text{id}_V)_{\mathcal{B}_1\mathcal{B}} \quad (366)$$

y como P es no singular, es un cambio de base. Equivalentemente



$$Q = (\text{id}_V)_{\mathcal{B}'\mathcal{B}'_1} \quad (367)$$

Luego se verifica:

$$QAP = B \equiv (\text{id}_V)_{\mathcal{B}'\mathcal{B}'_1} (f)_{\mathcal{B}\mathcal{B}'} (\text{id}_V)_{\mathcal{B}_1\mathcal{B}} = (f)_{\mathcal{B}_1\mathcal{B}'_1} \quad (368)$$

« $\Leftarrow$ »

Esta implicación es trivial porque gracias a la Proposición 193 podemos generar la factorización por cambios de base que demuestra la equivalencia de A y B .

■

Corolario 2.147 – Cambio de base en endomorfismos y conjugación

Sea $f \in \text{End}_K(V)$ tal que

$$\mathcal{B}, \mathcal{B}_1 \text{ bases de } V \quad (369)$$

luego

$$\begin{aligned} (f)_{\mathcal{B}_1\mathcal{B}_1} &= (\text{id}_V)_{\mathcal{B}\mathcal{B}_1} (f)_{\mathcal{B}\mathcal{B}} (\text{id}_V)_{\mathcal{B}_1\mathcal{B}} = \\ &= \left((\text{id}_V)_{\mathcal{B}_1\mathcal{B}} \right)^{-1} (f)_{\mathcal{B}\mathcal{B}} (\text{id}_V)_{\mathcal{B}_1\mathcal{B}} \end{aligned} \quad (370)$$

Definición 2.148 – Semejanza de matrices


Sean $A, B \in M_n(K)$. Se dice que son semejantes si existe $P \in M_n(K)$ no singular tal que

$$P^{-1}AP = B \quad (371)$$

Idea 1.149 – (Relación entre equivalencia y semejanza)

Enfaticemos en el parecido de las definiciones de equivalencia y semejanza.

Para que dos matrices sean equivalentes no tienen porqué ser cuadradas y P, Q no tienen que estar relacionadas.



En cambio, cuando dos matrices equivalentes cumplen que sean cuadradas y que Q sea inversa de P , se verifica que son semejantes.

Todas las matrices semejantes son equivalentes pero no se cumple el recíproco.

┘

Definición 2.150 – Espacio dual

Sea V un K -espacio vectorial. Luego el espacio dual de V , denotado por $\hat{V}$, se define como:

$$\mathcal{L}_K(V, K) = \hat{V} = \text{Hom}_K(V, K) \quad (372)$$

Es decir que se trata de aplicaciones lineales de un espacio vectorial a un cuerpo escalar.

Y aquellos $\varphi \in \hat{V}$ se llaman covectores.

Proposición 2.151 – Construcción de la base dual

Sea V un espacio vectorial y $\{v_i\}_{i \in I}$ una base de V .

Sea $\varphi_i \in \hat{V}$ tales que

$$\varphi_i(v_j) = \delta_{ij} = \begin{cases} 1 & i = j \\ 0 & i \neq j \end{cases} \quad (373)$$


Entonces

1. $\{\varphi_i\}_{i \in I}$ es linealmente independiente.
2. Para todo $v \in V$ se cumple que $\varphi_{i(v)} = 0$ para casi todo $i \in I$ y

$$v = \sum_{i \in I} \varphi_i(v) v_i \quad (374)$$

3. Si V tiene dimensión finita, entonces $\{\varphi_i\}_{i \in I}$ es una base de $\hat{V}$.

Demostración 1.152 – (Demostración de independencia y generación en el dual)



1.

Supongamos que existe una combinación lineal nula

$$\sum_{i \in I} a_i \varphi_i = 0 \quad (375)$$

Por lo que si evaluamos en v_j

$$\left(\sum_{i \in I} a_i \varphi_i \right) (v_j) = 0 \Rightarrow \sum_{i \in I} a_i \varphi_i(v_j) = 0 \quad (376)$$

Pero por hipotesis tenemos $\varphi_i(v_j) = \delta_{ij}$. Entonces

$$\sum_{i \in I} a_i \delta_{ij} = a_j = 0 \quad (377)$$

Luego

$$a_i = 0, \quad \forall i \in I \quad (378)$$

Así que $\{\varphi_i\}$ es linealmente independiente.

2.

Sea $v \in V$. Como $\{v_i\}$ es base, existe una única combinación lineal tal que

$$v = \sum_{i \in I} a_i v_i \quad (379)$$

Aplicando φ_j :

$$\varphi_j(v) = \varphi_j \left(\sum_{i \in I} a_i v_i \right) = \sum_{i \in I} a_i \varphi_j(v_i) \quad (380)$$

Que sustituyendo de nuev


$$\varphi_j(v) = \sum_{i \in I} a_i \delta_{ij} = a_j \quad (381)$$

Luego $a_i = \varphi_i(v)$, por lo que en en la expresión inicial:

$$v = \sum_{i \in I} \varphi_i(v) v_i \quad (382)$$

Como la base es finita, entonces $\varphi_i(v) = 0, \quad \forall^* i \in I$.

3.



Si $\dim(V) = n \in \mathbb{N}$ finito, $\{v_i\}_{i \in I}$ tiene n elementos y entonces $\{\varphi_i\}_{i \in I}$ tiene n elementos. Además, ya probamos que son L.I.

Luego un conjunto de n funcionales independientes de $\hat{V}$ es una base.

En concreto

$$\hat{\mathcal{B}} = \{\varphi(v_i), \dots, \varphi(v_n)\} \quad (383)$$

■

Ejemplo 1.153 – (Covector en $\mathbb{R}^2$ y líneas equipotenciales)

Sea $V = \mathbb{R}^2$. Consideremos una función lineal $f \in \hat{V}$ que lleve los vectores de V a un escalar. Por ejemplo:

$$f(x, y) = x + y \quad (384)$$

Por lo que al ser lineal, si tomaremos




Figura 3 - Representación gráfica de las líneas equipotenciales de un covector de $\mathbb{R}^2$.

todos los valores tales que $x + y = 1$, nos daría una lineal recta en V . Para los $x + y = 0$ nos daría otra recta paralela.


Gráficamente, lo podríamos ver como en la **Figura 3**

$$f(1, 0) = 1 + 0 = 1$$

$$f(0, 1) = 0 + 1 = 1$$

$$f(2, -1) = 2 - 1 = 1$$

$$f(3, -2) = 3 - 2 = 1$$



Y en general, para cualquier elemento $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ se le asocia un valor escalar $c \in K = \mathbb{R}$.

El conjunto de todos los co vectores, es decir, todas las posibles funciones lineales que asignen valores de R a elementos de $V = \mathbb{R}^2$ es el espacio dual de V ($\hat{V}$).

Otros ejemplos de co vectores de $\mathbb{R}^2$ pueden ser:

- $f(x, y) = y \longrightarrow$ las líneas de equivalencia son las horizontales.
- $f'(x, y) = y - 2 \longrightarrow$ las líneas son las horizontales desplazadas 2 unidades.
- $f''(x, y) = 2x \longrightarrow$ las líneas son las verticales 2 veces más pegadas entre sí.
- $f'''(x, y) = x + \pi^3 \longrightarrow$ las líneas son las verticales desplazadas π^3 unidades.

Cabe destacar que a estas funciones lineales f del espacio dual se las suele representar mediante φ 's.

┘

Ejemplo 1.154 – (Cálculo explícito de la base dual en $\mathbb{R}^4$)

Tomemos

$$\begin{aligned} \mathcal{B} &= \{(1, 1, 0, -1), (0, 1, 1, 0), (0, 0, 1, 1), (0, 0, 0, 1)\} \\ \hat{\mathcal{B}} &= \{\varphi_1, \varphi_2, \varphi_3, \varphi_4\} \end{aligned} \tag{385}$$

tal que, por la definición de base, se tiene

$$\begin{aligned} \varphi_1(v_1) &= 1, & \varphi_1(v_2) &= 0, & \varphi_1(v_3) &= 0, & \varphi_1(v_4) &= 0 \\ \varphi_2(v_1) &= 0, & \varphi_2(v_2) &= 1, & \varphi_2(v_3) &= 0, & \varphi_2(v_4) &= 0 \\ \varphi_3(v_1) &= 0, & \varphi_3(v_2) &= 0, & \varphi_3(v_3) &= 1, & \varphi_3(v_4) &= 0 \\ \varphi_4(v_1) &= 0, & \varphi_4(v_2) &= 0, & \varphi_4(v_3) &= 0, & \varphi_4(v_4) &= 1 \end{aligned} \tag{386}$$


Luego toda aplicación lineal del dual va a ser de la siguiente forma

$$\varphi(x_1, x_2, x_3, x_4) = ax_1 + bx_2 + cx_3 + dx_4 \tag{387}$$

Luego sabemos que $\varphi_1(v_1) = 1$ y v_1 de la base es $(1, 1, 0, -1)$, así:

$$\varphi_1(1, 1, 0, -1) = 1a + 1b + 0c + (-1)d = a + b - d = 1 \tag{388}$$

Para el resto de vectores de la base:



$$\begin{aligned}\varphi_1(0, 1, 1, 0) &= b + d = 0 \\ \varphi_1(0, 0, 1, 1) &= c + d = 0 \\ \varphi_1(0, 0, 0, 1) &= d = 0\end{aligned}\tag{389}$$

Luego resolviendo obtenemos

$$a = 1, \quad b = 0, \quad c = 0, \quad d = 0.\tag{390}$$

Quedandonos

$$\varphi_1(x_1, x_2, x_3, x_4) = x_1\tag{391}$$

Haciendo lo mismo para el resto

$$\begin{aligned}\varphi_2(x_1, x_2, x_3, x_4) &= -x_1 + x_2 \\ \varphi_3(x_1, x_2, x_3, x_4) &= x_1 - x_2 + x_3 \\ \varphi_4(x_1, x_2, x_3, x_4) &= -2x_1 + x_2 - x_3 + x_4\end{aligned}\tag{392}$$

Que satisface que $\varphi_i(v_j) = \delta_{ij}$, por lo que es la base dual de $\mathcal{B}$.

┘

Ejemplo 1.155 – (Coordenadas en base dual y funcional dado)

Sea $\mathcal{B} = \{v_1, v_2, v_3, v_4\}$ una base de $V = \mathbb{R}^4$ del ejemplo anterior y sea $\hat{\mathcal{B}} = \{\varphi_1, \varphi_2, \varphi_3, \varphi_4\}$ la base dual de $\mathcal{B}$.

Si

$$v = \alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \alpha_3 v_3 + \alpha_4 v_4\tag{393}$$

entonces sus coordenadas en la base $\mathcal{B}$ son


$$v_{\mathcal{B}} = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)\tag{394}$$

que por linealidad:

$$\begin{aligned}\varphi_i(v) &= \varphi_i(\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \alpha_3 v_3 + \alpha_4 v_4) = \\ &= \alpha_1 \varphi_i(v_1) + \alpha_2 \varphi_i(v_2) + \alpha_3 \varphi_i(v_3) + \alpha_4 \varphi_i(v_4)\end{aligned}\tag{395}$$

Como $\varphi_i(v_j) = \delta_{ij}$,

$$\varphi_i(v) = \alpha_i\tag{396}$$



Es decir, cada funcional de la base dual extrae la coordenada correspondiente al vector. Por ejemplo, para $i = 3$:

$$v_{\mathcal{B}} = (1, 1, -1, 1) \Rightarrow \varphi_3(v) = \alpha_3 = -1 \quad (397)$$

Ahora busquemos

$$\begin{aligned} (x, y, z, t) &= \alpha(1, 1, 0, -1) + \beta(0, 1, 1, 0) + \gamma(0, 0, 1, 1) + \delta(0, 0, 0, 1) \\ \alpha &= x, \quad \gamma = z - y + x, \\ \beta &= y - x, \quad \delta = y - z + t \end{aligned} \quad (398)$$

Por tanto

$$(x, y, z, t)_{\mathcal{B}} = (x, y - x, x - y + z, y - z + t) \quad (399)$$

Como $\varphi_i(v)$ devuelve la coordenada i de $v_{\mathcal{B}}$ obtenemos las expresiones de la base dual en la base canónica:

$$\begin{aligned} \varphi_1(x, y, z, t) &= x \\ \varphi_2(x, y, z, t) &= y - x \\ \varphi_3(x, y, z, t) &= x - y + z \\ \varphi_4(x, y, z, t) &= y - z + t \end{aligned} \quad (400)$$

Sea

$$\varphi(x, y, z, t) = x - y + z + t \quad (401)$$

Para hallar sus coordenadas en la base dual usamos

$$(\varphi)_{\hat{\mathcal{B}}} = (\varphi(v_1), \varphi(v_2), \varphi(v_3), \varphi(v_4)) \quad (402)$$


Calculamos

$$\begin{aligned} \varphi(v_1) &= 1 - 1 + 0 - 1 = -1 \\ \varphi(v_2) &= 0 - 1 + 1 + 0 = 0 \\ \varphi(v_3) &= 0 - 0 + 1 + 1 = 2 \\ \varphi(v_4) &= 0 - 0 + 0 + 1 = -1 \end{aligned} \quad (403)$$

Luego

$$(\varphi)_{\hat{\mathcal{B}}} = (-1, 0, 2, 1) \quad (404)$$

┘



Definición 2.156 – Espacio bidual

Llamamos espacio bidual de V y lo denotamos $\hat{\hat{V}}$ a

$$\hat{\hat{V}} = \mathcal{L}_K(\hat{V}, K) \quad (405)$$

Proposición 2.157 – Aplicación canónica al bidual

Sea $\sigma : V \rightarrow \hat{\hat{V}}$ una aplicación lineal. Para $v \in V, \varphi \in \hat{V}$:

$$\sigma(v)(\varphi) = \varphi(v) \quad (406)$$

$$\begin{aligned} V &\rightarrow \hat{\hat{V}} \\ v &\rightsquigarrow \hat{v} \rightarrow K \\ \varphi &\rightsquigarrow \varphi(V) \end{aligned} \quad (407)$$

Luego

- $\sigma(v) \in \hat{\hat{V}}$
- σ es lineal e inyectiva
- Si la dimension de V es finita, σ es un isomorfismo.

Demostración 1.158 – (Demostración de linealidad, inyectividad e isomorfismo finito)

Veamos si σ es lineal.

$$\text{¿}\sigma(u + v) = \sigma(u) + \sigma(v), \quad \forall u, v \in V?$$

Tenemos que


$$\sigma(v + u)(\varphi) = \varphi(u + v) = \varphi(u) + \varphi(v) = \sigma(u)(\varphi) + \sigma(v)(\varphi) \quad (408)$$

Y

$$\lambda\sigma(v)(\varphi) = \lambda\varphi(v) = \varphi(\lambda v) = \sigma(\lambda v)(\varphi) \quad (409)$$

Luego es lineal.

Ahora veamos que es inyectiva



$$\begin{aligned} v \in \text{Ker}(\sigma) &\Leftrightarrow \sigma(v)(\varphi) = 0 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \varphi(v) = 0 \Leftrightarrow \sigma_i(v) = 0 (\forall i \in I) \Rightarrow v = \{0\} \end{aligned} \quad (410)$$

Luego σ es inyectiva.

finalmente, veamos que si la dimensión de V es finita, σ es un isomorfismo.

$$\left. \begin{aligned} \dim(V) < \infty &\Rightarrow \dim(\hat{V}) = \dim(V) \\ \dim(\hat{V}) &\dim(\hat{V}) \end{aligned} \right\} \Rightarrow \dim(V) = \dim(\hat{V}) \quad (411)$$

Además, como σ es una aplicación lineal inyectiva, se tiene que σ es un isomorfismo. Es decir

$$V \cong \hat{V} \quad (412)$$

■

Definición 2.159 – Ortogonal o aniquilador

Sea U un subespacio de V , tal que

$$U^* = \{\varphi \in \hat{V} : \varphi(u) = 0, \forall u \in U\} \quad (413)$$

Entonces U^* es un subespacio de $\hat{V}$ llamado ortogonal de U o aniquilador de U .


Nota 2.160 – Convención de dimensión finita

De ahora en adelante, para mayor comodidad, se considerarán espacios vectoriales de dimensión finita,

$$\dim(V) < \infty, \quad (\forall V \text{ posterior a esta nota}) \quad (414)$$

excepto que se especifique lo contrario.

Proposición 2.161 – Dimensión del aniquilador y caracterización de U



Para todo espacio vectorial V , se verifica

1. $\dim(V) = \dim(U) + \dim(U^*)$
2. Si $v \in V$, $v \in U \iff \varphi(v) = 0, \quad \forall \varphi \in U^*$

Demostración 1.162 – (Demostración con extensión de base y base dual)

Sea $\{u_1, \dots, u_r\}$ una base de U .

1.

Como $\{u_1, \dots, u_r\}$ es linealmente independiente, podemos complementar las base para V

$$\{u_1, \dots, u_r, u_{r+1}, \dots, u_n\} \quad (415)$$

Luego U^* es un subespacio de $\hat{V}$ y

$$\widehat{\mathcal{B}}_V = \{\varphi_1, \dots, \varphi_n, \varphi_{n+1}, \dots, \varphi_n\} \quad (416)$$

Veamos que $\{\varphi_{n+1}, \dots, \varphi_k\}$ es base de U^*

$$\left. \begin{array}{l} \widehat{\mathcal{B}}_V \text{ es base de } \hat{V} \\ \{\varphi_{n+1}, \dots, \varphi_k\} \subset \widehat{\mathcal{B}}_V \end{array} \right\} \Rightarrow \{\varphi_{n+1}, \dots, \varphi_K\} \text{ L.I.} \quad (417)$$

$$U^* = \langle \varphi_{n+1}, \dots, \varphi_k \rangle$$


« $\supset$ »

Para cierto $\varphi \in \langle \varphi_{n+1}, \dots, \varphi_k \rangle$, se tiene

$$\begin{aligned} \varphi \in \hat{V} \Rightarrow \varphi &= \sum_{i=1}^k \varphi(u_i) \varphi_i \Rightarrow \varphi(u_i) = 0, \quad (\forall i \in \{1, \dots, n\}) \Rightarrow \\ &\Rightarrow \varphi(u) = 0, \quad (\forall u \in U) \Rightarrow \varphi \in U^* \end{aligned} \quad (418)$$

« $\subset$ »

Sea $\varphi \in U^*$, luego



$$\begin{aligned} \varphi(u_j) = 0 \quad (\forall j \in \{1, \dots, n\}) &\Rightarrow \left(\sum_{i=1}^k \lambda_i \varphi_i \right)(u_j) = \\ &= \sum_{i=1}^k \lambda_i \varphi_i(u_j) = \sum_{i=1}^k \lambda_i \delta_{ij} = 0 \Rightarrow \lambda_i = 0 \quad \forall i \in \{1, \dots, n\} \end{aligned} \quad (419)$$

Por lo tanto $\varphi = \sum_{i=1}^k \lambda_i \varphi_i$ y así $\varphi \in \langle \varphi_{n+1}, \dots, \varphi_k \rangle$.

2.

Sea $v \in V$, $\varphi(v) = 0 \quad \forall \varphi \in U^* \Leftrightarrow v \in U$?

« $\Leftarrow$ »

Se verifica por la definición de U^* .

« $\Rightarrow$ »

Supongamos que $\varphi(v) = 0 \quad \forall \varphi \in U^*$. En concreto se verifica $\varphi_j(u) = 0$, $\forall j \in \{n+1, \dots, k\}$. Entonces

$$0 = \varphi_j \left(\sum_{i=1}^k x_i u_i \right) = \sum_{i=1}^k x_i \varphi_j(u_i) = x_i, \quad i \in \{n+1, \dots, k\} \quad (420)$$

Así que $v = \sum_{i=1}^k x_i u_i \in U$.

■

Observación 1.163 – (Sistema de ecuaciones para describir subespacios)


Sean V un K -espacio vectorial de dimensión n , $\mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_n\}$ una base de V , U un subespacio de V y $\{\varphi_1, \dots, \varphi_s\}$ una base de U^* .

Luego para $v = \sum_{i=1}^n x_i u_i \in V$

$$\begin{aligned} v \in U &\Leftrightarrow \varphi(u) = 0, \quad \forall \varphi \in U^* \Leftrightarrow \varphi_j(u) = 0, \quad \forall j \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow 0 = \varphi_j(u) = \varphi_j \left(\sum_{i=1}^n x_i u_i \right) = \sum_{i=1}^n x_i \varphi_j(u_i) \quad (1 \leq j \leq s) \end{aligned} \quad (421)$$

┘

Ejemplo 1.164 – (Ejemplo pendiente)



Definición 2.165 – Matriz traspuesta

Sea $A = (a_{ij} \in M_{m \times n}(K))$.

Llamamos matriz traspuesta de A , a:

$$A^t = (b_{ij}) : b_{ij} = a_{ji} \quad (422)$$

y

$$A^t \in M_{n \times m}(K) \quad (423)$$

Definición 2.166 – Dual de una aplicación lineal

Sean V, V' K -espacios vectoriales tales que $f : V \rightarrow V'$ es una aplicación lineal.

$$V \xrightarrow{f} V' \xrightarrow{\varphi} K \quad (424)$$

Llamamos dual de f a

$$\hat{f} = \hat{V}' \rightarrow \hat{V} \quad (425)$$


tal que

$$\hat{f}(\varphi) = \varphi \circ f \quad (426)$$

Proposición 2.167 – Matriz del dual como traspuesta

Sean

$$\begin{aligned} \mathcal{B} &= \{v_1, \dots, v_n\} \text{ base de } V \\ \mathcal{B}' &= \{v'_1, \dots, v'_n\} \text{ base de } V' \\ \hat{\mathcal{B}} &= \{\varphi_1, \dots, \varphi_n\} \text{ base de } \hat{V} \\ \hat{\mathcal{B}}' &= \{\Phi_1, \dots, \Phi_n\} \text{ base de } \hat{V}' \end{aligned} \quad (427)$$



Luego se verifica:

$$(\hat{f})_{\hat{\mathcal{B}}'\hat{\mathcal{B}}} = (f)_{\mathcal{B}\mathcal{B}'}^t \quad (428)$$

Demostración 1.168 – (Demostración por evaluación en bases duales)

Sea

$$(f)_{\mathcal{B}\mathcal{B}'} = (a_{ij}) \in M_{m \times n}(K) \quad (429)$$

es decir,

$$f(v_j) = \sum_{i=1}^m a_{ij} v'_i \quad (430)$$

Tomemos un $\Phi_k \in \hat{V}'$ que, por definición

$$\hat{f}(\Phi_k) = \Phi_k \circ f \quad (431)$$

Como $\hat{f}(\Phi_k) \in \hat{V}$, podemos escribirlo en la base dual:

$$\hat{f}(\Phi_k) = \sum_{i=1}^n \hat{f}(\Phi_k)(v_i) \varphi_i \quad (432)$$

Donde

$$\hat{f}(\Phi_k)(v_i) = (\Phi_k \circ f)(v_i) = \Phi_k(f(v_i)) \quad (433)$$

Luego


$$\Phi_k(f(v_i)) = \Phi_k\left(\sum_{r=1}^m a_{ri} v'_r\right) = \sum_{r=1}^m a_{ri} \Phi_k(v'_r) \quad (434)$$

Pero como $\{\Phi_r\}$ es la base dual de $\{v'_r\}$:

$$\Phi_k(v_r) = \delta_{kr} \quad (435)$$

Por tanto

$$\hat{f}(\Phi_k)(v_i) = \sum_{r=1}^m a_{ri} \delta_{kr} = a_{ki} \quad (436)$$



obteniendo

$$\hat{f}(\Phi_k) = \sum_{i=1}^n a_{ki} \varphi_i \quad (437)$$

Esto significa que las coordenadas de $\hat{f}(\Phi_k)$ en la base $\hat{\mathcal{B}}$ son:

$$(a_{k1}, a_{k2}, \dots, a_{kn}) \quad (438)$$

Así que la matriz asociada a $\hat{f}$ es (a_{ki}) , que es precisamente la traspuesta de

$$(a_{ij}) = (f)_{\mathcal{B}\mathcal{B}'} \quad (439)$$

Y en conclusión

$$(\hat{f})_{\hat{\mathcal{B}}'\hat{\mathcal{B}}} = (f)_{\mathcal{B}\mathcal{B}'}^t \quad (440)$$

■

Proposición 2.169 – Traspuesta del producto de matrices

Sean $A \in M_{m \times n}(K)$ y $B \in M_{n \times m}(K)$, luego se verifica

$$(BA)^t = A^t B^t \quad (441)$$

Demostración 1.170 – (Demostración mediante dual de la composición)

Definamos $V \xrightarrow{f} V' \xrightarrow{g} V''$ con bases $\mathcal{B}, \mathcal{B}', \mathcal{B}''$ respectivamente, tales que


$$(g \circ f)_{\mathcal{B}\mathcal{B}''} = BA \quad (442)$$

Luego

$$\left. \begin{array}{ccc} \hat{V}'' & \xrightarrow{\hat{g}} & \hat{V}' & \xrightarrow{\hat{f}} & \hat{V} \\ V & \xrightarrow{f} & V' & \xrightarrow{g} & V'' \end{array} \right\} \Rightarrow \widehat{g \circ f} = \hat{f} \circ \hat{g} \quad (443)$$

Luego,

$$\begin{aligned} (BA)^t &= (\widehat{g \circ f})_{\hat{\mathcal{B}}''\hat{\mathcal{B}}} = (\hat{f} \circ \hat{g})_{\hat{\mathcal{B}}''\hat{\mathcal{B}}} = \\ &= (\hat{g})_{\hat{\mathcal{B}}''\hat{\mathcal{B}}'} (\hat{f})_{\hat{\mathcal{B}}'\hat{\mathcal{B}}} = (g)_{\mathcal{B}'\mathcal{B}''}^t (f)_{\mathcal{B}\mathcal{B}'}^t = B^t A^t \end{aligned} \quad (444)$$



Ejemplo 1.171 – (Ejemplo pendiente)

Proposición 2.172 – Inversa de la traspuesta

Sea $A \in M_n(K)$ una matriz no singular, entonces

$$(A^t)^{-1} = (A^{-1})^t \quad (445)$$

Demostración 1.173 – (Demostración con cambios de base en el dual)

Sean

$$\begin{aligned} \text{id}_V : V &\longrightarrow V & (\mathcal{B}, \mathcal{B}' \text{ bases respectivamente}) \\ \text{id}_{\hat{V}} : \hat{V} &\longrightarrow \hat{V} & (\hat{\mathcal{B}}, \hat{\mathcal{B}}' \text{ bases respectivamente}) \end{aligned} \quad (446)$$

Tales que definen:


$$\begin{aligned} &(\text{id}_V)_{\mathcal{B}\mathcal{B}'} \\ (\text{id}_{\hat{V}})_{\hat{\mathcal{B}}'\hat{\mathcal{B}}} &= (\text{id}_V)_{\mathcal{B}\mathcal{B}'}^t \end{aligned} \quad (447)$$

Luego

$$\left(\left((\text{id}_V)_{\mathcal{B}\mathcal{B}'} \right)^t \right)^{-1} = \left((\text{id}_{\hat{V}})_{\hat{\mathcal{B}}'\hat{\mathcal{B}}} \right)^{-1} = (\text{id}_{\hat{V}})_{\hat{\mathcal{B}}\hat{\mathcal{B}}'} = \left((\text{id}_V)_{\mathcal{B}'\mathcal{B}} \right)^t \quad (448)$$

Ejemplo 1.174 – (Ejemplo pendiente)

Definición 2.175 – Rango



Sea $f : V \longrightarrow V'$ una aplicación lineal, entonces

$$\text{Rango}(f) = \dim(\text{Im}(f)) \quad (449)$$

Lema 2.176 – Núcleo del dual y aniquilador de la imagen

Sea $f : V \longrightarrow V'$ una aplicación lineal. Se verifica

$$\text{Ker}(\hat{f}) = (f(V))^* \quad (450)$$

Demostración 1.177 – (Demostración por equivalencias de definición)

Para $\Phi \in \text{Ker}(\hat{f})$ se tiene

$$\begin{aligned} \hat{f}(\Phi) &= 0 \\ \Leftrightarrow \Phi \circ f &= 0 \\ \Leftrightarrow (\Phi \circ f)(v) &= 0 \quad \forall v \in V \\ \Leftrightarrow \Phi(f(v)) &= 0 \quad \forall v \in V \\ \Leftrightarrow \Phi(f(V)) &= 0 \\ \Leftrightarrow \Phi &\in (f(V))^* \end{aligned} \quad (451)$$

■


Proposición 2.178 – Igualdad de rango entre f y su dual

Siempre se verifica:

$$\text{Rango}(\hat{f}) = \text{Rango}(f) \quad (452)$$

Demostración 1.179 – (Demostración por dimensión y aniquilador)

Por definición:



$$\begin{aligned}
 \text{Rango}(\hat{f}) &= \dim(\text{Im}(\hat{f})) = \dim(\hat{V}') + \dim(\text{Ker}(\hat{f})) = \\
 &= \dim(\hat{V}') - \dim(\text{Im}(f))^* = \dim(v') - \dim(\text{Im}(f))^* = \\
 &= \dim(\text{Im}(f)) = \text{Rango}(f)
 \end{aligned} \tag{453}$$

■

Definición 2.180 – Rango de una matriz por independencia de columnas

Para $A \in M_{m \times n}(K)$, se considera el rango de la matriz como el número máximo de columnas linealmente independientes. Es decir, para

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1,n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \tag{454}$$

se tiene

$$\text{Rango}(A) = \dim(\langle (a_{11}, \dots, a_{m1}), \dots, (a_{1n}, \dots, a_{mn}) \rangle) \tag{455}$$

tal que

$$\{(a_{11}, \dots, a_{m1}), \dots, (a_{1n}, \dots, a_{mn})\} \subset K^m \tag{456}$$

Proposición 2.181 – Rango por columnas, filas y aplicación asociada

Sean $A \in M_{m \times n}(K)$ una matriz y $f : V \rightarrow V'$ una aplicación lineal con $\mathcal{B} = \{u_1, \dots, u_n\}$ base de V y $\mathcal{B}' = \{v_1, \dots, v_n\}$ base de V' .


Sabemos

$$\text{Im}(f) = \langle f(u_1), \dots, f(u_r) \rangle \subset V' \tag{457}$$

Luego

$$\text{Rango}(f) = \dim(\langle f(u_1), \dots, f(u_r) \rangle) \tag{458}$$

Por lo que considerando un isomorfismo



$$\chi_{\mathcal{B}'} : V' \longrightarrow K^m \quad (459)$$

Se tiene:

$$\text{Rango}(A) = \text{Rango}(f) = \text{Rango}(\hat{f}) = \text{Rango}(A^t) \quad (460)$$

Por lo tanto es equivalente medir el rango por columnas que por filas de una matriz.

Proposición 2.182 – Caracterización de no singularidad por rango

Sea $A \in M_n(K)$, luego

$$\text{Rango}(A) = n \iff A \text{ es no singular} \quad (461)$$

Demostración 1.183 – (Demostración por sobreyectividad de la aplicación asociada)

Tenemos

$$\text{Rango}(A) = n \iff \text{Rango}(f) = n \iff \dim(\text{Im}(f)) = n \quad (462)$$

Luego suponiendo

$$(f)_{\mathcal{B}\mathcal{B}} = A \Rightarrow \text{Im}(f) \subset V \quad (463)$$

Entonces,


$$\left. \begin{array}{l} \text{Im}(f) \subset V \\ \dim(v) = n \end{array} \right\} \Rightarrow \text{Im}(f) = V \iff f \text{ es sobreyectiva} \iff \quad (464)$$

$$\iff f \text{ es isomorfismo} \iff A \text{ es no singular}$$

■

Lema 2.184 – Forma canónica de una aplicación de rango r

Sea $f : V \longrightarrow V'$ una aplicación lineal tal que $\text{Rango}(f) = r$.



Entonces existen $\mathcal{B}$ base de V y $\mathcal{B}'$ base de V' tal que

$$(f)_{\mathcal{B}\mathcal{B}'} = \begin{pmatrix} I_r & \vdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \\ 0 & \vdots & 0 \end{pmatrix} \quad (465)$$

Demostración 1.185 – (Demostración construyendo bases adaptadas)

Sea $\{v_{r+1}, \dots, v_n\}$ una base del $\text{Ker}(f)$.

La complementamos de tal manera que quede una base de V :

$$\{v_1, \dots, v_r, v_{r+1}, \dots, v_n\} = \mathcal{B} \quad (466)$$

Entonces

$$\left. \begin{array}{l} \langle f(v_1), \dots, f(v_r) \rangle = \text{Im}(f) \\ \dim(\text{Im}(f)) = r \end{array} \right\} \Rightarrow \{f(v_1), \dots, f(v_r)\} \text{ es L.I.} \quad (467)$$

Por lo tanto, cada $f(v_i)$ es una combinación lineal de la siguiente manera:

$$\begin{aligned} f(v_1) &= 1f(v_1) + 0f(v_2) + \dots + 0f(v_r) \\ &\vdots \\ f(v_r) &= 0f(v_1) + \dots + 0f(v_{r-1}) + 1f(v_r) \end{aligned} \quad (468)$$

Por lo que


$$f(\mathcal{B}) = \mathcal{B}' \quad (469)$$

y la matriz asociada es de la forma

$$(f)_{\mathcal{B}\mathcal{B}'} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (470)$$

En la que el cuadrado superior derecho coincide con las combinaciones lineales de v_1 hasta v_r y el resto, todo ceros, es el completamiento de la base.

■



Corolario 2.186 – Forma canónica equivalente para matrices de rango r

Sea $A \in M_{m \times n}(K)$ una matriz de rango r , esto significa que las matrices

$$A \quad \text{y} \quad \begin{pmatrix} I_r & : & 0 \\ \dots & & \dots \\ 0 & : & 0 \end{pmatrix} \quad (471)$$

son equivalentes.

Demostración 1.187 – (Demostración vía aplicación lineal asociada)

Sea $A \in M_{m \times n}(K)$, luego existe

$$(f)_{\mathcal{B}_1 \mathcal{B}_2} = A \Rightarrow A \sim \begin{pmatrix} I_r & : & 0 \\ \dots & & \dots \\ 0 & : & 0 \end{pmatrix} \quad (472)$$

■

Proposición 2.188 – Equivalencia de matrices y coincidencia de rango


Sean $A, B \in M_{m \times n}(K)$, entonces

$$A \sim B \Leftrightarrow \text{Rango}(A) = \text{Rango}(B) \quad (473)$$

Demostración 1.189 – (Demostración de equivalencia por forma canónica)

« $\Leftarrow$ »

Tenemos



$$\left. \begin{array}{l} \text{Rango}(A) = r \Rightarrow A \sim \begin{pmatrix} I_r & \vdots & 0 \\ \dots & \dots & \dots \\ 0 & \vdots & 0 \end{pmatrix} \\ \text{Rango}(B) = r \Rightarrow B \sim \begin{pmatrix} I_r & \vdots & 0 \\ \dots & \dots & \dots \\ 0 & \vdots & 0 \end{pmatrix} \end{array} \right\} \Rightarrow A \sim B \quad (474)$$

« $\Rightarrow$ »

Sabemos que por estar relacionados, existe

$$\begin{aligned} A = (f)_{\mathcal{B}\mathcal{B}'} &\Rightarrow \text{Rango}(A) = \text{Rango}(f) \\ A = (f)_{\mathcal{B}_1\mathcal{B}'_1} &\Rightarrow \text{Rango}(B) = \text{Rango}(f) \end{aligned} \quad (475)$$

Por lo que

$$\text{Rango}(A) = \text{Rango}(B) \quad (476)$$

■


Definición 2.190 – Matrices elementales

Ya definimos anteriormente en la Definición 156 una matriz elemental que utilizaremos para construir las siguientes:

$$T_{ij}(\lambda) = I + \lambda E_{ij} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \dots & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \dots & 0 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & \lambda & \dots & 1 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & \dots & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & \dots & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (i \neq j) \quad (477)$$

con el λ en la posición ij .

$$D_i(\lambda) = I + (\lambda - 1)E_{ii} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \lambda & \dots & 1 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 0 & \dots & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 & \dots & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (\lambda \neq 0) \quad (478)$$



de manera que λ queda a lo largo de la diagonal.

$$P_{ij} = I - E_{ii} - E_{jj} + E_{ij} + E_{ji} =$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & \dots & 0 & \dots & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & \dots & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 1 & \dots & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & \dots & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix} \quad (479)$$

tal que se cambiaron por ceros los unos de la diagonal en las posiciones i, j y se sustituyeron por los ceros en los encuentros de estos dos índices.

Definición 2.191 – Operaciones elementales por filas

Consideraremos las siguientes operaciones elementales. Sea la matriz A , entonces podemos:

- «Sumar el múltiplo de otra fila»

$$T_{ij}(\lambda)A = (I + \lambda E_{ij})A = A + \lambda E_{ij}A \quad (480)$$

que se denota:

$$F_{i(A)} + \lambda F_j(A) \quad (481)$$

donde a la fila i de la matriz A le estamos sumando λ veces la fila j de A .

- «Multiplicar una fila por un escalar»

$$D_i(\lambda)A = (I + (\lambda - 1)E_{ii})A = A(\lambda - 1)E_{ii}A \quad (482)$$


que se denota:

$$\lambda F_i(A) \quad (483)$$

y a la fila i de A se le está multiplicando λ a cada elemento.

- «Intercambio de filas»

$$P_i A \quad (484)$$



que se denota:

$$F_i(A) \leftrightarrow F_j(A) \quad (485)$$

y se pasa la fila i de A a la posición j y viceversa.

Nota 2.192 – Notación alternativa de operaciones elementales

Otra notación para cada una de las operaciones puede ser:

$$\begin{aligned} T_{ij}(\lambda) &\equiv E_{F_i \leftarrow \lambda F_j} \\ D_i(\lambda) &\equiv E_{\lambda F_i} \\ P_{ij} &\equiv E_{F_i \leftrightarrow F_j} \end{aligned} \quad (486)$$

Además, si se multiplicase la matriz A por la derecha en lugar de por la izquierda, las operaciones serían por columnas.

Definición 2.193 – Matriz escalonada


Una matriz $A \in M_{m \times n}(K)$ está escalonada si sus vectores fila $F_1(A), \dots, F_m(A)$ están escalonados. Es decir:

1. Las filas nulas están debajo.
2. Los pivotes de cada una están a la izquierda de los de las filas siguientes.

Y diremos que está escalonada reducida si los pivotes son 1's y en las columnas de los pivotes todos los coeficientes son 0 salvo el pivote.

Ejemplo 1.194 – (Ejemplo pendiente)

┘



Definición 2.195 – Equivalencia por filas

Las matrices A y B son equivalentes por filas si existen matrices elementales $E_1, \dots, E_q$ tales que

$$E_q \cdot \dots E_1 \cdot A = B \quad (487)$$

Proposición 2.196 – Equivalencia por filas implica equivalencia

Si dos matrices son equivalentes por filas entonces las matrices son equivalentes.

Demostración 1.197 – (Demostración por invertibilidad de matrices elementales)


Al ser todas las matrices elementales, no singulares, la definición de equivalencia por filas verifica la de equivalencia:

$$\begin{aligned} (T_{ij}(\lambda))^{-1} &= T_{ij}(-\lambda) \\ (D_i(\lambda))^{-1} &= D_i(\lambda^{-1}) \\ (P_{ij})^{-1} &= P_{ji} = P_{ij} \end{aligned} \quad (488)$$

■

Proposición 2.198 – Existencia de forma escalonada y unicidad reducida

Toda matriz es equivalente por filas a una matriz escalonada y es equivalente por filas a una única matriz escalonada reducida.



Proposición 2.199 – Criterio de no singularidad por equivalencia con I_n

Sea la matriz $A \in M_n(K)$. Son equivalentes:

1. A es no singular.
2. A y I_n son equivalentes por filas.

Demostración 1.200 – (Demostración del criterio por operaciones elementales)

2. $\Rightarrow$ 1.

Por ser A equivalente por filas a I_n , existen matrices elementales $E_1, \dots, E_q$ tales que

$$E_q \cdot \dots \cdot E_1 \cdot I_n = A \quad (489)$$

Luego sabemos que existe la inversa del lado izquierdo:

$$A^{-1} = E_1^{-1} \cdot \dots \cdot E_q^{-1} \quad (490)$$


1. $\Rightarrow$ 2

Sea B una matriz escalonada quivalente por filas a A de manera que A es no singular. Luego B es no singular, entonces

$$\left. \begin{array}{l} B \text{ no tiene filas de ceros} \\ B \text{ tiene } n \text{ pivotes} \end{array} \right\} \Rightarrow \quad (491)$$

$$\Rightarrow B = I_n$$

■



3 | Sistemas de ecuaciones lineales

Definición 3.201 – Sistema de ecuaciones lineales

Sea K un cuerpo. Un sistema con m ecuaciones lineales y n incógnitas con coeficientes en K es

$$S \equiv \begin{cases} a_{11}x_1 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + \dots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \quad \ddots \quad \vdots \quad \vdots \\ a_{m1}x_1 + \dots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases} \quad (492)$$

tal que

$$a_{ij}, b_i \in K, \quad (1 \leq i \leq m, \quad 1 \leq j \leq n) \quad (493)$$

Definición 3.202 – Solución del sistema de ecuaciones


Un $\alpha = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) \in K^n$ es solución de un sistema de ecuaciones lineales S sí y solo sí se verifica

$$\begin{aligned} a_{11}\alpha_1 + \dots + a_{1n}\alpha_n &= b_1 \\ \vdots \quad \quad \quad \ddots \quad \quad \quad \vdots \quad \quad \quad \vdots \\ a_{m1}\alpha_1 + \dots + a_{mn}\alpha_n &= b_m \end{aligned} \quad (494)$$

Definición 3.203 – Componentes de S

En un sistema de ecuaciones distinguimos los siguientes componentes:

- $a_{ij} \rightarrow$ Coeficientes del sistema,
- $b_i \rightarrow$ terminos independientes,
- $x_i \rightarrow$ incógnitas.



Definición 3.204 – Clasificación por número de soluciones

Para S un sistema de ecuaciones se tiene:

1. S es compatible si tiene solución.
 - Si la solución es única es compatible determinado (S.C.D.),
 - Si tiene más de una solución es compatible indeterminado (S.C.I).
2. S es incompatible si no tiene solución (S.I.).

Observación 3.205

Si el cuerpo sobre el que se trabaja es finito, que el sistema sea compatible indeterminado no implica que tenga soluciones infinitas.

┘

Ejemplo 3.206

Considerando un sistema de ecuaciones lineal sencillo

$$\{x + y = 0 \quad (495)$$

podemos afirmar que es un sistema de ecuaciones compatible indeterminado (aunque lo demostraremos a continuación) por tener 1 ecuación y 2 incógnitas.

Si trabajamos sobre $\mathbb{R}$, cuerpo infinito, lo solucionamos:

$$x + y = 0 \Rightarrow x = -y \quad (496)$$

tomando $y = t$ con $t \in \mathbb{R}$ tenemos

$$(x, y) = (-t, t) \in \mathbb{R}^2 \quad (497)$$


luego

$$\{(-t, t) : t \in \mathbb{R}\} \quad (498)$$

por lo que hay infinitas soluciones.

Pero si cambiamos el cuerpo sobre el que trabajamos a $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ finito tal que

$$\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} = \{0, 1\} \quad (499)$$



donde $1 + 1 = 0$, la misma ecuación se solucionaría:

- Si $x = 0$:

$$0 + y = 0 \Rightarrow y = 0, \quad (500)$$

- Si $x = 1$:

$$1 + y = 0 \Rightarrow y = 1. \quad (501)$$

Luego las soluciones son

$$(0, 0), (1, 1) \quad (502)$$

┘

Nota

En general se verificará que un sistema compatible indeterminado de un sistema de ecuaciones lineal sobre un cuerpo K finito tendrá

$$|K|^n \quad (503)$$

soluciones, donde n es el número de variables independientes.

Definición 3.208 – Matriz y matriz ampliada de S

Consideramos


$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \in M_{m \times n}(K) \quad (504)$$

es la matriz del sistema de ecuaciones S .

Asimismo

$$(A|B) = \left(\begin{array}{ccc|c} A & & & b_1 \\ & & & \vdots \\ & & & b_m \end{array} \right) \quad (505)$$

es su matriz ampliada.

**Observación 3.209**

Si tenemos

$$B = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}, \quad X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \quad (506)$$

entonces

$$AX = B \quad (507)$$

y se tiene que

$$\alpha \text{ es solución} \iff A \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}. \quad (508)$$

┘

Proposición 3.210

Sea $f : K^n \longrightarrow K^m$ una aplicación lineal tal que

$$(f)_{\mathcal{C}\mathcal{C}'} = A \quad (509)$$

luego $\alpha \in K^n$ es solución de $AX = B$ si y solo si


$$f(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = (b_1, \dots, b_m) \quad (510)$$

Proposición 3.211

Un sistema tiene solución si y solo si

$$b \in \text{Im}(f). \quad (511)$$

Proposición 3.212



Un sistema es compatible si y solo si

$$\text{Rango}(A) = \text{Rango}(A|B) \quad (512)$$

Demostración 3.213

Por ser S compatible,

$$\begin{aligned} b \in \text{Im}(F) &\iff \text{Im}(f) = \text{Im}(f) + \langle b \rangle \iff \\ &\iff \dim(\text{Im}(f)) = \dim(\text{Im}(f) + \langle b \rangle) \iff \\ &\iff \text{Rango}(A) = \text{Rango}(A|B) \end{aligned} \quad (513)$$

■

Proposición 3.214

Sea $AX = B$ un sistema compatible, es decir, existe $\alpha \in K^n$ solución, luego

$$\beta \in K^n \Rightarrow f(\beta) = b. \quad (514)$$

así

$$\begin{aligned} f(\alpha) = f(\beta) &\Rightarrow f(\alpha - \beta) = 0 \Rightarrow \alpha - \beta \in \text{Ker}(f) \Rightarrow \\ &\Rightarrow \exists \delta \in \text{Ker}(f) : \beta = \alpha + \delta. \end{aligned} \quad (515)$$


Ejemplo 3.215

Sea el sistema de ecuaciones

$$S \equiv \begin{cases} y - z = 0 \\ x - 3z = -1 \\ -x + 3y = 1 \end{cases} \quad (516)$$

se tiene que $\alpha = (-1, 0, 0)$ es solución. Pero, ¿hay más?

Por la proposición anterior sabemos que



$$\{\text{Soluciones de } S\} = \alpha + \text{Ker}(f) \quad (517)$$

luego

$$(f)_{\mathcal{C}\mathcal{C}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 3 \\ -1 & 3 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y - z \\ x + 3z \\ -x + 3y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (518)$$

Así,

$$\text{Ker}(f) = \left\{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : \begin{matrix} y - z \\ x + 3z \\ -x + 3y \end{matrix} \right\} = \{(3z, z, z) : z \in R\} \neq \{0\} \quad (519)$$

Por lo que todas las soluciones de S serán

$$\{(-1, 0, 0) + (3\lambda, \lambda, \lambda) : \lambda \in R\} = \{(-1 + 3\lambda, \lambda, \lambda) : \lambda \in \mathbb{R}\} \quad (520)$$

┘

Teorema 3.216 – Teorema de Rouché-Frobenius

Un sistema $AX = B$ tal que tiene n incógnitas es:

- compatible $\iff \text{Rango}(A) = \text{Rango}(A|B) = r$
 - compatible determinado $\iff r = n$,
 - compatible indeterminado $\iff r < n$,
- incompatible $\iff \text{Rango}(A) \neq \text{Rango}(A|B)$.


Corolario 3.217

Sea $S \equiv AX = B$ un sistema de ecuaciones y $A \in M_{n \times n}(K)$.

$$S \text{ es C.D.} \iff A \text{ es no singular} \quad (521)$$

Demostración 3.218

« $\iff$ »



Supongamos que existe A^{-1} , luego

$$AX = B \Rightarrow A^{-1}AX = A^{-1}B \Rightarrow X = A^{-1}B \quad (522)$$

que es solución.

« $\Rightarrow$ »

Por ser S C.D. tenemos que

$$\text{Ker}(f) = \{0\} \Rightarrow f \text{ inyectiva} \Rightarrow f \text{ biyectiva} \Rightarrow A \text{ no singular} \quad (523)$$

■

Definición 3.219 – Sistema homogéneo

Un sistema de ecuaciones lineales es homogéneo si $B = 0$, es decir:

$$AX = 0 \quad (524)$$

Observación 3.220

Los sistemas homogéneos siempre son compatibles y $(0, \dots, 0)$ es solución.

┘


Definición 3.221 – Equivalencia de sistemas

Dos sistemas son equivalentes si tienen las mismas soluciones.

Definición 3.222 – Operaciones elementales en S

Una operación elemental en un sistema S es

1. Intercambiar dos ecuaciones.
2. Multiplicar una ecuación por un escalar distinto de 0.
3. A una ecuación sumarle un múltiplo de otra.



Estas ecuaciones están en correspondencia biunívoca con las operaciones elementales de la matriz ampliada.

Proposición 3.223

Sea S un sistema $AX = B$ y S' el sistema obtenido tras hacer en S operaciones elementales. Luego S y S' son equivalentes

Demostración 3.224

Consideremos el conjunto de operaciones elementales:

$$(A|B) \longrightarrow \dots \longrightarrow \dots \longrightarrow (EA|EB) \quad (525)$$

$\xrightarrow{E}$

Si α es solución de S ,

$$A\alpha^t = B \iff EA\alpha^t = EB \quad (526)$$

Luego α es solución de S' .

■

Definición 3.225 – Sistema escalonado


Un sistema S es escalonado si su matriz ampliada es escalonada.

Ejemplo 3.226

Consideremos el sistema de ecuaciones lineales

$$S \equiv \begin{cases} x - 3y + z = 1 \\ 2x - y - 2z = 2 \\ x + 2y - 3z = -1 \end{cases} \quad (527)$$

Escalonamos la matriz asociada para resolver



$$\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & -3 & -1 \end{array} \rightarrow \begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & 1 & 1 \\ 0 & 5 & -4 & 0 \\ 0 & 5 & -4 & -2 \end{array} \rightarrow \begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & 1 & 1 \\ 0 & 5 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{array} \quad (528)$$

Luego podemos ver que el la matriz A escalonada no es linealmente independiente luego no es invertible, por lo que es un sistema incompatible ($\text{Rango}(A) \neq \text{Rango}(A|B)$).

Además la última fila del sistema significa

$$0x + 0y + 0z = 2 \Rightarrow 0 = 2 \quad (529)$$

lo cual no es posible, por eso es incompatible.

┘

Ejemplo 3.227

Consideremos el siguiente sistema

$$S \equiv \begin{cases} x - y + z = a - 1 \\ 2x + y + az = a \\ x + ay + z = 1 \end{cases} \quad (530)$$

Escalonando

$$\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & a-1 \\ 2 & 1 & a & a \\ 1 & a & 1 & 1 \end{array} \rightarrow \begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & a-1 \\ 0 & -1 & a-2 & -a+2 \\ 0 & a-1 & 0 & -a+2 \end{array} \quad (531)$$

Luego en función del parámetro a , distinguimos los siguientes casos:

- Si $a = 2$

$$\text{Rango}(A|B) = 1 = \text{Rango}(A) < 3 \quad (532)$$


Luego el sistema será compatible indeterminado.

- Si $a = 1$

$$\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{array} \quad (533)$$

Luego es incompatible el sistema.


- Si $a \neq 1$ y $a \neq 2$




$$\text{Rango}(A|B) = \text{Rango}(A) = 3 \quad (534)$$

Así que, por el teorema de Rouché-Frobenius, el sistema sería compatible determinado.


┘



4 | Determinantes



5 | Clasificación de endomorfismos



6 | Boletín 1

Ejercicio 6.228

Sean $V = \mathbb{R}$ y $*$ la operación definida en $\mathbb{R}$ por $a * b = a^2b$. Con la suma usual y la multiplicación por escalares dada por $*$, ¿es V un espacio vectorial sobre $\mathbb{R}$?

Solución 6.229

Por completar



Ejercicio 6.230

Sea $V \neq \{0\}$ un espacio vectorial sobre $\mathbb{R}$. Para cada v de V y cada número complejo $a + bi$, definimos $(a + bi) \cdot v = bv$. Con esta nueva multiplicación por escalares, ¿es V un espacio vectorial sobre $\mathbb{C}$?

Solución 6.231


Por completar



Ejercicio 6.232


Dá un ejemplo de espacio vectorial con 4 elementos.

Solución 6.233



Por completar





7 | Boletín 3

Ejercicio 6.234

Estudia cuales de las siguientes aplicaciones $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ son lineales:

$$\begin{aligned} \text{(a)} \quad f(x, y, z) &= (x, 1, z), & \text{(b)} \quad f(x, y, z) &= (y, z, 0), \\ \text{(c)} \quad f(x, y, z) &= (2x, y, 3y), & \text{(d)} \quad f(x, y, z) &= (x - 1, x, y). \end{aligned} \quad (535)$$

Solución 6.235

(a) Recordemos que para ser lineal, la función debe cumplir que $f(0) = 0$, pero en este caso $f(0, 0, 0) = (0, 1, 0) \neq (0, 0, 0)$ por lo que no es lineal.

(b) Esta función cumple que $f(0) = 0$, veamos si $f(u + v) = f(u) + f(v)$.

$$\begin{aligned} f(u + v) &= f((x, y, z) + (x', y', z')) = f(x + x', y + y', z + z') = \\ &= (y + y', z + z', 0) = (y, z, 0) + (y', z', 0) = f(x, y, z) + f(x', y', z') \quad (536) \\ &= f(u) + f(v) \end{aligned}$$

Para el producto por escalares, $f(\lambda u) = \lambda f(u)$:

$$f(\lambda u) = f(\lambda(x, y, z)) = \lambda(y, z, 0) = \lambda f(x, y, z) \quad (537)$$

Luego es lineal.

(c) Como cumple que $f(0) = 0$, veamos las condiciones de linealidad:

$$\begin{aligned} f(u + v) &= f(x + x', y + y', z + z') = (2(x + x'), y + y', 3(y + y')) = \\ &= (2x, y, 3y) + (2x', y', 3y') = f(u) + f(v) \quad (538) \\ f(\lambda u) &= f(\lambda(x, y, z)) = \lambda(2x, y, 3y) = \lambda f(x, y, z) \end{aligned}$$


Por lo que es lineal.

(d) Esta función no cumple que $f(0) = 0$ pues

$$f(0, 0, 0) = (0 - 1, 0, 0) = (-1, 0, 0) \neq (0, 0, 0) \quad (539)$$

Por lo que no es lineal.



**Ejercicio 6.236**

Estudia si la aplicación $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida por $f(x, y, z) = (0, x - y, y)$ es lineal y en caso afirmativo estudia $\text{Ker}(f)$ y $\text{Im}(f)$.

Solución 6.237

■

┘

Ejercicio 6.238

Sea $f : \mathbb{R}_3[X] \rightarrow \mathbb{R}_3[X]$ tal que $f(p(X)) = p'(X)$ (polinomio derivado). a) Prueba que f es lineal. b) Calcula $f^{-1}(6X^2 - 5X + 4)$. c) Calcula $\text{Ker}(f)$ e $\text{Im}(f)$.

Solución 6.239

■

┘

Ejercicio 6.240

Sea V un espacio vectorial sobre un cuerpo K y f un endomorfismo de V . Prueba que $W = \{v \in V : f(v) = v\}$ es un subespacio vectorial de V .


Solución 6.241

■

┘

Ejercicio 6.242

Sea $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ la aplicación lineal definida por $f(1, 0, 0) = (2, 1, 0)$, $f(0, 1, 0) = (1, 0, 0)$ y $f(0, 0, 1) = (3, 1, 0)$. Calcula $\text{ker}(f)$ y $\text{im}(f)$. Estudia si f es inyectiva o sobreyectiva.

**Solución 6.243**

■

┘

Ejercicio 6.244

En $\mathbb{R}_2[X]$ se considera el subespacio $U = \{a + bX^2 : a, b \in \mathbb{R}\}$.

1. Encuentra $S, S' \subset U$ tales que $S \neq S'$ y $\langle S \rangle = \langle S' \rangle = U$.
2. Prueba que $\langle 2x + U \rangle = \mathbb{R}_2[X]/U$.

Solución 6.245

■

┘

Ejercicio 6.246

Sea $U = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x + y - z = 0\}$. Razona si, en $\mathbb{R}^3/U$, las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas:

1. $(1, 2, 3) + U = (0, 2, 2) + U = U$.
2. Existe un único $\alpha \in \mathbb{R}$ tal que $(1, 0, 2) + U = \alpha((1, 1, 1) + U)$.

Solución 6.247

■


┘


Ejercicio 6.248

Considera el $\mathbb{R}$ -espacio vectorial $V = \mathbb{R}_5[X]$ y el subespacio $U = \mathbb{R}_2[X]$. ¿Qué significa, para los polinomios $p(X) = \sum_{i=0}^5 \alpha_i X^i$ y $q(X) = \sum_{i=0}^5 b_i X^i$, que $p(X) + U = q(X) + U$?

Solución 6.249

■





Bibliography