


Posterior Probability

$$P(C_1|x) = \frac{P(x|C_1)P(C_1)}{P(x|C_1)P(C_1) + P(x|C_2)P(C_2)}$$

$$= \frac{1}{1 + \frac{P(x|C_2)P(C_2)}{P(x|C_1)P(C_1)}} = \frac{1}{1 + \exp(-z)} = \sigma(z)$$

Sigmoid function

$$z = \ln \frac{P(x|C_1)P(C_1)}{P(x|C_2)P(C_2)}$$


$$P(C_1|x) = \sigma(z)$$

$$z = \ln \frac{|\Sigma^2|^{1/2}}{|\Sigma^1|^{1/2}} - \frac{1}{2} x^T (\Sigma^1)^{-1} x + (\mu^1)^T (\Sigma^1)^{-1} x - \frac{1}{2} (\mu^1)^T (\Sigma^1)^{-1} \mu^1$$

$$+ \frac{1}{2} x^T (\Sigma^2)^{-1} x - (\mu^2)^T (\Sigma^2)^{-1} x + \frac{1}{2} (\mu^2)^T (\Sigma^2)^{-1} \mu^2 + \ln \frac{N_1}{N_2}$$

$$\Sigma_1 = \Sigma_2 = \Sigma$$

$$z = \underbrace{(\mu^1 - \mu^2)^T \Sigma^{-1} x}_{\mathbf{w}^T} - \underbrace{\frac{1}{2} (\mu^1)^T \Sigma^{-1} \mu^1 + \frac{1}{2} (\mu^2)^T \Sigma^{-1} \mu^2}_{b} + \ln \frac{N_1}{N_2}$$

$$P(C_1|x) = \sigma(\mathbf{w} \cdot x + b)$$

How about directly find \mathbf{w} and b ?

In generative model, we estimate $N_1, N_2, \mu^1, \mu^2, \Sigma$

Then we have \mathbf{w} and b