
L'Oucane de Chabrières, un karst alpin, Réallon (Hautes-Alpes)



L'Oucane appartient à l'écaille briançonnaise de Chabrières, arrachée par la nappe de flysch à Helminthoïdes à son passage sur le Briançonnais.

Carte géologique BRGM 1988, n° 870 feuille Chorges

0 500 1000 2000 m

Échelle 1/50 000, 1 cm = 500 m

Le karst de l'Oucane est développé dans d'épais calcaires et dolomies du Trias/Malm

Série briançonnaise des nappes de l'Embrunais-Ubaye


- **c-e** Calcschistes planctoniques (Crétacé supérieur-Paléocène)
- js Calcaires fins blancs et noduleux rouges "Guillestre"
- jm Calcaires gris massifs (Dogger)
- tC Calcaires, dolomies et brèches (Anisien-Ladinien)

Formations superficielles et quaternaires

- C Colluvions (formation superficielle et quaternaire)
- G Formations glaciaires, moraines

Carte géologique BRGM 1988, n° 870 agrandie au 1/15 000

0 100 500 m Échelle 1/15 000, 1 cm = 150 m



© BRGM, juin 2004. © IGN-Paris, 1994

BRGM, juin 2004. © IGN-Paris, 1994