

## Pli anténummulitique des Gondouins, Champoléon (Hautes-Alpes)



Le pli anténummulitique des Gondouins vu du hameau des Gondouins. Schéma Jacques Debelmas.



Le pli anténummulitique des Gondouins vu du parking des Baumes. Schéma Jacques Debelmas.

TR Surface de transgression érodée sur laquelle la mer revient au Priabonien (42 Ma)

Couverture sédimentaire, Cénozoïque (Tertiaire) :		Âge des terrains	
GrCh Grès du Champsaur (Oligocène)		38 Ma	
Cn	Calcaires à Nummulites (Priabonien)	42 Ma	Âge du plissement
Couverture sédimentaire, Mésozoïque (Secondaire) :			entre 97 et 65 Ma
Aal. inf.	Aalénien inférieur, calcaires marneux noirs à patine gris clair	188 Ma	Crétacé supérieur
Ts	Toarcien supérieur, marnes noires schisteuses		
Tim	Toarcien inférieur à moyen, calcaires marneux feuilletés	194 Ma	
Ds	Domérien supérieur, marnes noires		
Dm	Domérien moyen, marno-calcaires lités à patine ocre		
Di	Domérien inférieur, marnes noires		
Lc	Lias inférieur calcaire, calcaires gris	200 Ma	
Roches magmatiques volcaniques intrusives, Mésozoïque (Secondaire):			
Sp :	Spilites, roches basaltiques en coulées superposées (Trias)	215 Ma	
Socle cristallin, Paléozoïque (Primaire)			

480 Ma

Jacques Debelmas, 2003.

Gneiss œillés de Crupillouse (Cambro-Ordovicien)

Cr