

2)0.0 Изначальная грамматика:

- $S \rightarrow RS \mid R$
- $R \rightarrow aSb \mid cRd \mid ab \mid cd \mid \epsilon$

0.1 Давайте вначале избавимся от смешанных и длинных терминальных правил :

- $S \rightarrow RS \mid R$
- $R \rightarrow ASB \mid CRD \mid AB \mid CD \mid \epsilon$
- $A \rightarrow a; B \rightarrow b; C \rightarrow c; D \rightarrow d$

1. Избавляемся от длинных правил:

- $S \rightarrow RS \mid R$
- $R \rightarrow AB_1 \mid CD_1 \mid AB \mid CD \mid \epsilon$
- $A \rightarrow a; B \rightarrow b; C \rightarrow c; D \rightarrow d$
- $B_1 \rightarrow SB; D_1 \rightarrow RD$

2.  $\epsilon$ -правила

Нетерминалы S и R являются  $\epsilon$ -порождающими, поэтому для них добавляем нужные правила:

- $S \rightarrow RS \mid R \mid \epsilon$
- $R \rightarrow AB_1 \mid CD_1 \mid AB \mid CD \mid \epsilon$
- $A \rightarrow a; B \rightarrow b; C \rightarrow c; D \rightarrow d$
- $B_1 \rightarrow SB \mid B; D_1 \rightarrow RD \mid D$

Убираем  $\epsilon$ -правила:

- $S \rightarrow RS \mid R \mid \epsilon$
- $R \rightarrow AB_1 \mid CD_1 \mid AB \mid CD$
- $A \rightarrow a; B \rightarrow b; C \rightarrow c; D \rightarrow d$
- $B_1 \rightarrow SB \mid B; D_1 \rightarrow RD \mid D$

3. Новое стартовое:

- $S_1 \rightarrow S \mid \epsilon$
- $S \rightarrow RS \mid R$
- $R \rightarrow AB_1 \mid CD_1 \mid AB \mid CD$
- $A \rightarrow a; B \rightarrow b; C \rightarrow c; D \rightarrow d$
- $B_1 \rightarrow SB \mid B; D_1 \rightarrow RD \mid D$

4. Убираем унарные правила, замыкая цыпочки:

- $S_1 \rightarrow RS \mid AB_1 \mid CD_1 \mid AB \mid CD \mid \epsilon$

- $S \rightarrow RS \mid AB_1 \mid CD_1 \mid AB \mid CD$
- $R \rightarrow AB_1 \mid CD_1 \mid AB \mid CD$
- $A \rightarrow a; B \rightarrow b; C \rightarrow c; D \rightarrow d$
- $B_1 \rightarrow SB \mid b; D_1 \rightarrow RD \mid d$

5. Получилась нормальная форма Хомского!

3) Этот язык является контекстно-свободным, предъявим КС-грамматику:

- $S \rightarrow aaZ \mid aZb \mid bbT$
- $Z \rightarrow aaZ \mid aZb \mid bbT$
- $T \rightarrow bbT$
- $Z \rightarrow \epsilon$
- $T \rightarrow \epsilon$

Нетерминированные состояния - это  $S, Z, T$ , стартовое состояние -  $S$

1. Докажем, что мы получаем все слова вида  $a^n b^m$ , где  $m + n > 0$ ,  $(m + n)$  делится на 2

- Если букв  $a$  чётное количество, то так как сумма тоже чётная, то и букв  $b$  чётное количество, значит можно просто сделать так:

$S \rightarrow aaZ \rightarrow aaaaZ \rightarrow \dots \rightarrow a^n Z \rightarrow a^n bbT \rightarrow a^n bbbbT \rightarrow \dots \rightarrow a^n b^m$   
 ( $n$  и  $m$  чётные, значит можно добавлять по две буквы)

- Если  $n$  нечетное, то так как сумма чётная, то и  $m$  нечетное

Тогда можно сделать так:

$S \rightarrow aaZ \rightarrow \dots \rightarrow a^{n-1} Z \rightarrow a^n Zb \rightarrow a^n bbbT \rightarrow \dots \rightarrow a^n b^m$

То есть мы  $(n - 1)/2$  раз применяем правило  $Z \rightarrow aaZ$ , один раз правило  $Z \rightarrow aZb$  и правило  $Z \rightarrow bbT$ , и  $(m - 1)/2$  раз правило  $T \rightarrow bbT$

2. Докажем, что мы не получаем ничего лишнего

- Пустое слово получить невозможно, так как из стартового символа  $S$  все переходы сразу дают хотя бы 1 букву

- Все слова имеют вид  $a^n b^m$ , так как во всех правилах буквы  $a$  левее всего. И видно, что буква  $b$  не может оказаться левее буквы  $a$

Формально, можно доказать по индукции по количеству сделанных переходов.

Утверждение: все буквы  $a$  находятся левее всех  $Z, T$  и  $b$

База понятна, переход: все наши правила не нарушают это утверждение.

- Осталось доказать, что  $m + n$  чётное

Но это просто инвариант. Изначально их чётное, после каждого правила их в сумме остаётся чётное число. Ч.Т.Д.