

 Un sitio web oficial del gobierno de los Estados Unidos. [Así es como lo sabes](#)

Institutos Nacionales de Salud / Biblioteca Nacional de Medicina



[Inicio](#) → [Medicamentos, hierbas y suplementos](#) → Nevirapina

URL de esta página: <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a600035.html>

Nevirapina

pronunciado como (ne vye' ra peen)

ADVERTENCIA IMPORTANTE:

La nevirapina puede causar daño hepático grave y potencialmente mortal, reacciones cutáneas y reacciones alérgicas. Informe a su médico si tiene o ha tenido alguna vez enfermedad hepática, especialmente hepatitis B o C. Su médico probablemente le dirá que no tome nevirapina. Informe también a su médico si tiene un sarpullido u otra afección cutánea antes de empezar a tomar nevirapina. Si experimenta alguno de los siguientes síntomas, deje de tomar nevirapina y llame a su médico inmediatamente: sarpullido, especialmente si es grave o se presenta junto con alguno de los otros síntomas de esta lista; cansancio excesivo; falta de energía o debilidad general; náuseas; vómitos; pérdida de apetito; orina oscura (color té); heces pálidas; coloración amarillenta de la piel o los ojos; dolor en la parte superior derecha del estómago; fiebre; dolor de garganta, escalofríos u otros signos de infección; síntomas parecidos a los de la gripe; dolores musculares o articulares; ampollas; llagas en la boca; ojos rojos o hinchados; urticaria; picazón; hinchazón de la cara, garganta, lengua, labios, ojos, manos, pies, tobillos o pantorrillas; ronquera; o dificultad para respirar o tragar.

Si su médico le dice que deje de tomar nevirapina porque ha tenido una reacción grave en la piel o el hígado, no debe volver a tomar nevirapina nunca más.

Su médico le recetará al principio una dosis baja de nevirapina y la aumentará después de 14 días. Esto reducirá el riesgo de que desarrolle una reacción cutánea grave. Si desarrolla cualquier tipo de sarpullido o alguno de los síntomas enumerados anteriormente mientras está tomando una dosis baja de nevirapina, llame a su médico de inmediato. No aumente la dosis hasta que el sarpullido o los síntomas hayan desaparecido.

No falte a ninguna cita con su médico ni con el laboratorio. Su médico le solicitará que se haga determinadas pruebas para comprobar la respuesta de su organismo a la nevirapina, especialmente durante las primeras 18 semanas de tratamiento.

Su médico o farmacéutico le entregará la hoja de información para el paciente (Guía del medicamento) del fabricante cuando comience el tratamiento con nevirapina y cada vez que renueve su receta. Lea la información atentamente y consulte a su médico o farmacéutico si tiene

alguna duda. También puede obtener la Guía del medicamento en el sitio web de la FDA:

<https://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm>

[<https://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm>] .

Hable con su médico sobre los riesgos de tomar nevirapina. Existe un mayor riesgo de sufrir daño hepático grave durante el tratamiento si es mujer y si tiene un recuento elevado de CD4 (una gran cantidad de un determinado tipo de célula que combate las infecciones en la sangre).

¿Por qué se prescribe este medicamento?

La nevirapina se usa junto con otros medicamentos para tratar la infección por el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) en adultos y niños mayores de 15 días. La nevirapina no debe usarse para tratar a trabajadores de la salud u otras personas expuestas a la infección por VIH después del contacto con sangre, tejidos u otros fluidos corporales contaminados con VIH. La nevirapina pertenece a una clase de medicamentos llamados inhibidores no nucleósidos de la transcriptasa inversa (INNTI). Actúa disminuyendo la cantidad de VIH en la sangre. Aunque la nevirapina no cura el VIH, puede disminuir la probabilidad de desarrollar el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) y enfermedades relacionadas con el VIH, como infecciones graves o cáncer. Tomar estos medicamentos junto con la práctica de sexo seguro y hacer otros cambios en el estilo de vida puede disminuir el riesgo de transmitir (propagar) el virus del VIH a otras personas.

¿Cómo se debe utilizar este medicamento?

La presentación de nevirapina es en comprimidos, comprimidos de liberación prolongada y suspensión (líquido) para tomar por vía oral con o sin alimentos. Los comprimidos y la suspensión se toman generalmente una vez al día durante 2 semanas y luego dos veces al día después de las primeras 2 semanas. Los comprimidos de liberación prolongada se toman generalmente una vez al día, después de al menos dos semanas de tratamiento con comprimidos o suspensión de nevirapina regulares. Siga atentamente las instrucciones de la etiqueta de su receta y pida a su médico o farmacéutico que le explique cualquier parte que no comprenda. Tome nevirapina exactamente como se le indique. No aumente ni disminuya la dosis ni la tome con más frecuencia que la indicada por su médico.

Trague nevirapina con líquidos como agua, leche o refrescos.

Trague las tabletas de liberación prolongada enteras; no las parta, mastique ni triture.

Agite suavemente el líquido antes de cada uso para mezclar el medicamento de manera uniforme. Use un vaso dosificador oral o una jeringa dosificadora para medir su dosis. Es mejor usar una jeringa, especialmente si su dosis es inferior a 5 ml (1 cucharadita). Si usa un vaso dosificador, primero beba todo el medicamento que midió en el vaso dosificador. Luego llene el vaso dosificador con agua y beba el agua para asegurarse de obtener la dosis completa.

La nevirapina puede controlar el VIH, pero no lo curará. Continúe tomando nevirapina incluso si se siente bien. No deje de tomar nevirapina ni ninguno de los otros medicamentos que esté tomando para tratar el VIH o el SIDA sin hablar con su médico. Es probable que su médico le indique que deje de tomar sus medicamentos en un orden determinado. Si se saltea dosis o deja de tomar nevirapina, su afección puede volverse más difícil de tratar.

Si no toma nevirapina durante 7 días o más, no vuelva a tomarla sin consultar con su médico. Su médico le recetará al principio una dosis baja de nevirapina y la aumentará después de 2 semanas.

Otros usos de este medicamento

La nevirapina también se utiliza a veces para evitar que los bebés no nacidos cuyas madres tienen VIH o SIDA se infecten con el VIH durante el parto.

Este medicamento puede recetarse para otros usos; consulte a su médico o farmacéutico para obtener más información.

¿Qué precauciones especiales debo seguir?

Antes de tomar nevirapina,

- Dígame a su médico y farmacéutico si es alérgico a la nevirapina o a cualquier otro medicamento.
- Informe a su médico y farmacéutico qué medicamentos con y sin receta, vitaminas y suplementos nutricionales está tomando mientras toma nevirapina. Es posible que su médico deba cambiar las dosis de sus medicamentos o controlarlo más de cerca para detectar efectos secundarios.
- El siguiente producto a base de hierbas puede interactuar con nevirapina: hipérico. Asegúrese de informar a su médico y farmacéutico que está tomando este medicamento antes de comenzar a tomar nevirapina. No comience a tomar este medicamento mientras toma nevirapina sin consultarlo con su proveedor de atención médica.
- Dígame a su médico si tiene o alguna vez ha tenido enfermedad renal, especialmente si está recibiendo tratamiento con diálisis (tratamiento para limpiar la sangre fuera del cuerpo cuando los riñones no están funcionando bien).
- Informe a su médico si está embarazada o planea quedarse embarazada. Si queda embarazada mientras toma nevirapina, llame a su médico. No debe amamantar si está infectada con el VIH o si está tomando nevirapina.
- Debe saber que este medicamento puede disminuir la fertilidad en las mujeres. Hable con su médico sobre los riesgos de tomar este medicamento si tiene inquietudes sobre la fertilidad.
- Debes saber que tu grasa corporal puede aumentar o desplazarse a otras zonas del cuerpo, como la cintura, la parte superior de la espalda, el cuello (joroba de búfalo), los senos y alrededor del estómago. Puedes notar una pérdida de grasa corporal en la cara, las piernas y los brazos.
- Debe saber que mientras esté tomando medicamentos para tratar la infección por VIH, su sistema inmunológico puede fortalecerse y comenzar a combatir otras infecciones que ya tenía en el cuerpo o provocar la aparición de otras afecciones. Esto puede provocar que desarrolle síntomas de esas infecciones o afecciones. Si tiene síntomas nuevos o que empeoran durante su tratamiento con nevirapina, asegúrese de informar a su médico.

¿Qué dieta especial debo seguir mientras esté en ejercicio?

A menos que su médico le indique lo contrario, continúe con su dieta normal.

¿Qué debo hacer si olvido tomar una dosis?

Take the missed dose as soon as you remember it. However, if it is almost time for the next dose, skip the missed dose and continue your regular dosing schedule. Do not take a double dose to make up for

a missed one.

What side effects can this medication cause?

Nevirapine may cause side effects. Tell your doctor if either of these symptoms is severe or does not go away:

- headache
- diarrhea
- stomach pain

Some side effects can be serious. If you experience any of the symptoms listed in the IMPORTANT WARNING section, call your doctor immediately.

If you experience a serious side effect, you or your doctor may send a report to the Food and Drug Administration's (FDA) MedWatch Adverse Event Reporting program online (<https://www.fda.gov/Safety/MedWatch> [<https://www.fda.gov/Safety/MedWatch>]) or by phone (1-800-332-1088).

What should I know about storage and disposal of this medication?

Keep this medication in the container it came in, tightly closed, and out of reach of children. Store it at room temperature and away from excess heat and moisture (not in the bathroom).

It is important to keep all medication out of sight and reach of children as many containers (such as weekly pill minders and those for eye drops, creams, patches, and inhalers) are not child-resistant and young children can open them easily. To protect young children from poisoning, always lock safety caps and immediately place the medication in a safe location – one that is up and away and out of their sight and reach. <https://www.upandaway.org> [<https://www.upandaway.org>]

Unneeded medications should be disposed of in special ways to ensure that pets, children, and other people cannot consume them. However, you should not flush this medication down the toilet. Instead, the best way to dispose of your medication is through a medicine take-back program. Talk to your pharmacist or contact your local garbage/recycling department to learn about take-back programs in your community. See the FDA's Safe Disposal of Medicines website (<https://goo.gl/c4Rm4p> [<https://goo.gl/c4Rm4p>]) for more information if you do not have access to a take-back program.

In case of emergency/overdose

In case of overdose, call the poison control helpline at 1-800-222-1222. Information is also available online at <https://www.poisonhelp.org/help> [<https://www.poisonhelp.org/help>] . If the victim has collapsed, had a seizure, has trouble breathing, or can't be awakened, immediately call emergency services at 911.

Symptoms of overdose may include the following:

- swelling of the hands, feet, ankles, or lower legs
- painful red bumps on the skin

- excessive tiredness
- fever
- headache
- difficulty falling asleep or staying asleep
- nausea
- vomiting
- rash
- dizziness

What other information should I know?

Do not let anyone else take your medication. Ask your pharmacist any questions you have about refilling your prescription.

Si está tomando comprimidos de liberación prolongada, es posible que note algo parecido a un comprimido en las heces. Esto es solo la cubierta vacía del comprimido y no significa que no haya recibido la dosis completa del medicamento.

Es importante que usted mantenga una lista escrita de todos los medicamentos que está tomando, ya sean recetados o no, incluyendo vitaminas, minerales y suplementos dietéticos. Debe tener la lista cada vez que visita su médico o cuando es admitido en un hospital. También es una información importante para llevar consigo en casos de emergencia.

Nombres de marca

- Viramune®
- Viramune® XR

Última revisión: 20/06/2024

[Aprenda a citar esta página](#)



[Descargo de responsabilidad de la Sociedad Estadounidense de Farmacéuticos de Sistemas de Salud, Inc.](#)

Información sobre medicamentos para pacientes de AHFS® . © Copyright, 2024. The American Society of Health-System Pharmacists® · 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Todos los derechos reservados. La duplicación para uso comercial debe contar con la autorización de ASHP.

Biblioteca Nacional de Medicina 8600 Rockville Pike, Bethesda, Maryland 20894

Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos Institutos Nacionales de Salud