



INGENIERÍA BIOMÉDICA PUCP-UPCH

Detector de signos vitales ad hoc para niños durante intervención quirúrgica

INTEGRANTES:

Alejandra Vilca Landa

Andrea Zaharia Seinfeld

Harold Angeles Gavidia

Luis Díaz Leguizamon

Mauricio Gallardo Urpeque

CURSO:

Proyectos de Biodiseño 1

ASESOR:

Rossana Rivas Tarazona

2021-2

Índice

Problemática	3
1.1. Contexto general	3
1.2. Definición del problema	5
1.2.2. Empathy map	6
1.2.2.1. Empathy map del doctor	6
1.2.2.2. Empathy map del niño	6
1.2.3. Stakeholder map	7
1.2.4. Mapa de Ishikawa	
1.3. Análisis de los efectos y su impacto	8
1.5. Descripción de la propuesta de solución	15
1.5.1. <i>Mind map</i> con propuestas de solución	15
Bibliografía	18
	1.1.1. Contexto social 1.1.2. Contexto económico 1.2. Definición del problema 1.2.1. Mapa problem statement 1.2.2. Empathy map 1.2.2.1. Empathy map del doctor 1.2.2.2. Empathy map del niño 1.2.3. Stakeholder map 1.2.4. Mapa de Ishikawa 1.2.5. Árbol de problemas 1.3. Análisis de los efectos y su impacto 1.4. Análisis de las causas y sus factores 1.5. Descripción de la propuesta de solución 1.5.1. Mind map con propuestas de solución 1.5.2. Definición de dos propuestas elegidas

1. Problemática

1.1. Contexto general

Los signos vitales son indicadores cuantitativos de ciertos parámetros fisiológicos como la temperatura interna, la presión sanguínea, la frecuencia cardiaca y respiración. La monitorización de estos parámetros es de carácter imperativo. Uno de los espacios en donde se necesita controlarlos es en las cirugías, en donde se interviene a un paciente para poder tratar algún problema de salud. Si bien todo tipo de operación es riesgosa, uno de los grandes retos se desarrolla específicamente en las cirugías pediátricas; puesto que los niños tienden a fluctuar sus signos vitales de manera más peligrosa que en casos con usuarios adultos. Los niños tienen una grasa subcutánea más delgada y una proporción más alta entre áreas superficiales y peso corporal, además que la pérdida de calor en ellos es más rápida que en las personas mayores. Asimismo, con la aplicación de anestesia general en las intervenciones quirúrgicas es más probable que se observen casos de hipotermia debido a lo explicado anteriormente. [1]


Según el Informe de evaluación anual del plan operativo institucional 2018 del INSNSB (Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja), se registraron pacientes derivados a los diferentes departamentos de cirugía dentro del instituto. En el caso de cirugías cardiacas se documentaron 479 intervenciones. Por otro lado, en el eje neonatal se contabilizaron 1082 intervenciones. Esto refleja la gran cantidad de pacientes pediátricos que se someten a cirugías que involucran el uso crítico e indispensable de monitores de signos vitales. Una de las mayores dificultades que ha observado el INSNSB, específicamente en el área de cirugía, es la necesidad de adecuar la infraestructura de las salas de intervenciones quirúrgicas, la modernización de los sistemas y herramientas, mejorar la adquisición de insumos, suministros médicos y medicamentos. No solo son una realidad local, sino también una nacional. Además, estas carencias surgen como efectos colaterales de la falta latente de presupuesto económico y la alta demanda poblacional que existe actualmente en el Perú. [2]

1.1.1. Contexto social

En el contexto social de cirugías pediátricas, existen diversos factores que se deben considerar como: la comunicación con el médico, la familia, el paciente y el entorno en donde se desarrolla la intervención. En el ámbito pediátrico la familia actúa como ente de apoyo, primordialmente emocional; por ello, es importante que los padres reciban información completa y entendible acerca de los procedimientos quirúrgicos a realizar. El propósito es capacitar a la familia para transmitir tranquilidad y evitar el estrés o ansiedad en el niño. [3]

Así mismo, según el INEI, la tasa de mortalidad infantil hasta el 2018 en Perú era del 15% y en provincias como Puno, Cusco, Loreto, Cajamarca y Huancavelica se encontraron las tasas más altas causadas por cirugías pediátricas, infecciones respiratorias agudas, deficiencia nutricionales, entre otras. Estos departamentos son los que no suelen tener buen equipamiento médico, por lo que es esencial implementar buenos equipos biomédicos para poder disminuir estas tasas de mortalidad. [4]

Finalmente, en el INSNSB durante el año 2018, se registró el fallecimiento de 20 neonatos de un total de 276 egresados. Dicha cifra representa el 7.25% del total de egresados que, aunque esté por debajo del porcentaje esperado de 8.50%, aún representa una considerable cantidad de pacientes [2]. El sistema de salud peruano ha demostrado avances hacia la disminución de la mortalidad infantil durante intervenciones médicas. Sin embargo, las diversas dificultades persistentes en centros médicos como espacios reducidos o dispositivos desactualizados abren paso a la necesidad de desarrollo de nuevos métodos económicos y multiuso para potenciar la calidad de servicio a los pacientes.



Tasa de mortalidad infantil por departamento, 2010-2015.

Fuente: INEI. Comportamiento de la Mortalidad Infantil por departamento. 2017

Figura 1. Tasa de mortalidad infantil por departamento [4].

1.1.2. Contexto económico

En cuanto al contexto económico, el Perú tiene una gran desventaja en comparación a los países vecinos latinoamericanos y otros primermundistas. [3] Por otro lado, con la llegada de la pandemia a principios del 2020, se ha dejado de lado varios problemas de salud que son esenciales para el diagnóstico y su tratamiento respectivo.

Según el IPE, "Antes de la pandemia, el Perú ya exhibía brechas en la calidad de su sistema de salud. De acuerdo con cifras del Ministerio de Salud (Minsa), el país contaba con 13,6 médicos por cada diez mil habitantes. Asimismo, se registraban apenas 0,4 camas de cuidados intensivos (UCI) por cada cien mil habitantes. El déficit se replicaba también en términos de equipamiento, donde según datos de la Organización Panamericana de la Salud, el país tenía cinco ventiladores mecánicos por cada cien mil habitantes." [3]

Esto evidencia claramente la deficiencia en el sistema de salud peruano y en la gran necesidad que existe de implementar y abastecer con nuevas tecnologías que estén también enfocadas en la cirugía pediátrica.

Gasto destinado a salud per cápita, Perú 2007-2017.





Figura 2. Gasto destinado a salud per cápita [4].

1.2. Definición del problema

El problema radica principalmente en que muchos instrumentos estándar para adultos no son apropiados para niños pequeños (menores de 5 años) debido a las reducidas dimensiones de su cuerpo, extremidades, entre otros, lo cual puede causar complicaciones durante y después de la operación.

1.2.1. Figura 3. Mapa problem statement [elaboración propia]




¿Cómo podríamos rediseñar un monitor de signos vitales que se adecue a las dimensiones de niños menores de 5 años para evitar complicaciones en intervenciones quirúrgicas?

1.2.2. Empathy map



- 1.2.2.1. Figura 4. Empathy map del doctor [[elaboración propia]
- 1.2.2.2. Figura 5. Empathy map del niño [elaboración propia]
- 1.2.3. Figura 6. Stakeholder map [elaboración propia]





1.2.5. Figura 8. Árbol de problemas [elaboración propia]

1.3. Análisis de los efectos y su impacto

Desventaja en la modernización de tecnologías de salud

La desventaja en la modernización de tecnologías de salud en varias regiones del país siempre ha estado presente. Una de las grandes causas es la centralización de los servicios y las complicaciones para distribuir las herramientas necesarias fuera de la capital, y más aún cuando es en zonas rurales y de difícil acceso. Si bien se ha venido trabajando en esta brecha que impide que todos los peruanos acudan a centros de salud en buen estado y con las tecnologías necesarias, esto no ha sido suficiente.

"Entre los retos para incrementar la cobertura prestacional se encuentran la brecha de infraestructura y equipamiento de servicios de salud, la poca articulación de los establecimientos de salud del primer nivel de atención, la subutilización de la oferta pública existente y recurso humano no bien remunerado con escasos o nulos incentivos." [9]

Se ha evidenciado un gran avance en los últimos años con respecto a lo propuesto previamente, ya que, de acuerdo al Banco Mundial, entre otros factores analizados, mencionó que la tasa de mortalidad infantil pasó de 29.5% en el 2000 a 10.3% en 2019. Sin embargo, este mismo señala que esta mejora no asegura que haya aumentado la calidad del servicio que se ofrece, y este va en paralelo con la falta de modernización en las tecnologías que se ofrecen en dichos centros.

Es importante mencionar que uno de los factores que más influyen en esta desventaja tecnológica, si es que no es el que más lo hace, es la falta de inversión que le designa el Estado peruano a este sector. Entre el 2015 y el 2019 no se ejecutó el 10% del presupuesto público (s/ 8.718). Esto no solo refleja la deficiente gestión del dinero, sino también la constatación de la tan mencionada brecha de inequidad. [10]

Complicaciones en la operación

Existe una alta incidencia de complicaciones en el aparato respiratorio en niños y varía entre 42-85/10,000 casos. Los IC (incidentes críticos) en cirugías pediátricas más frecuentemente reportados en un estudio de la Sociedad Holandesa de Anestesiología fueron: hipoxemia e hipoventilación 26% (más frecuente en neonatos y lactantes), laringoespasmo 14%, broncoespasmo 10.6% y bronco laringoespasmo 9.6%. Se reportaron en diferentes investigaciones, a los IC cardiovasculares como los segundos más frecuentes en niños. Esto se evidencia en el estudio de De Graff en el cual se registraron en un 13%, donde los eventos más frecuentes fueron la hipotensión (38%) y las arritmias (16%). Esto contrasta con estudios anteriores que reportaban a las arritmias como el incidente más frecuente. [11]

Además, la ansiedad preoperatoria estresa a los niños, a sus padres y esto puede conllevar a problemas en el procedimiento pre/post quirúrgico. Melamed & Siegel divulgaron que el proceso de hospitalización y cirugía infantil causaban estrés o ansiedad entre el 10% y el 35% de los niños lo cual desencadenaba problemas emocionales en los pacientes. Concluyeron que algunas de estas manifestaciones influyen de forma directa en el cuidado y en los procedimientos que realiza el personal sanitario, requiriendo un aumento de manipulaciones intra-postquirúrgicas. [12]

Parámetros de signos vitales inexactos


La medición de los signos vitales puede ser inexacta debido a diversos factores. Estos podrían ser la falta de mantenimiento y el tiempo de vida útil del equipo biomédico, las dimensiones del monitor (en relación a las necesarias para el tamaño de un niño o bebé), entre otros. Gran parte de estos problemas están relacionados con la falta de revisiones diarias o mensuales, del cumplimiento de las recomendaciones que tiene el dispositivo y el cuidado del mismo, y fallas inesperadas del monitor. Según la investigación "Análisis y estudio de la clasificación de accesorios y consumibles de Monitores de Signos Vitales para el mejoramiento de la calidad del mantenimiento del equipo biomédico" por María José Sanchez A, existen recomendaciones sobre la manutención que debería tomarse en

consideración para este tipo de aparatos biomédicos, tales como la conservación correctiva, preventiva y predictiva. [13] [14]

Limitación de servicios médicos

"En los centros de salud u hospitalarios del país, encontramos diversas necesidades de innovación y tecnología, sobre todo con los dispositivos biomédicos, un claro ejemplo sería la falta de monitores de funciones vitales, ya que se pierde efectividad, tiempo, comodidad del médico y puede tener consecuencias graves, e incluso hasta mortales". [15] Esta cita pertenece a Bondia, H; quien realizó un estudio sobre la problemática de la falta de monitoreo en los centros de salud, especialmente en secciones de operaciones y triajes. Se afirma que en 44% de los establecimientos a los cuales se les realizó una visita no contaban con equipamiento suficiente para la atención de diversos tipos de enfermedades y dentro de las mismas también hacen hincapié en la falta de monitores de funciones vitales neonatales de 5 parámetros. [15]

La falta de una monitorización exacta de signos vitales se enfoca en la falta de dispositivos en los distintos lugares del Perú. Es importante recalcar que no solo existen mediciones inexactas por parte del dispositivo biomédico, sino que el mayor problema consiste en la falta ineludible de estos mismos en el país. Por ejemplo, el boletín epidemiológico de la dirección regional de salud de Cusco N°28 realizó una publicación en la cual se reportaba un recuento de muertes en niños menores de 5 años a causa de neumonía y se menciona que en la intervención que se les realizaba existía una falta de dispositivos de medida exactos con lo cual el proceso de registro de signos vitales se ralentizaba. [16]






Figura 9. Tendencias de neumonías en menores de 5 años 2016-2019 DIRESA Cusco [16]

Figura 10. Tendencias de neumonías en menores de 5 años 2016-2019 DIRESA Cusco [16]

44443395177395₁

4444339517395₁ 4517336517395₁

Semanas epidemiológicas

Dificultosa movilización de personal en la sala de operación

244433255113 201133333551139

Ureta. C afirmó en la Tesis que realizó sobre los factores intrínsecos y extrínsecos asociados al nivel de estrés en el personal de enfermería que labora en sala de operaciones clínica San Pablo y concluyó que 60% de las personas que participaron del estudio presentaba un factor extrínseco de estrés. Lo importante es que este factor se asocia a las características ambientales de la sala de operaciones que incluye infraestructura. El contraste con este parámetro era también la relación que existía entre el espacio disponible para la movilización con la demanda laboral en la sala y los insumos y tecnologías que ocupan un espacio dentro de la misma. [17]. Una de las recomendaciones generadas era la preocupación de la institución por mejorar la infraestructura y en general el ambiente pre, intra, y postoperatorio.

1.4. Análisis de las causas y sus factores

<u>Efecto: Desventaja en la modernización de tecnologías de salud</u> <u>Causa: Poca inversión en el sector salud</u>

La salud es uno de los derechos fundamentales del ser humano y es un indicador importante del nivel de desarrollo y crecimiento de cada país. En el mundo, se observa una tendencia de mejoría en la medición de diferentes problemas de este tipo. La esperanza de vida ha incrementado de 71.1 años en el 2000 a 76.5 en 2018. Asimismo, el Perú ha gozado de un crecimiento económico en las últimas dos décadas que incrementó el presupuesto público total de S/. 34,046 millones en 2000 a más de S/. 188,571 millones en 2019. Dicho aumento en la cantidad de recursos económicos disponibles debería reflejar un incremento proporcional en el presupuesto destinado hacia el sector mencionado. Sin embargo, de acuerdo con el

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en el 2018, las ineficiencias y derroches del gasto público en Perú ascienden al 2.5% del PBI. Estos porcentajes reflejan una potencial oportunidad de mejoramiento en los gastos destinados a servicios sin la necesidad de aumentar el presupuesto. [18]

Según el Informe de Calidad del gasto público en Salud en el Perú, entre los años 2009 y 2020, la utilización del presupuesto destinado este sector ha ido incrementado, desde 7.6% hasta el 12.7%. No obstante, para poder brindar una solución que involucre a los recursos humanos, equipamiento e infraestructura, el Estado propone realizar una mayor inversión en el mencionado sector haciendo un uso eficiente de los mismos para brindar un mejor servicio. [18]




Figura 11. Presupuesto nacional destinado a la salud en Perú 2009-2020 [18]

Es una realidad la limitada cantidad de recursos orientados al sector salud en Perú y es por ello que es de suma importancia el uso eficiente de los mismos. Se prevé que los gastos en salud incrementarán en las próximas décadas a causa de factores como el envejecimiento de la población, mayor incidencia de enfermedades crónicas y mayor demanda de servicios de salud. Así, aquellos recursos disponibles deben generar servicios mejores y más eficientes para el bienestar de la población [18].

Efecto: Complicaciones en la operación

Causa: Carencia de equipos especializados para cirugía pediátrica

Las cirugías pediátricas resultan un desafío particular debido a las reducidas dimensiones del cuerpo del paciente. Por ello, es necesario el uso de equipos médicos específicamente diseñados para niños o bebés. Entre el 2015 y el 2019, Perú creció un 11% en el sector de equipamiento y material médico y, debido a la poca producción nacional, es necesaria la importación de la mayor parte de este tipo de tecnologías [19]. La pandemia de la COVID-19, ha resaltado la necesidad de modernizar y digitalizar los servicios de salud y, aunque hay un crecimiento del presupuesto, el uso de estos fondos no es el más óptimo; por ejemplo, para la adquisición de nuevas tecnologías relacionadas con telesalud [18][19]. Por otro lado, una gran parte de estos establecimientos, en especial aquellos de índole pública, actualmente carecen de muchos de los equipos requeridos para permitir el desarrollo laboral completo del personal médico [20]. Actualmente es común el uso de tecnologías obsoletas en hospitales y, por ende, procedimientos especializados,

como los de cirugía pediátrica, no se benefician de herramientas modernas para agilizar las intervenciones y aminorar las complicaciones.

Efecto: Parámetros de signos vitales inexactos

Causa: Falla de los equipos debido a falta de mantenimiento y recursos

El buen estado de los equipos y suministros médicos está directamente relacionado con la precisión de la medición de los diversos parámetros de salud del paciente. Por este motivo, es imperativo que el sistema de salud y la administración de los centros hospitalarios se encarguen de proveer el mantenimiento y recursos necesarios para garantizar el correcto funcionamiento de los dispositivos electrónicos y herramientas manuales. En la mayoría de los hospitales pertenecientes al MINSA, se utilizan tecnologías anticuadas que limitan la calidad de atención hacia los pacientes. En efecto, es frecuente la ausencia de equipos para análisis de laboratorio básicos como cuerpos cetónicos, antígeno neumocócico, resonancia magnética nuclear, entre otros y, como resultado, no es posible realizar un diagnóstico adecuado [20].

Características	Porcentaje (%)
Laboratorio	
Recursos humanos insuficientes	37
No realización de procedimientos mínimos	42
No cumple con equipamiento mínimo	42
No cumple con infraestructura	27
Estudios de imágenes	
Infraestructura inadecuada	53
No cumple con equipamiento mínimo	68
No licencia de funcionamiento	45
No cuenta con ambientes requeridos	53
No disponibilidad de sala de resonancia magnética	65
No disponibilidad de sala de angiografía	39
No disponibilidad de sala de ecografía de emergencia	41
Farmacia	
Sub stock / desabastecimiento	42
Prácticas de almacenamiento inadecuadas	33
Falta de autorización sanitaria del almacén	45

Tabla 1. Porcentajes de carencias en establecimientos de atención de mediano y alto nivel de complejidad de ESSALUD, Ministerio de Salud y Fuerzas Armadas en 2018 [20]

La Tabla 1 refleja una variedad de porcentajes en relación a las carencias dentro de laboratorios, centros de estudios por imágenes y farmacias. La disminución de la calidad de atención a los pacientes presenta riesgos para su salud, pues la falta de equipos, medicinas y suministros no permiten que los médicos estén en capacidad de atender oportunamente las patologías. Para situaciones críticas como la atención de emergencia para pacientes pediátricos no se puede aceptar la existencia de brechas tan grandes en las capacidades de los centros médicos en países con recursos medianos-altos como Perú. [20]

<u>Efecto: Limitaciones de servicios médicos</u>
Causa: Difícil acceso a los servicios de atención médica

En el Diagnóstico de Brechas de Infraestructura y Equipamiento del Sector Salud publicado por el Ministerio de Salud en enero de 2021, se realiza un análisis de la situación actual en el sistema de salud peruano sobre las diversas brechas existentes en infraestructura y equipamientos. Se tomaron en consideración diferentes indicadores en potenciales áreas de deficiencias y se otorgó un porcentaje representativo de la magnitud de la brecha actual en dichos sectores.

	Indicador de Brecha	Valor Absoluto	Porcentaje
1.	Porcentaje de establecimientos de salud del primer nivel de atención con capacidad instalada inadecuada.	6785	77.78%
2.	Porcentaje de nuevos establecimientos de salud requeridos del primer nivel de atención.	281	20.74%
3.	Porcentaje de hospitales con capacidad instalada inadecuada.	124	51.00%
4.	Porcentaje de nuevos hospitales requeridos.	172	56.21%
5.	Porcentaje de institutos especializados con capacidad instalada inadecuada.	9	60.00%
6.	Porcentaje de laboratorios del Instituto Nacional de Salud con capacidad instalada inadecuada	39	95.12%
7.	Porcentaje de laboratorios regionales de salud pública con capacidad instalada inadecuada.	23	95.83%
8.	Porcentaje de sedes administrativas con inadecuado índice de ocupación	1664	79.92%
9.	Porcentaje de sistemas de información de salud que no funcionan adecuadamente	9	75%
10.	Porcentaje de centros de promoción y vigilancia comunal requeridos	1264	66,91%

 Tabla 2. Indicadores de brecha de infraestructura y equipamiento del sector salud 2018 [26]

Los porcentajes reflejados en la tabla 2 evidencian disparidades sustanciales entre el modelo de servicio ideal con el actual en el territorio nacional. En el *Manual de Procesos y Procedimientos del Proceso de Cirugía Pediátrica* publicado por el Departamento de Cirugía Pediátrica del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins en enero del 2020, se identifica como oportunidad de mejora que el Departamento de Cirugía Pediátrica mantenga una relación directa de trabajo con las áreas de emergencias, cirugía, laboratorio, hospitalización, entre otras, para que así, se desarrolle de manera eficiente los procesos hospitalarios [21]. En este caso, al tratarse de cirugías pediátricas, es de suma criticidad la atención inmediata y

organizada para el paciente. Además, es esencial mejorar la comunicación interna del hospital, ya que este tipo de obstáculos disminuye la calidad de atención y la facilidad de acceso a los servicios necesarios de forma oportuna.

Efecto: Dificultosa movilización de personal en la sala de operación

Causa: Estructura antigua y espacios no optimizados en los establecimientos médicos

En el Perú, la Gerencia Central de Infraestructura es el órgano responsable de la ejecución de los planes y programas relacionados con la inversión en infraestructura, ingeniería y obras, mantenimiento de los equipos biomédicos y electromecánicos. [22]

Actualmente, las medidas de política están orientadas a la reconstrucción de un sistema de salud integrado. El principal lineamiento que se busca mejorar es la atención primaria de salud, para elevar la capacidad resolutiva de los servicios sanitarios del segundo nivel de consulta [23]. Por ello, es de suma importancia impulsar estrategias de reorganización de servicios y un adecuado dimensionamiento de la infraestructura hospitalaria.

Según el informe denominado "Actualización de los valores de los indicadores de brecha del sector salud", realizado por el Ministerio de Salud, se ha propuesto para el año 2022 reducir en un 6% la cantidad de hospitales con capacidad instalada inadecuada (HOSI), teniendo en cuenta el porcentaje de la misma problemática en el 2021 fue de un 95%. Sin embargo, para el presente año, en comparación al 2020, esta problemática solo se pudo disminuir en un 1% el número de HOSI. [24]

Si bien es cierto que las inversiones de optimización, ampliación marginal, reposición y rehabilitación contribuyen al cierre de brechas de infraestructura y equipamiento, no se ha realizado un conteo exhaustivo para determinar la capacidad instalada de los establecimientos de salud, ya que son intervenciones específicas que se realizan sobre dichos servicios en aspectos focalizados o incluso solo sobre activos estratégicos. [25]

1.5. Descripción de la propuesta de solución

1.5.1. Figura 12. Mind map con propuestas de solución [elaboración propia]



1.5.2. Definición de dos propuestas elegidas

Media wearable de medición de frecuencia cardiaca y saturación de oxígeno con masajeador anticoagulante:

SockTec es un dispositivo biomédico dedicado a la medición y control de la frecuencia cardiaca y saturación de oxígeno en pacientes pediátricos de 4 a 5 años y destinado a su uso en espacios de intervenciones quirúrgicas. Está diseñado con sensores CI de ROHM y MAX 30102 para parametrizar valores de frecuencia cardiaca y saturación de oxígeno, respectivamente. La mayor parte de las operaciones realizadas a niños en ese rango de edades se da por apendicitis. Mediante un dispositivo periférico que vigile estos signos vitales, se ayudaría a despejar la zona de intervención (región inferior derecha del abdomen)




Figura 13. Bosquejo preliminar de SockTec [elaboración propia]

Smartwatch adaptado a las condiciones del niño y con un diseño amigable para la medición de frecuencia cardiaca y saturación de oxígeno:

VitalWatch es un dispositivo biomédico que dispone su utilidad para medir la frecuencia cardiaca, saturación de oxígeno y temperatura corporal en pacientes pediátricos de 4 a 5 años, mediante la adaptación de sensores para cada uno de los parámetros. La principal razón para incorporar la medición de temperatura por sensores RTD (pt100) en la zona de la muñeca es para una mejor precisión que en zonas distales del cuerpo. Además, los niños entre esas edades tienden a fluctuar estos valores de manera muy espontánea por lo que monitorear constantemente este y los otros dos parámetros es esencial en el desarrollo de la operación como en el post.




Figura 14. Bosquejo preliminar de VitalWatch [elaboración propia]

2. Bibliografía

- [1] Yingtong, J., Han, D. and Han, L., 2021. The Accuracy of a Wireless Axillary Thermometer for Core Temperature Monitoring in Pediatric Patients Having Noncardiac Surgery: An Observational Study. [en línea] ScienceDirect. Disponible en: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S108994722100071X. [Accedido: 2 Septiembre 2021].
- [2] Zopfi, A. and Alvarez, C., 2021. Informe de Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional 2018. [en línea] Insnsb.gob.pe. Disponible en: http://www.insnsb.gob.pe/docs-trans/upp/EVALUACION%20ANUAL%20DEL%20POI%202018.pdf. [Accedido: 2 Septiembre 2021].
- [3] Montoya Castilla, I., 2021. Repercusiones psicológicas de la cirugía pediátrica ambulatoria en el paciente y su familia. [en línea] Tdx.cat. Disponible en: https://www.tdx.cat/handle/10803/10154#page=1. [Accedido: 4 Septiembre 2021].
- [4] Loayza, M., Gutierrez, A. and Munayco, C., 2019. Análisis de Situación de la Salud del Perú. [en línea] Dge.gob.pe. Disponible en: https://www.dge.gob.pe/portal/docs/asis/Asis_peru19.pdf [Accedido: 4 Septiembre 2021].
- [5] "Inversión de pandemia | Instituto Peruano de Economía", Instituto Peruano de Economía, 2021. [en línea]. Disponible en: https://www.ipe.org.pe/portal/inversion-de-pandemia-salud/. [Accedido: 5 Septiembre 2021]
- [6] Cabezas, C., 2021. Atención médica y de salud en el Perú. [en línea] SCielo. Disponible en: https://www.scielosp.org/article/rpmesp/2019.v36n2/165-166/es/. [Accedido: 9 Septiembre 2021]
- [7] Mayao, D. and Ixbalamque, C., 2021. Complicaciones en anestesia pedriátrica. [en línea] Medigraphic.com. Disponible en: https://www.medigraphic.com/pdfs/rma/cma-2017/cmas171ap.pdf. [Accedido: 10 Septiembre 2021]
- [8] Alvarez, L. and Marroquín, J., 2021. Hipotermia posoperatoria en el paciente pediátrico en cirugía electiva. [en línea] SCielo. Disponible en: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2448-87712017000300026. [Accedido: 10 Septiembre 2021]
- [9] Gutiérrez, C., Romaní Romaní, F., Wong, P. and Del Carmen Sara, J., 2021. Brecha entre cobertura poblacional y prestacional en salud: un reto para la reforma de salud en el Perú. [en línea] Disponible en: . [Accedido 13 -Sep- 2021].
- [10] E. Mezones-Holguin et al., "Cobertura de aseguramiento en salud: el caso peruano desde la Ley de Aseguramiento Universal", Rpmesp.ins.gob.pe, 2021. [en línea]. Disponible en: https://rpmesp.ins.gob.pe/rpmesp/article/view/3998/3314. [Accedido: 17- Sep- 2021].
- [11] D.Garcia and C.Ixbalanque,Tdx.cat,2021.[en línea].Disponible en: https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/461162/TESI.pdf?sequence=1 [Accedido: 14- Sep-2021].
- [12] M. Gutierrez, "La ansiedad de los niños y de sus familias en el proceso de una intervención quirúrgica programdada", 2021. [en línea]. Disponible en: https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/461162/TESI.pdf?sequence=1. [Accedido: 14- Sep-2021].
- [13] M. Sánchez, "Análisis y estudio de la clasificación de accesorios y consumibles de Monitores de Signos Vitales para el mejoramiento de la calidad del mantenimiento del equipo biomédico.", Bibliotecadigital.udea.edu.co, 2021. [en línea]. Disponible en: http://bibliotecadigital.udea.edu.co/bitstream/10495/12174/1/SanchezMaria_2019_AnalisisEstudioequipoBiomedico.pdf. [Accedido: 17- Sep- 2021].
- [14] Redalyc.org, 2021. [en línea]. Disponible en: https://www.redalyc.org/pdf/2738/273825390009.pdf. [Accedido: 17- Sep- 2021].
- [15] Bondia, H., 2019. Diseño de un Prototipo de Monitoreo de Funciones vitales en FPGA para Hospitales Nacionales del Perú. [en línea] Repositorio.utp.edu.pe. Disponible en: https://repositorio.utp.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12867/2471/Herbert%20Bondia Trabajo%20de

- %20Suficiencia%20Profesional_Titulo%20Profesional_2019.pdf?sequence=4&isAllowed=y. [Accedido 14 -Sep- 2021].
- [16] Navarro, D., 2019. Boletín Epidemiológico N°28-2019. [en línea] Diresacusco.gob.pe. Disponible en: http://www.diresacusco.gob.pe/inteligencia/epidemiologia/boletines/2019/28-2019.pdf. [Accedido: 14 -Sep- 2021].
- [17] Ureta, C., 2016. Factores intrínsecos y extrínsecos asociados al nivel de estrés en el personal de enfermeria que labora en la sala de operaciones Clínica San Pablo. [en línea] Repositorio.unac.edu.pe.

 Disponible

 en http://repositorio.unac.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12952/4578/Torrecillas%20Golac%20y%20Ureta%20Porras%20FCS%202DA%20ESPE%202016.pdf?sequence=4&isAllowed=y.
 [Accedido 14 -Sep- 2021].
- [18] Zacnich, Á. García and E. García, "Informe de calidad del gasto público en salud 2019", Comexperu.org.pe, 2019. [en línea]. Disponible en: https://www.comexperu.org.pe/upload/articles/reportes/informe-calidad-001.pdf. [Accedido: 13- Sep-2021].
- [19] I. Kauffman, "Estudio de mercado. El mercado de equipamiento y material médico en Perú 2020", lcex.es, 2020. [en línea]. Disponible en: <a href="https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/el-mercado/estudios-informes/estudio-mercado-equipamiento-medico-per u-2020-doc2021871587.html?idPais=PE. [Accedido: 15- Sep- 2021]
- [20] A. Soto, "Scielo", Barreras para una atención eficaz en los hospitales de referencia del Ministerio de Salud del Perú: atendiendo pacientes en el siglo XXI con recursos del siglo XX, 2019. [en línea]. Disponible

 http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1726-46342019000200020. [Accedido: 16- Sep- 2021].
- [21] M. Olivas and N. Taipe, "Manual de procesos y procedimientos del proceso de cirugía pedriátrica", Essalud.gob.pe, 2020. [en línea]. Disponible en: http://www.essalud.gob.pe/transparencia/procesos_procedimientos/MPP_HNERM_Departamento_Cirujia_Pediatrica.pdf. [Accedido: 15- Sep- 2021].
- [22] Essalud. "Resolución de presidencia ejecutiva N° 283", Essalud.gob.pe, 2010. [en línea]. Disponible en: http://www.essalud.gob.pe/transparencia/pdf/rof/rof_GCIn_juli_2010.pdf. [Accedido: 13- Sep- 2021].
- [23] M. Estrada and K. Trelles, "Infraestructura y equipamiento de los establecimientos de salud del segundo nivel de atención", Bvs.minsa.gob.pe, 2014. [en línea]. Disponible en: http://bvs.minsa.gob.pe/local/MINSA/3365.pdf. [Accedido: 13- Sep- 2021].
- [24] MINSA, "Actualización de los valores de los indicadores de brecha del sector salud", Minsa.gob.pe, 2021. [en línea]. Disponible en: https://www.minsa.gob.pe/Recursos/OTRANS/08Proyectos/2021/Valores-indicadores-Brecha-Salud3.
 https://www.minsa.gob.pe/Recursos/OTRANS/08Proyectos/2021/Valores-indicadores-Brecha-Salud3.
 https://www.minsa.gob.pe/Recursos/OTRANS/08Proyectos/2021/Valores-indicadores-Brecha-Salud3.
 https://www.minsa.gob.pe/Recursos/OTRANS/08Proyectos/2021/Valores-indicadores-Brecha-Salud3.
- [25] MINSA, "Diagnóstico de brechas de infraestructura y equipamiento del sector salud", Minsa.gob.pe, 2021. [en línea]. Disponible en: https://www.minsa.gob.pe/Recursos/OTRANS/08Proyectos/2021/DIAGNOSTICO-DE-BRECHAS.pdf. [Accedido: 13- Sep- 2021].
- [26] Secretaria General MINSA, "Diagnóstico de brechas de infraestructura o acceso a servicios en el sector salud", 2020. [Online]. Available: https://www.minsa.gob.pe/Recursos/OTRANS/08Proyectos/2019/Diagnostico-Brechas-Infraestructura -sector-Salud.pdf. [Accedido: 16- Sep- 2021]