# Hipotálamo · DETECCIÓN basal jerárquica

p de corte nuevo:95% predictivo
μ anatómica:95% creíble
Media posterior μ
Fracción medida agrupada

A  Tll1

HY-unassigned (n=6,393; S=18)
LHA (n=4,502; S=11)
ZI-unassigned (n=3,518; S=9)
AHN (n=2,308; S=8)
PH (n=1,419; S=5)
VMH (n=1,225; S=4)
TU (n=1,140; S=4)
LPO (n=1,139; S=6)
MPO (n=1,102; S=6)
PVH (n=1,057; S=5)
MPN (n=1,016; S=5)
DMH (n=945; S=4)

0.00 0.25 0.50 0.75 1.00
Probabilidad de detección

B  Fosl2

HY-unassigned (n=6,393; S=18)
LHA (n=4,502; S=11)
ZI-unassigned (n=3,518; S=9)
AHN (n=2,308; S=8)
PH (n=1,419; S=5)
VMH (n=1,225; S=4)
TU (n=1,140; S=4)
LPO (n=1,139; S=6)
MPO (n=1,102; S=6)
PVH (n=1,057; S=5)
MPN (n=1,016; S=5)
DMH (n=945; S=4)

0.00 0.25 0.50 0.75 1.00
Probabilidad de detección

C  Nr4a3

HY-unassigned (n=6,393; S=18)
LHA (n=4,502; S=11)
ZI-unassigned (n=3,518; S=9)
AHN (n=2,308; S=8)
PH (n=1,419; S=5)
VMH (n=1,225; S=4)
TU (n=1,140; S=4)
LPO (n=1,139; S=6)
MPO (n=1,102; S=6)
PVH (n=1,057; S=5)
MPN (n=1,016; S=5)
DMH (n=945; S=4)

0.00 0.25 0.50 0.75 1.00
Probabilidad de detección

D  Corte nuevo, n real

Tll1
Fosl2
Nr4a3
Egr2
Cpne9
Egr3
Hgf
Bcl11b
Car12
Crym
Nominal95%

0.0 0.5 1.0
Cobertura predictiva
de conteos excluidos

E  Error de fracción excluida

Tll1
Fosl2
Nr4a3
Egr2
Cpne9
Egr3
Hgf
Bcl11b
Car12
Crym

0.0 0.1 0.2
Error absoluto de fracción
(corte × anatomía)

F  Sensibilidad de cuadrícula
medias μ con datos completos

Tll1
Fosl2
Nr4a3
Egr2
Cpne9
Egr3
Hgf
Bcl11b
Car12
Crym

0.000 0.004 0.008
Máximo |Δ media posterior μ|

Beta-Binomial anatómico
Referencia regional solo entrenamiento
64×48 vs 32×24
64×48 vs 96×64

Un donante sin exposición; los cortes modelan heterogeneidad, no animales independientes. Se conservan los ceros medidos.
μ~Beta(½,½), κ~LogNormal(log20,1.5) fijas;cuadrícula64×48;8,192 sorteos con semilla. Grupos excluidos solo con prior=790/1860. Sin efecto PM2.5 ni nueva resolución espacial.