


组合数学入门




重庆南开信竞基础课程

重庆南开信竞

1. 排列组合的基础知识

排列与组合




问题1：从1到9这九个数字中选三个数字出来组成一个三位数(其中不能有重复的数字)，问有多少种方案？

解： 方案数= $9*8*7=504$ **排列问题！**

问题2：从学号为1到9这九同学中选三个同学出来打扫教室清洁，问有多少种方案？

解： 方案数= $(9*8*7)/(3*2*1)=84$ **组合问题！**

排列与组合



排列的定义：


从n个不同的元素中，取m个不重复的元素，按次序排列，称为从n个中取m个的排列。

方案数用 A_n^m 来表示！（代码中写作A[n][m]）

$$A_n^m = \frac{n!}{(n-m)!}$$

例如：从n个不同的球中,取出m个,放入m个**不同**的盒子里，每盒1个。
方案总数为A[n][m]。

排列与组合



问题3 排队：

有6个同学，编号1到6。让这6个同学站成一队，要求5号一定要站在2号的前面，问总共有多少种不同的排队方案？

比如 3 5 1 6 2 4就是一种合法的方案


首先，不考虑5和2的位置限制，直接对6个同学进行全排列，有 A_6^6 种，即720种方案。

然后，考虑在这720种方案中，2和5的先后位置一定各占一半。即有一半的方案是2在5前，有一半是2在5后。

最后，答案为 $720/2=360$ 种方案

方法二：考虑插板

排列与组合



组合的定义：


从n个不同的元素中，取m个不重复的元素，不考虑次序，称为从n个中取m个的组合。

方案数用 C_n^m 来表示！（代码中写作C[n][m]）

$$C_n^m = \frac{n!}{(n-m)! * (m!)}$$

例如：从n个不同的球中,取出m个,放入m个**相同**的盒子里，每盒1个。
方案总数为C[n][m]。

排列与组合



问题4 人选：

a. 一班有10名同学，二班有8名同学。要在每个班级选出2名同学参加信息学竞赛，问有多少种选法？


根据乘法原理，方案数为： $C_{10}^2 * C_8^2 = 1260$

b. 某班有10名同学，其中有4名女生。要选出3名同学参加信息学竞赛，其中至少有一个女生，问有多少种选法？

根据乘法和加法原理，方案数为：

$$C_4^1 * C_6^2 + C_4^2 * C_6^1 + C_4^3 * C_6^0 = 100$$

排列与组合



问题5 买糖果：

学校小卖部出售5种不同口味的糖果。何老板要买8颗糖，它希望每种口味的糖果都至少有一颗，问总共有多少种不同的购买方案？


此问题可反过来考虑，它等价于把8颗相同的糖果分配到5个不同的盒子里，求总的方案数。

我们考虑把这8颗糖果摆成一排，糖果间有7个空档。

我们在这7个空档中安插4块隔板，就能把糖果分成5份。

总的方案数为 $C_7^4 = 35$

排列与组合



问题6 体操队形：

体操队7个同学站成一排，组成表演队形。其中4个男生，3个女生。教练要求，3个女生必须站在一起。问，有多少种不同的队形？


3个女生必须站在一起，我们可以考虑把她们看成1个人，加上4名男生，总共当作有5个同学。

5名同学的排列方案为 A_5^5

其中代表女生的那个同学本身内部也有多种排列方案，方案数为 A_3^3 。

根据乘法原理，总的方案数为 $A_5^5 * A_3^3 = 720$

排列与组合



问题7 体操队形：

体操队10个同学站成一排，组成表演队形。其中7个男生，3个女生。教练要求，女生必须站在男生之间，且女生互不相邻。问，有多少种不同的队形？

从限制条件来看，男生限制少，女生限制多。我们考虑先排男生。


男生：7名男生的排列方案为 A_7^7

女生：女生不能相邻。我们考虑把女生安插在男生之间。

7名男生之间有6个空档，选择其中3个空档来安插女生。共 A_6^3 种方案。

根据乘法原理，总的方案数为 $A_7^7 * A_6^3 = 604800$

组合数的性质



$$C_n^m = C_n^{n-m}$$

$$C_n^m = C_{n-1}^m + C_{n-1}^{m-1}$$

$$C_n^0 + C_n^1 + C_n^2 + \dots + C_n^n = 2^n$$


证明第3个式子：

设 C_n^m 表示 n 个人中选 m 个出来打扫清洁的方案数。

方案一：不选第 n 号人，即前 $n-1$ 个中选 m 个

方案二：要选第 n 号人，即前 $n-1$ 个中选了 $m-1$ 个

组合数的计算



$$C_n^m = C_{n-1}^m + C_{n-1}^{m-1}$$

//打表法,计算 $C[i][j] \bmod k$

```
long long C[1000][1000];
```

```
for(int i=1;i<=n;i++)C[i][0]=1;
```

```
for(int i=1;i<=n;i++)
```

```
    for(int j=1;j<=i;j++)
```


```
        C[i][j] = (C[i-1][j]+C[i-1][j-1]) % k;
```

大组合数取模请参看后面的“Lucas定理”。

2. 二项式定理

$$C_n^0 + C_n^1 + C_n^2 + \dots + C_n^n = 2^n$$

二项式定理(牛顿二项式定理)




n 是一个正整数。于是，对所有的 x 和 y , 求 $(x+y)^n$ 展开后，每一项的系数

$$(x+y)^n = C_n^0 * x^n * y^0 + C_n^1 * x^{n-1} * y^1 + C_n^2 * x^{n-2} * y^2 + \dots + C_n^{n-1} * x^1 * y^{n-1} + C_n^n * x^0 * y^n$$

$$\text{即: } (x+y)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k * x^{n-k} * y^k$$

习题：NKOJ1327


重庆南开信竞



3. 斯特林数

Stirling Numbers

第二类斯特林数



问题：何老板请客1 NK OJ4440

何老板在NK食堂订了 m 桌酒席，宴请信竞队的 n 名队员。由你来安排队员们就座。要求每桌至少坐1人。问总共有多少种安排方案？


第二类斯特林数 $S_2[n][m]$ 表示把 n 个元素划分成 m 个非空集合的方案数。

$$S_2[n][m] = S_2[n-1][m-1] + m * S_2[n-1][m]$$

将第 n 个同学单独划入一个新的桌子中，即第 n 个同学独占一个桌子。前 $n-1$ 个同学划分到 $m-1$ 个桌子中。

前 $n-1$ 个同学被分成了 m 个桌子。第 n 个同学加入到已经存在的 m 个桌子中，共 m 种选择。


第二类斯特林数 代码模板



```
long long s2[maxn][maxn];    //存放要求的Stirling数
const long long mod=1e9+7;   //取模

void getStirling()
{
    for(i=1;i<=n;i++) s2[i][1]=1;
    for(int i=1;i<=n;i++)
        for(int j=2;j<=i&& j<=m;j++)
            s2[i][j]=(s2[i-1][j-1]+j*s2[i-1][j])%mod;
}
```


第一类斯特林数




问题：何老板请客2 NK OJ4441

何老板在NK食堂订了 m 桌酒席，宴请信竞队的 n 名队员。酒桌为圆形。由你来安排队员们就座。要求每桌至少坐1人，最多坐 n 人。问总共有多少种不同的安排方案？


注意，同一桌队员就座的位置会影响方案数，比如A,B,C,D同桌，下面两种就座方案是不同的：



下面4种方案，我们认为它们是同一种方案：



第一类斯特林数




第一类斯特林数 $S_1[n][m]$ 表示把 n 个元素划分成 m 个非空**循环排列**集合的方案数。

$$S_1[n][m] = S_1[n-1][m-1] + (n-1) * S_1[n-1][m]$$

将第 n 个同学单独划入一个新的桌子中，即第 n 个同学独占一个桌子。前 $n-1$ 个同学划分到 $m-1$ 个桌子中。

前 $n-1$ 个同学被分成了 m 个桌子。把第 n 个同学安置到已经存在的 $n-1$ 个同学种任意一个的左边即可。共 $n-1$ 种方案。

第一类斯特林数 代码模板




```
long long s1[maxn][maxn];    //存放要求的Stirling数
const long long mod=1e9+7;    //取模

void getStirling()
{
    for(i=0;i<=n;i++) s1[i][i]=1;

    for(i=1;i<=n;i++)
        for(j=1;j<=m&& j<=i;j++)
            s1[i][j]=(s1[i-1][j-1]+(i-1)*s1[i-1][j])%mod;
}
```

BELL数



问题：何老板请客4


何老板在NK宴请信竞队的 n 名队员。要求每桌至少坐1人。问总共有多少种安排方案(注意没有规定有多少张桌子)？

BELL数 $B[n]$ 表示把 n 个元素划分成若干个非空集合的方案数。

$$B[n] = S_2[n][1] + S_2[n][2] + S_2[n][3] + \dots + S_2[n][N]$$

4. Lucas定理

大组合数取模 Lucas定理



计算 $C_n^m \bmod p$

$0 \leq m \leq n \leq 100000$, p 是质数

Lucas定理：

定理1.

n 、 m 是非负整数， p 是质数，求 $C(n, m) \bmod p$

把 n 和 m 写成 p 进制：

$$m = a_k * p^k + a_{k-1} * p^{k-1} + \dots + a_1 * p^1 + a_0 * p^0$$

$$n = b_k * p^k + b_{k-1} * p^{k-1} + \dots + b_1 * p^1 + b_0 * p^0$$

$$C(n, m) \% p = C(b_k, a_k) * C(b_{k-1}, a_{k-1}) * \dots * C(b_1, a_1) * C(b_0, a_0) \% p$$

例1. 求 $C(22, 10) \bmod 3$


$$22 = 2 * 3^2 + 1 * 3^1 + 1 * 3^0$$

$$10 = 1 * 3^2 + 0 * 3^1 + 1 * 3^0$$

$$C(22, 10) \% 3 = C(2, 1) * C(1, 0) * C(1, 1) \% 3$$

$$= 2 * 1 * 1 \% 3 = 2$$

大组合数取模 Lucas定理



计算 $C_n^m \bmod p$

$0 \leq m \leq n \leq 100000$, p 是质数

Lucas定理 :

n 、 m 是非负整数, p 是质数, 求 $C(n, m) \bmod p$


$\text{Lucas}(n, m, p) = C(n, m) \% p$

$\text{Lucas}(n, m, p) = C(n \% p, m \% p) * \text{Lucas}(n / p, m / p, p)$

例2. 求 $C(22, 10) \bmod 3$

$\begin{aligned} \text{Lucas}(22, 10, 3) &= C(22 \% 3, 10 \% 3) * \text{Lucas}(22 / 3, 10 / 3, 3) \\ &= C(1, 1) * \text{Lucas}(7, 3, 3) \\ &= C(1, 1) * C(1, 0) * \text{Lucas}(2, 1, 3) \\ &= C(1, 1) * C(1, 0) * C(2, 1) \% 3 \\ &= 2 \end{aligned}$

Lucas定理 代码模板1




```
typedef long long LL;

LL C(LL a, LL b)
{
    if(a < b)    return 0;
    if(a == b)  return 1;
    if(b > a - b)    b = a - b;    //C(a,b)=C(a,a-b)

    LL A = 1, B = 1;
    for(LL i = 0; i < b; ++i)
    {
        //C(a,b)=a!/((a-b)!*b!)
        A = (A * (a - i)) % p;    //计算a*(a-1)*...*(a-b+1) 即a!/(a-b)!
        B = (B * (b - i)) % p;    //计算b*(b-1)*...*1 即b!
    } //C(a,b)%p = (A/B)%p ,需要求B的逆元, p是质数, 根据费马小定理, 用快速幂求逆
    return (A * KSM(B,p-2,p)) % p;
}


LL Lucas(LL n, LL m)
{
    if(m == 0) return 1;
    return C(n % p, m % p) * Lucas(n / p, m / p) % p;
}
```

Lucas定理 代码模板2



```
LL KSM(LL a, LL b, LL p)  //二分快速幂求 $a^b \bmod p$ 
{
    LL ans = 1;
    while(b)
    {
        if(b&1) ans = (ans * a) % p;
        a = (a*a) % p;
        b >>= 1;
    }
    return ans;
}
```

大组合数取模 Lucas定理



计算 $C_n^m \bmod p$


$0 \leq m \leq n \leq 100000$

p 是合数

需要用到“扩展Lucas定理”
详情自行百度！



习题



NKOJ	1327	4051	4052
NKOJ	4440	4441	4442
NKOJ	4801		