

# Épisode 4

Jean-Baptiste Bertrand

28 janvier 2022

## Composition du moment cinétique

Exemple simple : composition de spins  $\frac{1}{2}$

$$\text{E.C.O.C : } \mathbf{S}_1^2 \mathbf{S}_2^2 S_{1z} S_{2z}$$

$$\left| \frac{1}{2}, \epsilon_1 \right\rangle \otimes \left| \frac{1}{2}, \epsilon_2 \right\rangle = \left| \frac{1}{2}, \frac{1}{2}; \epsilon_1, \epsilon_2 \right\rangle \rightarrow |\epsilon_1, \epsilon_2\rangle \quad \text{Car les spins sont toujours } 1/2 \text{ dans notre cas}$$

$$\mathbf{S}_1^2 |\epsilon_1, \epsilon_2\rangle = \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} + 1 \right) \hbar^2 |\epsilon_1, \epsilon_2\rangle$$

$$\mathbf{S}_{1z} |\epsilon_1, \epsilon_2\rangle = \frac{\epsilon_1}{2} \hbar |\epsilon_1, \epsilon_2\rangle$$

$$\text{nouvel E.C.O.C : } \mathbf{S}_1^2, \mathbf{S}_2^2, \mathbf{S}^2, S_z$$

On peut vérifier qu'il commutent tous entre eux mais on le fera pas.

On peut également vérifier la complétion. On va le vérifier plus tard.

Cela induit nécessairement une nouvelle base

$$\left| \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, S, M \right\rangle \rightarrow |S, M\rangle$$

$$|S, M\rangle = \mathcal{K} |S, M\rangle$$

$$|SM\rangle = \sum_{\epsilon_1, \epsilon_2} |\epsilon_1, \epsilon_2\rangle \langle \epsilon_1, \epsilon_2 | S, M \rangle$$

Les coefficients de cette expression sont appelés Clebsch-Gordan

$$\mathbf{S}^2 |S, M\rangle = S(S+1)\hbar^2 |S, M\rangle$$

$$S_z |S, M\rangle = M\hbar |SM\rangle$$

$$\boxed{S \geq M \geq -S}$$

$$\text{Contrainte } S_z |\epsilon_1, \epsilon_2\rangle = (S_{1z} + S_{2z}) |\epsilon_1, \epsilon_2\rangle = \underbrace{\left(\frac{\epsilon_1}{2} + \frac{\epsilon_2}{2}\right)\hbar}_{M\hbar} |\epsilon_1, \epsilon_2\rangle$$

$$\Rightarrow M_{\max} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$$

$m \setminus S$	1 (triplet)	0 (singulet)
1	$ 1, 1\rangle =  +, +\rangle$	
0	$ 1, 0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}[ +-\rangle +  -+\rangle]$	$ 0, 0\rangle =  +, -\rangle -  -+\rangle$
-1	$ 1, -1\rangle =  --\rangle$	

Pour savoir comment les nouveau opérateur agissent sur les vecteur, on exprime les nouveaux vecteur et opérateurs en fonctions des anciens

$$\mathbf{S}^2 |1, 1\rangle = (\mathbf{S}_1 + \mathbf{S}_2)^2 |+, +\rangle = (\mathbf{S}_1^2 + \mathbf{S}_2^2 + 2\mathbf{S}_1\mathbf{S}_2) |+, +\rangle = \left( \mathbf{S}_1^2 + \mathbf{S}_2^2 + 2\underbrace{(S_{1x}S_{2x} + S_{1y}S_{2y} + S_{1z}S_{2z})}_{S_{1+}S_{2+} + S_{1-}S_{2-}} \right) |+, +\rangle$$

On fait le produit scalaire et on retrouver  $S_{\pm}$

$$|0, 0\rangle = \alpha |+, -\rangle + \beta |-+\rangle$$

On a les contraintes  $\alpha^2 + \beta^2 = 1$  et  $\frac{\alpha}{\sqrt{2}} + \frac{\beta}{\sqrt{2}} = 0$  par orthogonalité.

## Généralisation à des spins plus grands : spins $J_1$ et $J_2$ fixées

L'idée reste la même. On part d'un acien ECOC

$$\text{ECOC : } \mathbf{J}_1^2, \mathbf{J}_2^2, J_{1z}, J_{2z}$$

$$\text{Base } |J_1, m_1\rangle \otimes |J_2, m_2\rangle \rightarrow |J_1, J_2; m_1, m_2\rangle$$

$$\mathbf{J}_1^2 |J_1 J_2 m_1 m_2\rangle = J_1(J_1 + 1)\hbar^2 |J_1 J_2 m_1 m_2\rangle$$

$$\mathbf{J}_{1z} |J_1 J_2 m_1 m_2\rangle = m_1\hbar |J_1 J_2 m_1 m_2\rangle$$

nouvel ECOC  $\mathbf{J}_1^2, \mathbf{J}_2^2, \mathbf{J}^2, J_z$

$$\boxed{-J \leq M \leq J}$$

On fait le même changement de base avec les coefficients de Clebsch-Gordan. Au lieu d'une somme sur epsilon on doit maintenant sommer sur tout les  $m_1$  et  $m_2$

On trouve, de manière similaire a précédement

$$\boxed{M = m_1 + m_2}$$

Encore une fois, on veut maintenant trouver les nouveau vecteurs propres.

$M \setminus J$	$J_1 + J_2$	$J_1 + J_2 - 1$
$M_{\max} = J_1 + J_2$	$ J_1 + J_2, J_1 + J_2\rangle$	
$J_1 + J_2 - 1$	$ J_1 + J_2, J_1 + J_2 - 1\rangle$	$ J_1 + J_2 - 1, J_1 + J_2 - 1\rangle$
$\dots$	$\dots$	$\dots$
$-J_1 - J_2$	$ -J_1 - J_2, -J_1 - J_2\rangle$	

$$|J_1 + J_2, J_1 + J_2\rangle = |J_1, J_2; J_1, J_2\rangle$$

$$\underbrace{J_-}_{J_1 - + J_2 -} \underbrace{|J_1 + J_2, J_1 + J_2\rangle}_{J_1, J_2; J_1, J_2} = \hbar \underbrace{\sqrt{(J_1 + J_2)(J_1 + J_2 + 1) - (J_1 + J_2)(J_1 + J_2 - 1)}}_{2(J_1 + J_2)} |J_1, J_2; J_1, J_2\rangle$$

$J_{1-} + J_{2-}$  S'applique et donne aussi des longues racines, je suis pas trop sur de la conclusion... On verifié que ça marche je crois