

Physique subatomique

Théorie quantique des champs

La QFT est une théorie très réductionniste. L'idée est de comprendre le monde à partir de l'échelle la plus petite possible.

Remarque (Historique/Paradigme)

Démocrite à la première théorie "réductionniste". Il pense que les atomes sont agencé de manière aléatoire (non divine). Il pense que tout les atomes sont différents. Un théorie qui s'y oppose est la théorie des élément qui viennent seulement en 4 types mais ou tout est continue.

Ces deux théorie on été "combinée" par Dalton qui parlait d'atome d'un nombre de type fini.

En théorie quantique des champs est très continue. Des champs émane les particules et non le contraire.

Il existe une correspondance en QFT entre les types de particules (ex. électrons). et les champs. Il y a deux grandes catégories de champs (particules donc) : les fermions (qui ont un spin demi-entier) et les bosons (qui ont un spin entier). Les fermions sont beaucoup moins "classiques" que les bosons.

Familles				
	Q	1	2	3
Leptons	0	ν_e	ν_μ	ν_τ
	-1	e	μ	τ
Quarks	$\frac{2}{3}$	u	c	t
				b
	$-\frac{1}{3}$	d	s	

FIGURE 1 – fermions

Il est impossible d'isoler un quark seul. On ne peut qu'observer des combinaisons de quarks.

Tout les fermions sont décrits par l'équation de Dirac. Au contraire, les bosons sont décrits par des théories de Gauge. Bien que ces transformation de Gauge soient présenté comme relativement peut importante dans le cadre de l'électromagnétiste,




FIGURE 2 – bosons

c'est le fondement de la QFT.

Toutes les particules en QFT ont une antiparticule qui leur est associée, bien que les bosons soient pour la plupart leur propre anti-particule (sauf $W^+ \leftrightarrow W^-$)

Les champs sont toujours dans leur état fondamental, sauf lorsqu'il y a des particules. L'exception à cette règle est le champ de Higgs qui a une valeur constante non-nulle.

Les masses

Remarque (unités)

On n'utilise pas le système SI dans le cadre de la QFT. Les masses sont plutôt exprimées en MeV. On utilise également souvent les unités naturelles ($c = 1$ $\hbar = 1$). Le fait que $c = 1 \implies$ on ne fait pas de différence entre longueur et temps. $\hbar = 1 \implies E = \omega$. Comme tout peut finalement s'exprimer en énergie on prend une unité d'énergie : le MeV.

$(q, q, q) \leftrightarrow$ baryons (sont des fermions)

proton $\rightarrow uud \sim 238\text{MeV} \sim 1\text{GeV}$

neutron $\rightarrow udd \sim 237\text{MeV}$

mesons $\rightarrow q\bar{q}$ (sont des bosons)

pions $\pi^0 : u\bar{u} \quad \pi^+ : u\bar{d} \quad \pi^- : \bar{u}d$

Les muons : on deux cents fois la masses de l'électron.




FIGURE 3 – pluie

Rappels sur la relativité

quadrivecteur :

$$x = (t, x, y, z)$$

$$x^\mu = [t, x, y, z]$$

$$p^\mu = [E, p]$$

$$k^\mu = [\omega, k] = \frac{1}{\hbar} p^\mu$$

$$j^\mu = [p, \vec{j}]$$

$$\partial_\mu = [\frac{\partial}{\partial t}, \nabla]$$

$$A'^\mu = \Lambda^\mu_\nu A^\nu \text{ Contravariant}$$

$$A'_\mu = (\Lambda^{-1})^\nu_\mu A_\nu \text{ Covariant}$$

$$A_{\mu\nu} = g_{\nu\mu} A^\nu \quad A^\mu = g^{\nu\mu} A_\nu$$

Où g est le tenseur métrique.

Quadri-vecteur :

$$\partial_{\mu\nu} j^\mu(x) = \partial'_\mu j'^\mu \text{ scalaire (donc invariant)}$$