

# 高显经典力学习题解答

数据风暴中的避风港

二〇二四年十月二十二日

---

数据风暴中的避风港 社区成员共同编写, 本习题解答及其  $\text{\LaTeX}$  代码符合 MIT 许可.

链接: [HTTPS://GITHUB.COM/PHYU/GAOXIAN](https://github.com/PHYU/GAOXIAN).

编写成员均为物理专业或非物理专业的物理爱好者, 编写过程中难免有许多纰漏, 欢迎指出, 也欢迎加入 数据风暴中的避风港 大家庭 (QQ 群: 832100706).

2024 年 10 月

# 目录

第一章 变分法	1
第二章 位形空间	3

# 第一章 变分法

## 1.1 给定 $f(t)$ 的泛函

$$S[f] = - \int dt e^{-V(f(t))} \sqrt{1 - (f'(t))^2}$$

其中  $V$  是  $f$  的任意函数. 求  $S[f]$  取极值时,  $f(x)$  的欧拉-拉格朗日方程.

参考解答 1.1 记  $L = e^{-V(f(t))} \sqrt{1 - (f'(t))^2}$ , 则

$$\frac{\partial L}{\partial f} = V \frac{dV}{df} e^{-V(f(t))} \sqrt{1 - (f'(t))^2}, \quad \frac{\partial L}{\partial f'} = e^{-V(f(t))} \frac{f'(t)}{\sqrt{1 - (f'(t))^2}}$$

$$\begin{aligned} \delta S &= \int dt \left( V \frac{dV}{df} e^{-V(f(t))} \sqrt{1 - (f'(t))^2} \delta f + e^{-V(f(t))} \frac{f'(t)}{\sqrt{1 - (f'(t))^2}} \delta f' \right) \\ &\simeq \int dt \left( V \frac{dV}{df} e^{-V(f(t))} \sqrt{1 - (f'(t))^2} - \frac{d}{dt} \left( e^{-V(f(t))} \frac{f'(t)}{\sqrt{1 - (f'(t))^2}} \right) \right) \delta f \end{aligned}$$

因此, Euler-Lagrange 方程为

$$-\frac{\delta S}{\delta f} = -V \frac{dV}{df} f' e^{-V(f(t))} \frac{f'}{\sqrt{1 - f'^2}} + e^{-V(f(t))} \frac{f'' + (1 - f')f'^2}{(1 - f'^2)^{3/2}} - V \frac{dV}{df} e^{-V(f(t))} \sqrt{1 - f'^2} = 0$$

## 1.2 给定 $f(t)$ 的泛函 $S[f] = \int dt L$ , 其中 $L = (f'(t))^2 + f(t)f'(t) + \frac{1}{2}f(t)f''(t)$ .

(1) 求一阶泛函导数  $\frac{\delta S}{\delta f}$ ;

(2) 将  $L$  改写成  $L = \tilde{L} + \frac{dF}{dt}$  的形式, 要求  $\tilde{L}$  中不包含  $f''(t)$ , 求  $\tilde{L}$  和  $F$ ;

(3) 求泛函  $\tilde{S}[f] = \int dt \tilde{L}$  的一阶泛函导数  $\frac{\delta \tilde{S}}{\delta f}$ , 并比较其和  $\frac{\delta S}{\delta f}$  的异同.

参考解答 2.1 (1)

$$\begin{aligned} \delta S &= \int dt \delta L = \int dt \left( \left( f' + \frac{1}{2}f'' \right) \delta f + (2f' + f) \delta f' + \frac{1}{2}f \delta f'' \right) \\ &\simeq \int dt \left( f' + \frac{1}{2}f'' - \frac{d}{dt} (2f' + f) + \frac{d^2}{dt^2} \left( \frac{1}{2}f \right) \right) \delta f \\ \frac{\delta S}{\delta f} &= -f'' \end{aligned}$$

(2) 假设  $F = \frac{1}{2}ff'$ , 则  $\frac{dF}{dt} = \frac{1}{2}f'^2 + \frac{1}{2}ff''$ ,  $\tilde{L} = ff' + \frac{1}{2}f'^2$  满足题意.

(3)

$$\begin{aligned}
\delta \tilde{S}[f] &= \int dt \delta \tilde{L} = \int dt (f' \delta f + (f + f') \delta f') \\
&\simeq \int dt \left( f' - \frac{d}{dt}(f + f') \right) \delta f \\
\frac{\delta \tilde{S}}{\delta f} &= -f''
\end{aligned}$$

注意到  $\frac{\delta \tilde{S}}{\delta f} = \frac{\delta S}{\delta f}$ .

**1.3** 给定两个函数  $n(t)$  和  $a(t)$  的泛函  $S[n, a] = \int_{t_1}^{t_2} dt na^3 \left( A(n) + 3B(n) \frac{a'^2}{n^2 a^2} \right)$ , 其中  $A, B$  是  $n(t)$  的任意函数. 求泛函  $S[n, a]$  取极值时,  $n(t)$  和  $a(t)$  的欧拉-拉格朗日方程.

**参考解答 3.1**

$$\begin{aligned}
\delta S &= \int dt \left( a^3 \left( A(n) + 3B(n) \frac{a'^2}{n^2 a^2} \right) + na^3 \left( \frac{dA}{dn} + 3 \frac{dB}{dn} \frac{a'^2}{n^2 a^2} - \frac{3}{2} B(n) \frac{a'^2}{n^3 a^2} \right) \right) \delta n \\
-\frac{\delta S}{\delta n} &= -a^3 A - 3B \frac{aa'^2}{n^2} - na^3 \frac{dA}{dn} - 3n \frac{dB}{dn} \frac{aa'^2}{n^2} + \frac{3}{2} nB \frac{aa'^2}{n^3} = 0 \\
\delta S &= \int dt \left( 6B \frac{aa'}{n} \delta a' + \left( 3nAa^2 + 3B \frac{a'^2}{n} \right) \delta a \right) \\
&\simeq \int dt \left( -\frac{d}{dt} \left( 6B \frac{aa'}{n} \right) + 3nAa^2 + 3B \frac{a'^2}{n} \right) \delta a \\
-\frac{\delta S}{\delta a} &= \frac{d}{dt} \left( 6B \frac{aa'}{n} \right) - 3nAa^2 - 3B \frac{a'^2}{n} = 0
\end{aligned}$$

## 第二章 位形空间