
a
H1 robustness (black: 95% CI; grey: 95% prediction interval)
Validation cohorts (primary H1), k = 6
All cohorts, k = 7
Whole-blood cohorts, k = 4
Isolated-leukocyte cohorts, k = 3
28-day mortality cohorts, k = 5
Hospital/in-hospital mortality, k = 2
Immature neutrophil (adj. T cell), k = 7
T cell (adj. immature neutrophil), k = 7
1.41 (1.18–1.68)
1.40 (1.22–1.61)
1.35 (1.09–1.68)
1.45 (1.15–1.83)
1.37 (1.15–1.63)
1.48 (1.12–1.97)
1.21 (1.05–1.40)
0.79 (0.65–0.95)
0.3
0.5
1
2
4
7
Odds ratio per SD for death (age and sex adjusted)
b
Mediation sensitivity
Primary: ML, MHC-II, inflammation
Extended: + B cell, + T cell
Lymphoid only: B cell + T cell
GSE185263, no SOFA
GSE185263, + SOFA
−0.5
0.0
0.5
1.0
Natural indirect effect of 10 years of age (percentage points)
c
Decision curves (n = 791)
0.12
0.10
0.08
0.06
0.04
0.02
0.00
−0.02
Net benefit
10
20
30
Risk threshold (%)
Treat all
Age + sex
Age + sex + ML
Age + sex + 11-gene
Age + sex + 11-gene + ML