



دانشگاه صنعتی شریف

دانشکده مهندسی کامپیوتر

فرایندهای تصادفی در بیوانفورماتیک

نیمسال دوم ۱۴۰۰-۱۴۰۱

استاد: محمدحسین رهبان

گردآورندگان: محمدعلی صدراایی جواهری و امیرحسین عاملی

بررسی و بازبینی: مهران حسین زاده

پاسخ تمرین دوم

فرایندهای تصادفی ایستا و ارگادیک

مهلت ارسال: ۲۴ فروردین

۱. درست نادرست (۱۰ نمره)

(آ) مشابه بازی قمارباز معمولی داریم:

$$\begin{aligned} a_k &= pa_{k+1} + qa_{k-1} + ra_k \\ pa_{k+1} - (1-r)a_k + qa_{k-1} &= 0 \\ p\lambda^2 - (1-r)\lambda + q &= 0 \end{aligned}$$

$$\lambda_{1,2} = \frac{(1-r) \pm \sqrt{(1-r)^2 - 4pq}}{2p}$$

$$\begin{aligned} p+q+r &= 1 \\ p+q &= 1-r \\ (p+q)^2 &= (1-r)^2 \\ p+q-2qp &= (p-q)^2 = (1-r)^2 - 4qp \\ \lambda_{1,2} &= \frac{(1-r) \pm |p-q|}{2p} = \frac{p+q \pm |p-q|}{2p} \end{aligned}$$

بنابراین جواب های بدست آمده دقیقاً برابر حالت معمولی مسئله قمارباز شد و مقادیر a_k برای حالتی که $p \neq q$ برابر

$$a_k = \frac{\left(\frac{q}{p}\right)^N - \left(\frac{q}{p}\right)^k}{\left(\frac{q}{p}\right)^N - 1}$$

می باشد.

(ب) مشابه بخش قبل داریم:

$$\begin{aligned} \tau_k &= p(1 + \tau_{k+1}) + q(1 + \tau_{k-1}) + r(1 + \tau_k) \\ p\tau_{k+1} - (1-r)\tau_k + q\tau_{k-1} &= -1 \end{aligned}$$

طبق مشابهت رابطه بالا با بخش الف، جواب عمومی τ_k مشابه جواب بخش الف خواهد بود. برای جواب خصوصی با در نظر گرفتن $\tau_k = ck$ داریم:

$$\begin{aligned} pc(k+1) - (1-r)ck + qc(k-1) &= -1 \\ c(pk + p - k + rk + qk - q) &= -1 \\ c &= \frac{1}{q-p} \end{aligned}$$

همانطور که مشهود است، جواب های مقدار متوسط زمان پایان بازی نیز مشابه حالت معمولی بازی شد.

(ج) با اثبات مشابه بودن این حالت به حالت معمولی، جواب های این بخش نیز برابر جوابهای مسئله معمولی قمارباز می شود. (نوشتن مراحل برای اخذ نمره نیاز است.)
 به صورت شهودی نیز مشخص بود که با چنین تغییراتی در صورتی که نسبت q به p ثابت باقی بماند مقدار a_k تغییر نخواهد کرد. چون تغییری که در حالت فعلی ایجاد میشود تنها توسط p و q اتفاق می افتد. همچنین با افزایش r مقادیر p و q کمتر از حالتی می شود که $r = 0$ باشد و انتظار می رود زمان جذب بیشتر شود که در رابطه متناظر خود را در بخش اول که تفاضل p و q می باشد نشان می دهد.

۲. درست نادرست (۱۰ نمره)

پاسخ عمومی مساله به صورت زیر است:

$$a_k = c_1 + c_2 \left(\frac{q}{p}\right)^k$$

با اعمال شرایط مرزی داریم:

$$\begin{aligned} a_{-N} &= c_1 + c_2 \left(\frac{q}{p}\right)^{-N} = 0 \\ a_N &= c_1 + c_2 \left(\frac{q}{p}\right)^N = 1 \end{aligned}$$

با حل معادلات بالا و بدست آوردن c_1 و c_2 داریم:

$$a_k = \frac{1}{1 - \left(\frac{q}{p}\right)^{2N}} + \frac{\left(\frac{q}{p}\right)^k}{\left(\frac{q}{p}\right)^N - \left(\frac{q}{p}\right)^{-N}}$$

۳. درست نادرست (۱۰ نمره)

(آ) راه حل سریع:

باتوجه به اینکه تنها یک گره جذب کننده داریم و فرایند irreducible می باشد پس احتمال رسیدن به گره N از تمام گره ها برای ۱ می باشد. راه حل طولانی: رابطه احتمال مطلوب را برای گره ۰ می نویسیم:

$$\begin{aligned} a_0 &= pa_1 + qa_0 \\ pa_0 &= pa_1 \\ a_0 &= a_1 \end{aligned}$$

با نتیجه بدست آمده اگر رابطه احتمال را برای گره ۱ بنویسیم داریم:

$$\begin{aligned} a_1 &= qa_0 + pa_2 \\ a_1 - qa_0 &= pa_2 \\ pa_1 &= pa_2 \\ a_1 &= a_2 \end{aligned}$$

این روند همینطور ادامه دارد تا اینکه به گره ما قبل آخر برسیم:

$$\begin{aligned} a_{N-1} &= qa_{N-2} + p \\ pa_{N-1} &= p \\ a_{N-1} &= 1 \end{aligned}$$

بنابراین مقدار احتمال برای تمام گره‌ها ۱ می‌باشد.

(ب) با شروع از گره ۰ روابط مطلوب را مینویسیم:

$$\begin{aligned}\tau_0 &= p(1 + \tau_1) + q(1 + \tau_0) \\ p\tau_0 &= 1 + p\tau_1 \\ \tau_0 &= 2 + \tau_1\end{aligned}$$

برای گره ۱ داریم:

$$\begin{aligned}\tau_1 &= p(1 + \tau_2) + q(1 + \tau_0) \\ \tau_1 - q\tau_0 &= 1 + p\tau_2 \\ \tau_1 - 1 - 0.5\tau_1 &= 1 + 0.5\tau_2 \\ \tau_1 &= 4 + \tau_2\end{aligned}$$

و اگر برای گره ۲ نیز بنویسیم:

$$\begin{aligned}\tau_2 &= p(1 + \tau_3) + q(1 + \tau_1) \\ \tau_2 - q\tau_1 &= 1 + p\tau_3 \\ \tau_2 - 2 - 0.5\tau_2 &= 1 + 0.5\tau_3 \\ \tau_2 &= 6 + \tau_3\end{aligned}$$

مشاهده می‌شود که برای گره‌های ۰ تا $N - 2$ می‌توان یک رابطه کلی برای $i \in \{1, 2, \dots, N - 1\}$ به صورت زیر نوشت که:

$$\tau_{i-1} = 2i + \tau_i$$

حال برای گره $N - 1$ نیز داریم:

$$\begin{aligned}\tau_{N-1} &= p(1 + \tau_N) + q(1 + \tau_{N-2}) \\ \tau_{N-1} &= p + q(1 + \tau_{N-2}) \\ \tau_{N-1} &= 1 + 0.5\tau_{N-2}\end{aligned}$$

از طرفی در رابطه‌های بازگشتی نیز داشتیم:

$$\tau_{N-2} = 2N - 2 + \tau_{N-1}$$

با حل دو معادله دو مجهولی بالا برای τ_{N-1} داریم: $\tau_{N-1} = 2N$ با استفاده از روابط بازگشتی نیز بقیه مقادیر یافت می‌شوند.