

# 代数整数是单位根的一个刻画

林洁\*

## 1 问题

在代数数论中有一个有趣的小练习:

**命题 1** 一个代数整数  $\alpha$  是单位根当且仅当它所有的共轭模为 1.

用初等的语言描述, 命题 1 即为:

**命题 1'**  $p(x)$  是一个首一整系数多项式,  $\alpha$  是它的根. 若  $p$  所有的根模都为 1, 则  $\alpha$  为单位根. 特别地, 若还已知  $p$  不可约, 则  $p$  是分圆多项式.

而用矩阵的语言, 该命题又等价于:

**命题 1''**  $r$  是一个正整数,  $g \in GL_r(\mathbb{Z})$ . 若  $g$  有  $r$  个不同的复特征根  $\lambda_1, \dots, \lambda_r$ , 且  $|\lambda_1| \leq 1, \dots, |\lambda_r| \leq 1$ , 则存在正整数  $N$ , 使得  $g^N = 1$ . 从而  $\lambda_1^N = \dots = \lambda_r^N = 1$ .

下面我们给出该命题的三种证明, 其中证明 1, 2 需要简单的代数数论知识, 而证明 3 只需要数学分析和高等代数知识.

## 2 证明

**证明 1:** (采用命题1的记号)

记  $\alpha$  在  $\mathbb{Q}$  上的最小多项式为  $P(x) = x^r + c_1x^{r-1} + \dots + c_r$ , 并记  $Gal(\mathbb{Q}(\alpha)/\mathbb{Q}) = \sigma_1, \dots, \sigma_r$ , 其中  $\sigma_1(\alpha) = \alpha$ . 则由条件,  $\forall 1 \leq i \leq r, |\sigma_i(\alpha)| = 1$ . 从而  $\forall n \in \mathbb{N}, \forall 1 \leq i \leq r$ , 有  $|\sigma_i(\alpha^n)| = 1$ .

记  $P_n(x) = \prod_{i=1}^r (x - \sigma_i(\alpha^n)) = x^r + c_{1n}x^{r-1} + \dots + c_{rn}$ . 则

$$\begin{aligned} |c_{kn}| &= \left| \sum_{\substack{1 \leq i_1 < \dots \\ < i_k \leq r}} \sigma_{i_1}(\alpha^n) \dots \sigma_{i_k}(\alpha^n) \right| \\ &\leq \sum_{\substack{1 \leq i_1 < \dots \\ < i_k \leq r}} |\sigma_{i_1}(\alpha^n) \dots \sigma_{i_k}(\alpha^n)| = \binom{r}{k}, \end{aligned}$$

---

\*基数 71

$\forall n \in \mathbb{N}, \forall 1 \leq k \leq r.$

注意到  $P_n$  是整系数多项式, 故对任意给定的  $n, c_{nk} (1 \leq k \leq r)$  的选择都是有限的. 从而  $\{P_n\}_{n=0}^\infty$  是有限集. 进一步地, 由  $P_n(\alpha^n) = 0$  知  $\{\alpha^n\}_{n=0}^\infty$  也是有限集.

故  $\exists n_1 < n_2, s.t. \alpha^{n_1} = \alpha^{n_2}$ , 即  $\alpha^{n_2-n_1} = 1, \alpha$  是单位根.

**证明 2:** (沿用证明 1 中记号)

假设  $\alpha$  不是单位根, 则  $\{\alpha^n\}_{n=1}^\infty$  在单位圆周上稠密 (请读者自行证明). 故  $\exists n \in \mathbb{N}, s.t. |1 - \alpha^n| < \frac{1}{2^r}.$

注意到  $\prod_{i=1}^r (1 - \sigma_i(\alpha^n)) \neq 0$  (否则  $\exists i, \sigma_i(\alpha)$  是单位根, 那么  $\alpha$  也是单位根, 与假设矛盾), 从而  $\prod_{i=1}^r |1 - \sigma_i(\alpha^n)| \geq 1$ . 但  $\prod_{i=1}^r |1 - \sigma_i(\alpha^n)| = |1 - \alpha^n| \prod_{i=2}^r |1 - \sigma_i(\alpha^n)| \leq |1 - \alpha^n| \prod_{i=2}^r (1 + |\sigma_i(\alpha)|) = 2^{r-1} |1 - \alpha^n| < 1/2$ , 矛盾. 故假设不成立, 原命题得证.

在继续证明三之前, 我们先回顾一下范数等价定理. 这是数学分析大二上的内容, 这里就不证明了.

**定理 2**  $\mathbb{R}^n$  (或  $\mathbb{C}^n$ ) 中的范数都是等价的. 从而在任何范数下,  $\mathbb{R}^n$  (或  $\mathbb{C}^n$ ) 的单位闭球总是紧的.

而在下面的情况中, 两个范数等价只需简单的不等式放缩即可证明.

**证明 3:** (采用命题 1'' 中记号)

首先, 由于  $\lambda_1, \dots, \lambda_r$  互不相同知存在可逆方阵  $T$ , 使得  $T^{-1}gT = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_r).$

我们在  $M_n(\mathbb{C})$  中定义范数如下: 对  $x \in M_n(\mathbb{C})$ , 以  $x_{ij}$  表示其第  $ij$  位分量, 定义

$$\|x\| = \|T^{-1}xT\|_\infty := \sup_{1 \leq i, j \leq r} |(T^{-1}xT)_{ij}|,$$

则  $\|\cdot\|$  是  $M_n(\mathbb{C})$  中范数 (请读者自行验证).

一方面,  $\forall n \in \mathbb{N}, \|g^n\| = \|T^{-1}g^nT\|_\infty = \|\text{diag}(\lambda_1^n, \dots, \lambda_r^n)\|_\infty \leq 1$ . 故  $\{g^n\}_{n=0}^\infty \subseteq B(0, 1)$ , 其中  $B(0, 1)$  是  $\|\cdot\|$  下的单位闭球, 是一个紧集.

另一方面,  $\{g^n\}_{n=0}^\infty$  是  $\|\cdot\|$  下的离散集. 事实上, 更一般地,  $GL_r(\mathbb{Z})$  是  $M_r(\mathbb{Z})$  在  $\|\cdot\|$  下的离散集. 这是由于  $GL_r(\mathbb{Z})$  是  $M_r(\mathbb{Z})$  在  $\|\cdot\|_\infty$  下的离散集, 而  $\|\cdot\|_\infty$  与  $\|\cdot\|$  是等价的.

综合两方面, 离散集  $\{g^n\}_{n=0}^\infty$  包含在一个紧集内, 故它是有限集. 即  $\exists n_1 < n_2, s.t. g^{n_1} = g^{n_2}$ , 由  $g$  可逆得到  $g^{n_2-n_1} = 1$ . 得证.

## 参考文献

[1] 冯克勤 著; 代数数论, 科学出版社, 北京, 2000.

[2] 巴黎高师考题, 2006年