


Situación en las Américas (actualización del 9 de febrero 2017)

Desde la semana epidemiológica (SE) 44 de 2016 ningún nuevo país/territorio de las Américas confirmó transmisión autóctona vectorial de Zika. Se mantiene en 48 el número de países y territorios de las Américas que confirmaron casos autóctonos por transmisión vectorial de Zika y en cinco el número de países que notificaron casos de Zika transmitidos sexualmente. **(Figura 1).**

Figura 1. Países y territorios con casos autóctonos confirmados de Zika (transmisión vectorial) 2015-2017.



Fuente: http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=infeccion-por-virus-zika-1&alias=37673-12-enero-2017-zika-actualizacion-epidemiologica-3&Itemid=270&lang=es

América del Norte

En los Estados Unidos de América, el Departamento de Salud de la Florida continúa registrando casos aislados de transmisión local.

En México se observó una tendencia al descenso desde la SE 39 de 2016 con un promedio semanal de 9 casos confirmados en las últimas 4 semanas.

América Central

El número de casos notificados se mantiene estable con un promedio semanal de 369 casos, 317 sospechosos y 52 confirmados, en las últimas cuatro semanas.

En Panamá se mantiene una tendencia creciente de casos sospechosos y confirmados entre las SE 30 de 2016 a la SE 1 de 2017.

Caribe

Si bien todos los países/territorios del Caribe siguen notificando casos, la tendencia se mantiene estable, con un promedio semanal de 598 casos sospechosos y confirmados en las últimas cuatro semanas.

Síndrome congénito asociado con la infección por el virus del Zika

A la fecha, 23 países y territorios de las Américas notificaron casos confirmados de síndrome congénito asociados a la infección por el virus del Zika. En la SE 5 de 2017 México confirmó por primera vez un caso de síndrome congénito asociado a la infección por el virus del Zika. En las últimas dos semanas Argentina, Colombia, los Estados Unidos de América, Guadalupe, Guatemala, Martinica y República Dominicana actualizaron el número de casos de síndrome congénito asociado con la infección por el virus Zika.

Síndrome de Guillain-Barré (SGB) y otras manifestaciones neurológicas

Desde diciembre de 2016, ningún nuevo país o territorio ha notificado casos de Síndrome de Guillain-Barré (SGB) asociado a la infección por el virus del Zika.

Situación Nacional

En este año se ha sospechado 644 casos de los cuales 83 han resultado positivos todos autóctonos de las regiones de Herrera con el 44% de los casos, la mayoría de Monagrillo, La Arena, San Juan Bautista y Chitré; seguido de la región metropolitana. Sumando los casos de los años anteriores tenemos un total de 886 casos registrados. (Ver gráfico 1 y Tabla N°1).

Los tipos de muestras que se han examinado en estos casos son suero y orina.

La tasa de incidencia total con la población del 2017 es de 21.6 casos por 100 mil habitantes, siendo la región de salud mas afectada es la de Guna Yala (429.6 casos por 100mil habitantes) a pesar de que este año no ha registrado casos y su último caso registrado fue en la semana 45 del año 2016. (Ver tabla nº 1 y 2)

De los 86 casos del 2017 se han identificado 5 embarazadas de las regiones de San miguelito y P. Oeste. (Ver tabla nº 3)

GráficoNº1




Tabla N°1.- Número de casos confirmados y tasa de incidencia de Zika por laboratorio según Región sanitaria, República de Panamá, 2015(sem 47) – 2017(sem6).

Regiones	2015	2016	2017	Total	Tasa
Total	39	764	83	886	21.6
Guna Yala*	38	152	0	190	429.6
Herrera	0	98	37	135	113.9
Metro*	1	304	25	330	41.1
San Miguelito*	0	65	9	74	20.3
Bocas del Toro	0	25	0	25	15.1
P. Oeste	0	71	4	75	13.0
Los Santos*	0	10	4	14	14.7
P. Norte	0	20	4	24	9.0
Colón	0	5	0	5	1.8
Darién	0	1	0	1	1.5
Veraguas	0	3	0	3	1.2
Coclé	0	3	0	3	1.1
P. Este	0	1	0	1	0.7
Ngabe Buglé	0	1	0	1	0.5
Importado**	0	5	0	5	

Fuente: Departamento de Epidemiología –MINSA

*Regiones con casos Importados (Metro 31, San Miguelito 3, P. Oeste 1, Guna Yala 1 y Los santos 1)

**casos importados en tránsito por Panamá.

Total de Importados **42** del 2016

Tabla N°2.- Número de casos confirmados de Zika por laboratorio según Región sanitaria y corregimiento, República de Panamá, 2015^(sem 47) – 2017^(sem6).

Región	Corregimiento	Total	2015	2016	2017
Total		886	39	764	83
Guna Yala*	Mulatupu	5	2	3	0
	Ustupu/Ogobsucum	16/7	16/7	0	0
	Achutupu	9	9	0	0
	Pto. Obaldía	10	0	10	0
	Playón Chico	6	3	3	0
	Narganá	59	1	58	0
	Corazón de Jesús	5	0	5	0
	Rio Azúcar	3	0	3	0
	Rio Sidra	5	0	5	0
	Carti Sugdup	33	0	33	0
	Soledad Miriam	5	0	5	0
	Naranjo Chico	2	0	2	0
	Ailitupu	2	0	2	0
	Ailigandi	5	0	5	0
	Nalugena	1	0	1	0
	Mamitupu	4	0	4	0
	Soledad Miria	1	0	1	0
	Wichubhula	1	0	1	0
	Acuatupu	11	0	11	0
	Subtotal	190	38	152	0
Metro*	Tocumen	24	1	23	0
	San Francisco	25	0	25	3
	Mañanitas	3	0	3	0
	Calidonia	8	0	8	0
	Juan Diaz	39	0	39	8
	Curundú	6	0	6	0
	Parque Lefevre	32	0	32	1
	Santa Ana	7	0	7	3
	Rio Abajo	10	0	10	0
	Pueblo Nuevo	7	0	7	0
	Chorrillo	7	0	7	0
	Bella Vista	29	0	29	2
	Bethania	42	0	42	4
	Ancón	13	0	13	2
	San Felipe	2	0	4	0
	Pedregal	2	0	2	1
	24 de Diciembre	11	0	11	1
	Taboga	1	0	1	0
	Las Garzas	1	0	1	0
	Veracruz	34	0	34	0
	Subtotal	305	1	304	25
Panamá Oeste*	Gorgona	3	0	3	0
	Guadalupe	2	0	3	0
	Burunga	2	0	2	0
	San Carlos	3	0	3	1
	Cerro Silvestre	1	0	1	0
	Barrio Balboa	1	0	0	1
	Las Lajas	2	0	2	0
	Chame	13	0	13	0
	Pto. Caimito	1	0	1	0
	Arraiján	28	0	28	0
	La Chorrera	5	0	5	1
	Playa Leona	2	0	2	0
	Juan D. Arosemena	2	0	2	0
	El Coco	6	0	6	1
	Subtotal	71	0	71	4
Panamá Norte	Las cumbres	11	0	11	4
	Chilibre	3	0	3	0
	Ernesto Cordoba	6	0	6	0
	Subtotal	20	0	20	4
Colón	Salamanca	2	0	2	0
	Colón	2	0	2	0
	San Juan	1	0	1	0
	Subtotal	3	0	5	0
San Miguelito*	Jose D. Espinar	29	0	29	3
	Rufina Alfaro	8	0	8	1
	Belisario Frias	5	0	5	3
	Arnulfo Arias	1	0	1	0
	Belisario Porras	3	0	3	0
	Amelia D. Icaza	6	0	6	0
	Victoriano Lorenzo	3	0	3	0
	Omar Torrijos	5	0	5	2
	Mateo Iturralde	5	0	5	0
	Subtotal	65	0	65	9
Los Santos*	La Villa	1	0	1	1
	La Tiza	1	0	0	1
	El Cocal	1	0	0	1
	Las Tablas	7	0	7	1
	Guasimo	1	0	1	0
	Sabana Grande	1	0	1	0
	Subtotal	12	0	10	4
Darién	Rio Congo	1	0	1	0
P. Este	Las Margaritas	1	0	1	0
	Chitré	49	0	49	8
	El Barrero	1	0	1	0
	Los Pozos	2	0	2	0
	Pese	2	0	0	2
	Parita	2	0	0	2
	Llano Bonito	7	0	7	2
	Monagrillo	8	0	8	8
	La Arena	11	0	11	9
	Juan Bautista	20	0	20	6
	Subtotal	102	0	98	37
Herrera	Santiago	3	0	3	0
Veraguas	Bocas del Toro	23	0	23	0
	I. Carenero	1	0	1	0
	I. Bastimento	1	0	1	0
Bocas del Toro	Subtotal	25	0	25	0
Coclé	Antón	1	0	1	0
	Aguadulce	1	0	1	0
	Rio Hato	1	0	1	0
	Subtotal	3	0	3	0
Ngabe Buglé	Kusapin	1	0	1	0
Importados**	Hotel	5	0	5	0

Fuente: Departamento Nacional de Epidemiología/MINSA


Desde inicio de la identificación de la circulación del virus en el territorio nacional se han registrado 157 sospechosas en embarazadas la mayoría en el tercer trimestre, de estas 58 han resultado positivas, de las cuales una del 2015 de Guna Yala con resultado positivo, del 2016 cincuenta y dos (una con resultado positivo del extranjero) y del 2017 cinco. (Ver tabla 3 y gráfico 5).

Tabla N°3 Embarazadas captadas con resultados positivas y negativas por virus Zika según región de salud en la República de Panamá, año 2015_(sem47)- 2017_(sem6).

Región	Positivas		Negativas		Total
Total	58		99		157
	puérpera	embaraza	puérpera	embaraza	
BOCAS DEL TORO	0	0	0	0	0
COCLE	0	0	2	0	2
COLON	0	0	1	1	2
DARIEN	0	0	1	0	1
CHIRIQUI	0	0	9	0	9
HERRERA	0	6	0	1	7
LOS SANTOS	0	1	1	2	4
METROPOLITANA	10	22	9	28	69
P. OESTE	1	4	9	9	23
P. NORTE	2	0	0	2	4
P. ESTE	0	0	1	3	4
SAN MIGUELITO	1	4	4	7	16
VERAGUAS	1	0	0	0	1
GUNA YALA	2	1	3	2	8
NGABE BUGLE	0	2	4	0	6
IMPORTADOS	1	0	0	0	1
SD	0	0	0	0	0
TOTAL	18	40	44	55	157

Fuente: Departamento Nacional de Epidemiología/MINSA

Gráfico N°2



Fuente: Departamento Nacional de Epidemiología/MINSA

Malformaciones congénitas

Tenemos registrado 6 este año con resultados negativos

Síndrome congénito asociado a la infección por virus Zika y síndrome de Guillain Barré

Este año tenemos un caso registrado con resultado negativo.

Medidas de Prevención y Control en Zika

Generalidades de Zika

En la actualidad, no existe una vacuna para prevenir la enfermedad por el virus del Zika ni medicamentos para tratarla. Cuatro de cada cinco personas 4/5 (80%) que contraen la infección por el virus del Zika puede que no presenten síntomas. La enfermedad causada por el virus del Zika es por lo general leve y no requiere hospitalización. Toda la población y en especial mujeres embarazadas deben protegerse [evitando las picaduras de los mosquitos Aedes](#).

Las complicaciones más frecuentes que se están observando causadas por zika son: recién nacidos con cabezas más pequeñas de lo normal y enfermedad del sistema nervioso (parálisis) que puede llevar a la muerte.

A la población y a la comunidad en general se les solicita:

1. Tomar al menos 5 minutos diarios para revisión y eliminación de criaderos en su vivienda (escurridor platos, debajo del fregador, canales de techo, bebedero de animales, tanques de almacenaje de agua, platillos, vasos, tinas de lavar, canales de aguas estancadas, plantas acuáticas, etc.)
2. Limpieza de lotes
3. Revisión y control de Piscinas y fuentes de agua para evitar que se conviertan en criaderos
4. Tener las Llantas bajo techo
5. Los repelentes contra insectos que contienen DEET, picaridina e IR3535 son seguros para las mujeres embarazadas y las que están amamantando, así como para los niños mayores de 2 meses, si se usan de acuerdo con las instrucciones del producto.
6. No se deben usar productos que contengan aceite de eucalipto o de limón en niños menores de 3 años.
7. Usar mosquiteros al descansar, en las cunas y coches de los bebés.
8. Tener mallas en ventanas y puertas.
9. Cualquier denuncia de criaderos hacerla al 311.


A los viajeros

1. Use camisas de manga larga y pantalones largos.
2. Use repelentes contra insectos registrados en la EPA que contengan DEET, picaridina, aceite de eucalipto limón (OLE por sus siglas en inglés) o IR3535. Siempre utilícelos según las instrucciones.
3. Los repelentes contra insectos que contienen DEET, picaridina e IR3535 son seguros para las mujeres embarazadas y las que están amamantando, así como para los niños mayores de 2 meses si se usan de acuerdo con las instrucciones del producto. No se deben usar productos que contengan aceite de eucalipto de limón en niños menores de 3 años.
4. Use ropa y equipos (como botas, pantalones, medias y carpas) tratados con permetrina.
5. Permanezca y duerma en habitaciones con mosquiteros, mallas en las ventanas y puertas, o aire acondicionado.
6. Al regresar de viaje, si presenta síntomas de alerta (fiebre, dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, dolor muscular, dolor articular, erupción cutánea, ojos rojos, náuseas, vómitos, diarrea, malestar general) debe acudir a atención médica.
7. Los hombres que visiten áreas con transmisión utilizar preservativos.



Eliminemos los criaderos

Eliminemos al mosquito Aedes en sus cuatro fases de reproducción:
Huevo, larva, pupa y mosquito adulto.



Juntos podemos lograrlo.