

Guía Básica de Primeros Auxilios en el Hogar

El Botiquín de Emergencia

Todo hogar debe disponer de un botiquín de primeros auxilios bien equipado y en un lugar accesible para los adultos, pero fuera del alcance de los niños. Es fundamental revisar su contenido periódicamente para desechar y reponer los medicamentos caducados.



Un botiquín básico debería contener, al menos, los siguientes elementos:

- Gasas estériles de distintos tamaños.
- Suero fisiológico para limpiar heridas.
- Antisépticos (como povidona yodada o clorhexidina).
- Tiritas, esparadrapo y vendas.
- Tijeras de punta redonda y pinzas.
- Termómetro.
- Guantes de látex o vinilo.

Actuación ante Heridas y Hemorragias

Cortes leves o rasguños

ya que deja restos). Aplique un antiséptico y cubra la zona con una tirita o vendaje si es necesario.

Hemorragias más severas

Si el corte es profundo y sangra abundantemente, el objetivo principal es detener la hemorragia. Coloque varias gasas estériles sobre la herida y presione firmemente con la mano. Si la gasa se empapa, no la retire; coloque otra limpia encima y siga presionando. Eleve la extremidad herida por encima del nivel del corazón y acuda a un centro médico lo antes posible.

Quemaduras Domésticas

Las quemaduras en la cocina o por contacto con aparatos calientes son muy frecuentes. La gravedad de una quemadura depende de su profundidad y extensión.



Lo que **sí** debe hacer:

- Enfriar la zona inmediatamente con agua del grifo a temperatura ambiente (ni muy fría ni helada) durante 15 o 20 minutos.
- Cubrir la quemadura con una gasa limpia y húmeda.
- Acudir al médico si salen ampollas o la quemadura es extensa.

Lo que **nunca** debe hacer:

- No aplique hielo directo, ya que puede empeorar la lesión.
- No rompa las ampollas, ya que aumenta el riesgo de infección.
- No aplique remedios caseros como pasta de dientes, aceite o mantequilla.

Guía Rápida de Síntomas y Reacciones

A continuación, se presenta una tabla de referencia rápida para identificar qué acciones tomar ante diferentes cuadros sintomáticos comunes en el hogar.

SÍNTOMA	POSIBLE CAUSA	ACCIÓN RECOMENDADA
Fiebre alta repentina.	Infección vital o bacteriana.	Tomar antitérmico, hidratarse y monitorizar.

		Consultar al médico si no baja en 48h.
Dolor en el pecho con presión.	Posible problema cardíaco.	Llamar inmediatamente a emergencias (112). No hacer esfuerzos.
Mareo tras golpe en la cabeza.	Conmoción leve.	Reposo en un lugar tranquilo. Acudir a urgencias si hay vómitos o visión borrosa.

Teléfonos de Emergencia

Guarde siempre estos números en un lugar visible (como la puerta de la nevera) o programados en su teléfono móvil:

Emergencias (Válido en toda la UE): 112

Urgencias Médicas: 061

Instituto Nacional de Toxicología: 91 562 04 20