
Aprendizagem Automática

FICHA N. 2

ENUNCIADO

Nome: Ana Sofia Preto Oliveira

Número: A39275

ATENÇÃO: Fixa de respostas múltiplas. Só uma única resposta em cada alínea está correta. Cada alínea vale 2 valores. Respostas erradas descontam 0.5 valores.

1. No ficheiro `A39275_Q001_data.p` estão os resultados de um classificador, num problema de duas classes (negativos e positivos). Há duas variáveis num dicionário: a chave `trueClass` contém os índices da verdadeira classe, enquanto a chave `estClass` contém o resultado da classificação (ambas as variáveis são `np.array`s com valores inteiros 0-negativos, 1-positivos).

(a) Para esta alínea, arredonde os valores pedidos a 3 casas decimais.


i. A taxa de falso positivos (falsos alarmes) é: 0.000.


ii. A taxa de re-chamada (recall) é: 0.600. 

iii. Todas as respostas anteriores.

iv. Nenhuma das respostas anteriores.

(b) Para esta alínea, arredonde os valores pedidos a 1 casa decimal.

i. A percentagem de acertos da classe dos positivos é de 71.0%. 

ii. A percentagem de acertos da classe dos negativos é de 77.8%. 

iii. Todas as respostas anteriores.

iv. Nenhuma das respostas anteriores.

(c) Para esta alínea, use valores inteiros.

i. O número de Verdadeiros Negativos é: 1008.

ii. O número de Falsos Positivos é: 182.

iii. Todas as respostas anteriores.

iv. Nenhuma das respostas anteriores.

2. No ficheiro `A39275_Q002_data.p`, encontram-se dois conjuntos de dados bidimensionais, um para treino e outro para teste, divididos em 3 classes (índices de 0 a 2). Há quatro variáveis num dicionário: as chaves `trueClassTrain` e `trueClassTest` contêm os índices das classes dos dados de treino e de teste, enquanto as chaves `Xtrain` e `Xtest` contêm os dados. Classifique o conjunto de teste com o classificador k vizinhos mais próximos (k NN), com $k = 11$, e utilize a métrica de distância, $\mathcal{D}_\diamond(\mathbf{x}, \mathbf{y})$, entre dois vetores bidimensionais \mathbf{x} e \mathbf{y} (nota: caso haja empate, escolha a classe com menor índice).

$$\mathcal{D}_\diamond(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = (\mathbf{x} - \mathbf{y})^\top \begin{bmatrix} +1 & -2 \\ +1 & +1 \end{bmatrix} (\mathbf{x} - \mathbf{y})$$

(a) Para esta alínea, use valores inteiros.

- i. O número de pontos da classe ϖ_1 classificados na classe ϖ_0 é 0.
 - ii. O número de pontos da classe ϖ_2 classificados na classe ϖ_2 é 135.
 - iii. Todas as respostas anteriores.
 - iv. Nenhuma das respostas anteriores.
 - (b) Para esta alínea, use valores inteiros.
 - i. O número total de erros é de 28.
 - ii. O número de acertos na classe ϖ_2 é de 124.
 - iii. Todas as respostas anteriores.
 - iv. Nenhuma das respostas anteriores.
3. Considere o conjunto de 9 vetores bi-dimensionais, divididos em duas classes $\Omega = \{\varpi_0, \varpi_1\}$, representados na matriz $\mathbf{X} = \begin{bmatrix} -6 & -4 & -2 & -6 & 2 & 1 & 5 & 3 & 4 \\ 1 & 3 & 4 & 4 & 1 & 3 & 3 & 4 & 0 \end{bmatrix}$ (os 4 primeiros vetores do conjunto pertencem à classe ϖ_0).
- (a) Considere que se pretende classificar novos vetores com o classificador de distância ao centroide usando a métrica de distância de Mahalanobis.
 - i. O vetor $\mathbf{x} = [-4, -3]^\top$ é classificado na classe ϖ_1 .
 - ii. O vetor $\mathbf{x} = [1, -3]^\top$ é classificado na classe ϖ_1 .
 - iii. Todas as respostas anteriores.
 - iv. Nenhuma das respostas anteriores.
 - (b) Considere que o conjunto \mathbf{X} foi classificado usando o classificador de distância ao centroide com a métrica de distância euclidiana. Considere ainda que ϖ_0 corresponde à classe dos negativos e ϖ_1 à dos positivos. Para esta alínea, use valores inteiros.
 - i. O número de Verdadeiros Positivos é: 3.
 - ii. O número de Falsos Negativos é: 4.
 - iii. Todas as respostas anteriores.
 - iv. Nenhuma das respostas anteriores.
 - (c) Considere que se pretende classificar novos vetores com o classificador de distância ao centroide usando a métrica de distância de Manhattan.
 - i. O vetor $\mathbf{x} = [1, -3]^\top$ é classificado na classe ϖ_1 .
 - ii. O vetor $\mathbf{x} = [1, 3]^\top$ é classificado na classe ϖ_1 .
 - iii. Todas as respostas anteriores.
 - iv. Nenhuma das respostas anteriores.
 - (d) Para esta alínea, arredonde os valores pedidos a 2 casas decimais.
 - i. A distância de Manhattan entre os vetores de média das duas classes é: 6.30.
 - ii. A distância de cosseno entre os vetores de média das duas classes é: 1.81.
 - iii. Todas as respostas anteriores.
 - iv. Nenhuma das respostas anteriores.
 - (e) Considere que o conjunto \mathbf{X} foi classificado usando o classificador de distância ao centroide com a métrica de distância de cosseno. Considere ainda que ϖ_0 corresponde à classe dos negativos e ϖ_1 à dos positivos. Para esta alínea, use valores inteiros.

- i. O número de acertos na classe dos positivos é de 5.
- ii. O número total de erros é 0.
- iii. Todas as respostas anteriores.
- iv. Nenhuma das respostas anteriores.