

Алгебра. Экзамен

Бобень Вячеслав
[@darkkeks](#), [GitHub](#)

2020

“Какой-то ты слишком идеальный, редуцируем его!”.

— Bottom text

Содержание

1	Бинарные операции. Полугруппы, моноиды и группы. Коммутативные группы. Примеры групп. Порядок группы. Подгруппы. Описание всех подгрупп в группе $(\mathbb{Z}, +)$	3
2	Подгруппы. Циклические подгруппы. Циклические группы. Порядок элемента. Связь между порядком элемента и порядком порождаемой им циклической подгруппы	5
3	Смежные классы. Индекс подгруппы. Теорема Лагранжа	6
4	Пять следствий из теоремы Лагранжа	7
5	Нормальные подгруппы и факторгруппы	8
6	Гомоморфизмы групп. Простейшие свойства гомоморфизмов. Изоморфизмы групп. Ядро и образ гомоморфизма групп, их свойства	9
7	Теорема о гомоморфизме для групп	10
8	Классификация циклических групп	11
9	Прямое произведение групп. Разложение конечной циклической группы. Теорема о строении конечных абелевых групп	12
10	Экспонента конечной абелевой группы и критерий цикличности	13
11	Криптография с открытым ключом. Задача дискретного логарифмирования. Система Диффи Хеллмана обмена ключами. Криптосистема Эль-Гамала	14
12	Кольца. Коммутативные кольца. Обратимые элементы, делители нуля и нильпотенты. Примеры колец. Поля. Критерий того, что кольцо вычетов является полем	15
13	Идеалы колец. Факторкольцо кольца по идеалу. Гомоморфизмы и изоморфизмы колец. Ядро и образ гомоморфизма колец. Теорема о гомоморфизме для колец	16
14	Кольцо многочленов от одной переменной над полем: деление с остатком, наибольший общий делитель двух многочленов, теорема о его существовании и линейном выражении	17
15	Теорема о том, что кольцо многочленов от одной переменной над полем является кольцом главных идеалов	18
16	Неприводимые многочлены. Факториальность кольца многочленов от одной переменной над полем	19

17	Критерий того, что факторкольцо $\mathbb{K}[x]/(h)$ является полем. Базис и размерность факторкольца $\mathbb{K}[x]/(h)$ как векторного пространства над полем \mathbb{K}	20
18	Лексикографический порядок на множестве одночленов от нескольких переменных. Лемма о конечности убывающих цепочек одночленов	21
19	Старший член многочлена от нескольких переменных. Элементарная редукция многочлена относительно другого многочлена. Лемма о конечности цепочек элементарных редукций относительно системы многочленов	22
20	Остаток многочлена относительно заданной системы многочленов. Системы Грёбнера. Характеризация систем Грёбнера в терминах цепочек элементарных редукций	23
21	S -многочлены. Критерий Бухбергера	24
22	Базис Грёбнера идеала в кольце многочленов от нескольких переменных, теорема о трёх эквивалентных условиях. Решение задачи вхождения многочлена в идеал	25
23	Лемма о конечности цепочек одночленов, в которых каждый следующий одночлен не делится ни на один из предыдущих. Алгоритм Бухбергера построения базиса Грёбнера идеала	26
24	Теорема Гильберта о базисе идеала	27
25	Редуцируемость к нулю S -многочлена двух многочленов с взаимно простыми старшими членами	28
26	Характеристика поля. Расширение полей. Конечное расширение и его степень. Степень композиции двух расширений	29
27	Присоединение корня неприводимого многочлена. Существование конечного расширения исходного поля, в котором заданный многочлен (а) имеет корень; (б) разлагается на линейные множители	30
28	Алгебраические и трансцендентные элементы. Минимальный многочлен алгебраического элемента и его свойства	31
29	Подполе в расширении полей, порождённое алгебраическим элементом	32
30	Порядок конечного поля. Автоморфизм Фробениуса	33
31	Теорема существования для конечных полей	34
32	Цикличность мультипликативной группы конечного поля и неприводимые многочлены над \mathbb{Z}_p	35

1 Бинарные операции. Полугруппы, моноиды и группы. Коммутативные группы. Примеры групп. Порядок группы. Подгруппы. Описание всех подгрупп в группе $(\mathbb{Z}, +)$

Определение 1. Множество с бинарной операцией — это множество M с заданным отображением

$$M \times M \rightarrow M, \quad (a, b) \mapsto a \circ b.$$

Множество с бинарной операцией обычно обозначают (M, \circ) .

Определение 2. Множество с бинарной операцией (M, \circ) называется *полугруппой*, если данная бинарная операция ассоциативна, то есть

$$a \circ (b \circ c) = (a \circ b) \circ c \quad \text{для всех } a, b, c \in M.$$

Не все естественно возникающие операции ассоциативны. Например, если $M = \mathbb{N}$ и $a \circ b = a^b$, то

$$2^{(1^2)} = 2 \neq (2^1)^2 = 4.$$

Другой пример неассоциативной бинарной операции: $M = \mathbb{Z}$ и $a \circ b := a - b$.

Полугруппу обычно обозначают (S, \circ) .

Определение 3. Полугруппа (S, \circ) называется *моноидом*, если в ней есть *нейтральный элемент*, то есть такое элемент $e \in S$, что $e \circ a = a \circ e = a$ для любого $a \in S$.

Замечание. Если в полугруппе есть нейтральный элемент, то он один. В самом деле, $e_1 \circ e_2 = e_1 = e_2$.

Определение 4. Моноид (S, \circ) называется *группой*, если для каждого элемента $a \in S$ найдется *обратный элемент*, то есть такой $b \in S$, что $a \circ b = b \circ a = e$.

Обратный элемент обозначается a^{-1} .

Группу принято обозначать (G, \circ) или просто G , когда понятно, о какой операции идёт речь. Обычно символ \circ обозначения операции опускают и пишут просто ab .

Определение 5. Группа G называется *коммутативной* или *абелевой*, если групповая операция *коммутативна*, то есть $ab = ba$ для любых $a, b \in G$.

Если в случае произвольной группы G принято использовать мультипликативные обозначения для групповой операции — gh, e, g^{-1} , то в теории абелевых групп чаще используют аддитивные обозначения, то есть $a + b, 0, -a$.

Определение 6. *Порядок* группы G — это число элементов в G . Группа называется *конечной*, если её порядок конечен, и *бесконечной* иначе.

Порядок группы G обозначается $|G|$.

Приведем несколько серий примеров групп.

1. Числовые аддитивные группы:

$$(\mathbb{Z}, +), (\mathbb{Q}, +), (\mathbb{R}, +), (\mathbb{C}, +), (\mathbb{Z}_n, +).$$

2. Числовые мультипликативные группы:

$$(\mathbb{Q} \setminus \{0\}, \times), (\mathbb{R} \setminus \{0\}, \times), (\mathbb{C} \setminus \{0\}, \times), (\mathbb{Z}_p \setminus \{0\}, \times), p — простое.$$

3. Группы матриц:

$$\text{GL}_n(\mathbb{R}) = \{A \in \text{Mat}_{n \times n}(\mathbb{R}) \mid \det A \neq 0\};$$

$$\text{SL}_n(\mathbb{R}) = \{A \in \text{Mat}_{n \times n}(\mathbb{R}) \mid \det A = 1\}.$$

4. Группы перестановок:

симметрическая группа S_n — все перестановки длины n , $|S_n| = n!$;

знакопеременная группа A_n — чётные подстановки длины n , $|A_n| = \frac{n!}{2}$.

5. Группы преобразований: симметрия, движение.

Определение 7. Подмножество H группы G называется *подгруппой*, если выполнены следующие три условия:

1. $e \in H$;
2. $ab \in H$ для любых $a, b \in H$;
3. $a^{-1} \in H$ для любого $a \in H$.

В каждой группе G есть *несобственные* подгруппы $H = \{e\}$ и $H = G$. Все прочие подгруппы называются *собственными*. Например, чётные числа $2\mathbb{Z}$ образуют собственную подгруппу в $(\mathbb{Z}, +)$.

Предложение. Всякая подгруппа в $(\mathbb{Z}, +)$ имеет вид $k\mathbb{Z}$ для некоторого целого неотрицательного k .

Доказательство. Очевидно, что все подмножества вида $k\mathbb{Z}$ являются подгруппами в \mathbb{Z} .

1. Пусть $H \subseteq \mathbb{Z}$ — подгруппа. Если $H = \{0\}$, то $H = 0\mathbb{Z}$.

Иначе положим $k = \min(H \cap \mathbb{N}) \neq 0$.

Тогда $k\mathbb{Z} \subseteq H$.

2. Покажем, что $k\mathbb{Z} = H$. Пусть $a \in H$. Поделим на k с остатком.

$a = qk + r$, где $q \in \mathbb{Z}$, $0 \leq r < k \implies r = a - qk \in H$.

В силу выбора k получаем $r = 0 \implies a = qk$. ■

2 Подгруппы. Циклические подгруппы. Циклические группы. Порядок элемента. Связь между порядком элемента и порядком порождаемой им циклической подгруппы

Пусть G — группа, $g \in G$ и $n \in \mathbb{Z}$. Определим степень следующим образом:

$$g^n = \begin{cases} \underbrace{g \cdots g}_n, & n > 0, \\ e, & n = 0 \\ \underbrace{g^{-1} \cdots g^{-1}}_n, & n < 0. \end{cases}$$

Свойства:

1. $g^m \cdot g^n = g^{m+n}, \forall n, m \in \mathbb{Z}$;
2. $(g^k)^{-1} = g^{-k}, \forall k \in \mathbb{Z}$;
3. $(g^n)^m = g^{nm}, \forall n, m \in \mathbb{Z}$.

Определение 8. Пусть G — группа и $g \in G$. Циклической подгруппой, порожденной элементом g , называется подмножество $\{g^n \mid n \in \mathbb{Z}\}$ в G .

Циклическая подгруппа, порождённая элементом g , обозначается $\langle g \rangle$. Элемент g называется *порождающим* или *образующим* для подгруппы $\langle g \rangle$.

Например, подгруппа $2\mathbb{Z}$ в $(\mathbb{Z}, +)$ является циклической, и в качестве порождающего элемента в ней можно взять $g = 2$ или $g = -2$. Другими словами, $2\mathbb{Z} = \langle 2 \rangle = \langle -2 \rangle$.

Определение 9. Группа G называется *циклической*, если найдется такой элемент $g \in G$, что $G = \langle g \rangle$.

Определение 10. Пусть G — группа и $g \in G$. *Порядком* элемента g называется такое наименьшее натуральное число m , что $g^m = e$. Если такого натурального числа m не существует, говорят, что порядок элемента g равен бесконечности.

Порядок элемента обозначается $\text{ord}(g)$. Заметим, что $\text{ord}(g) = 1$ тогда и только тогда, когда $g = e$.

Следующее предложение объясняет, почему для порядка группа и порядка элемента используется одно и то же слово.

Предложение. Пусть G — группа и $g \in G$. Тогда $\text{ord}(g) = |\langle g \rangle|$.

Доказательство. Заметим, что если $g^k = g^s$, то $g^{k-s} = e$. Поэтому если элемент g имеет бесконечный порядок, то все элементы $g^n, n \in \mathbb{Z}$, попарно различны, и подгруппа $\langle g \rangle$ содержит бесконечно много элементов. Если же порядок элемента g равен m , то из минимальности числа m следует, что элементы $e = g^0, g = g^1, g^2, \dots, g^{m-1}$ попарно различны. Далее, для всякого $n \in \mathbb{Z}$ мы имеем $n = mq + r$, где $0 \leq r \leq m-1$, и

$$g^n = g^{mq+r} = (g^m)^q g^r = e^q g^r = g^r.$$

Следовательно, $\langle g \rangle = \{e, g, g^2, \dots, g^{m-1}\}$ и $|\langle g \rangle| = m$. ■

Ясно, что всякая циклическая группа коммутативна и не более чем счётна. Примерами циклических групп являются группы $(\mathbb{Z}, +)$ и $(\mathbb{Z}_n, +), n \geq 1$.

3 Смежные классы. Индекс подгруппы. Теорема Лагранжа

Определение 11. Пусть G — группа, $H \subseteq G$ — подгруппа и $g \in G$. *Левым смежным классом* элемента g группы G по подгруппе H называется подмножество

$$gH = \{gh \mid h \in H\}.$$

Наряду с левым смежным классом можно определить *правый смежный класс* элемента g :

$$Hg = \{hg \mid h \in H\}.$$

Все дальнейшие доказательства для правых смежных классов формулируются и доказываются аналогично.

Лемма 3.1. Пусть G — группа, $H \subseteq G$ — её подгруппа и $g_1, g_2 \in G$.

Тогда либо $g_1H = g_2H$, либо $g_1H \cap g_2H = \emptyset$.

Доказательство. Предположим, что $g_1H \cap g_2H \neq \emptyset$, то есть $g_1h_1 = g_2h_2$ для некоторых $h_1, h_2 \in H$. Нужно доказать, что $g_1H = g_2H$. Заметим, что $g_1H = g_2h_2h_1^{-1}H \subseteq g_2H$. Обратное включение доказывается аналогично. ■

Лемма 3.2. Пусть G — конечная группа и $H \subseteq G$ — конечная подгруппа.

Тогда $|gH| = |H|$ для любого $g \in G$.

Доказательство. Поскольку $gH = \{gh \mid h \in H\}$, в gH элементов не больше, чем в H . Если $gh_1 = gh_2$, то домножаем слева на g^{-1} и получаем $h_1 = h_2$. Значит, все элементы вида gh , где $h \in H$, попарно различны, откуда $|gH| = |H|$. ■

Определение 12. Пусть G — группа и $H \subseteq G$ — подгруппа. *Индексом* подгруппы H в группе G называется число левых смежных классов G по H .

Индекс группы G по подгруппе H обозначается $[G : H]$.

Теорема 3.3 (Теорема Лагранжа). Пусть G — конечная группа и $H \subseteq G$ — подгруппа. Тогда

$$|G| = |H| \cdot [G : H].$$

Доказательство. Каждый элемент группы G лежит в (своём) левом смежном классе по подгруппе H , разные смежные классы не пересекаются (лемма 1) и каждый из них содержит по $|H|$ элементов (лемма 2). ■

4 Пять следствий из теоремы Лагранжа

5 Нормальные подгруппы и факторгруппы

6 Гомоморфизмы групп. Простейшие свойства гомоморфизмов. Изоморфизмы групп. Ядро и образ гомоморфизма групп, их свойства

7 Теорема о гомоморфизме для групп

8 Классификация циклических групп

9 Прямое произведение групп. Разложение конечной циклической группы. Теорема о строении конечных абелевых групп

10 Экспонента конечной абелевой группы и критерий цикличности

- 11 Криптография с открытым ключом. Задача дискретного логарифмирования. Система Диффи Хеллмана обмена ключами. Криптосистема Эль-Гамала

12 Кольца. Коммутативные кольца. Обратимые элементы, делители нуля и нильпотенты. Примеры колец. Поля. Критерий того, что кольцо вычетов является полем

- 13 Идеалы колец. Факторкольцо кольца по идеалу. Гомоморфизмы и изоморфизмы колец. Ядро и образ гомоморфизма колец. Теорема о гомоморфизме для колец

- 14 Кольцо многочленов от одной переменной над полем: деление с остатком, наибольший общий делитель двух многочленов, теорема о его существовании и линейном выражении

- 15 Теорема о том, что кольцо многочленов от одной переменной над полем является кольцом главных идеалов

16 Неприводимые многочлены. Факториальность кольца многочленов от одной переменной над полем

- 17 Критерий того, что факторкольцо $\mathbb{K}[x]/(h)$ является полем. Базис и размерность факторкольца $\mathbb{K}[x]/(h)$ как векторного пространства над полем \mathbb{K}

18 Лексикографический порядок на множестве одночленов от нескольких переменных. Лемма о конечности убывающих цепочек одночленов

- 19 Старший член многочлена от нескольких переменных. Элементарная редукция многочлена относительно другого многочлена. Лемма о конечности цепочек элементарных редукций относительно системы многочленов

20 Остаток многочлена относительно заданной системы многочленов. Системы Грёбнера. Характеризация систем Грёбнера в терминах цепочек элементарных редукций

22 Базис Грёбнера идеала в кольце многочленов от нескольких переменных, теорема о трёх эквивалентных условиях. Решение задачи вхождения многочлена в идеал

- 23 Лемма о конечности цепочек одночленов, в которых каждый следующий одночлен не делится ни на один из предыдущих. Алгоритм Бухбергера построения базиса Грёбнера идеала

25 Редуцируемость к нулю S -многочлена двух многочленов с взаимно простыми старшими членами

26 Характеристика поля. Расширение полей. Конечное расширение и его степень. Степень композиции двух расширений

- 27 Присоединение корня неприводимого многочлена. Существование конечного расширения исходного поля, в котором заданный многочлен (а) имеет корень; (б) разлагается на линейные множители

28 Алгебраические и трансцендентные элементы. Минимальный многочлен алгебраического элемента и его свойства

29 Подполе в расширении полей, порождённое алгебраическим элементом

31 Теорема существования для конечных полей

32 Цикличность мультипликативной группы конечного поля и неприводимые многочлены над \mathbb{Z}_p