

ТФКП, М3238-39

30 апреля 2019 г.

1 Комплексные числа

1.1 Решить уравнение $\bar{z} = z^{n-1}, (n \neq 2)$

1.2 Доказать, что оба значения $\sqrt{z^2 - 1}$ лежат на прямой, проходящей через начало координат и параллельной биссектрисе внутреннего угла треугольника с вершинами в точках $-1, 1$ и z , проведённой из вершины z .

1.3 Доказать, что $(\sqrt[n]{z})^m$ (n, m - целые числа, а (n, m) - наибольший общий делитель) имеет $\frac{n}{(n, m)}$ различных значений

1.4 Доказать $|1 - \bar{z}_1 z_2|^2 - |z_1 - z_2|^2 = (1 - |z_1|^2)(1 - |z_2|^2)$

1.5 Доказать, что если $|z_1 + z_2 + z_3| = 0$ и $|z_1| = |z_2| = |z_3| = 1$, то точки z_1, z_2, z_3 являются вершинами правильного треугольника

1.6 Изобразить область или прямую:

- $|z - 2|^2 - |z + 2|^2 > 3;$
- $\log_{\frac{1}{2}} \frac{|z-1|+4}{3|z-1|-2} > 1;$
- $Im(\overline{z^2 - z}) = 2 - Imz;$
- $|z| - 3Imz = 6;$

1.7 Определить семейство линий в z -плоскости ($-\infty < C < \infty$), заданных уравнениями:

- $Re \frac{1}{z} = C$
- $Im \frac{1}{z} = C$
- $\frac{|z - z_1|}{|z - z_2|} = \lambda, (\lambda > 0)$

1.8 Доказать, что многочлен $f(x) = (\cos \alpha + x \sin \alpha)^n - \cos n\alpha - x \sin n\alpha$ делится на $x^2 + 1$.

1.9 Найти наибольшее и наименьшее расстояния от начала координат до линии $|z + \frac{1}{z}| = a, (a > 0)$

1.10 Первоначальное значение $Argf(z)$ при $z = 2$ принято равным 0. Точка z делает один оборот против часовой стрелки по окружности с центром в начале координат и возвращается в точку $z = 2$. Считая, что $Argf(z)$ меняется непрерывно при движении точки z , указать значение $Argf(2)$ после указанного поворота, если:

- $f(z) = \sqrt{z-1}$
- $f(z) = \sqrt{z^2 + 2z - 3}$
- $f(z) = \sqrt{\frac{z-1}{z+1}}$

1.11 Доказать, что $\frac{x^{2m} - a^{2m}}{x^2 - a^2} = \prod_{k=1}^{m-1} (x^2 - 2ax \cos \frac{k\pi}{m} + a^2)$.

1.12 Найти на сфере Римана образы окружностей с центром в начале координат

1.13 Найти на комплексной плоскости образ параллели с широтой $\phi, (\pi/2 \leq \phi \leq \pi/2)$.

1.14 Найти суммы $S_n = 1 + \frac{\sin x}{\sin x} + \frac{\sin 2x}{\sin^2 x} + \dots + \frac{\sin nx}{\sin^n x}, \sigma_n = 1 + \frac{\cos x}{\sin x} + \frac{2x}{\sin^2 x} + \dots + \frac{\cos nx}{\sin^n x}$

1.15 Решить систему уравнений $\begin{cases} z^3 + w^5 = 0 \\ z^2 \bar{w}^4 = 1 \end{cases}$

1.16 Найти все корни следующих уравнений:

$$\sin z + \cos z = 2; \quad (1)$$

$$\sin z - \cos z = 3; \quad (2)$$

$$\operatorname{sh} z - \operatorname{ch} z = 2i; \quad (3)$$

$$2 \operatorname{ch} z + \operatorname{sh} z = i; \quad (4)$$

$$\cos z = \operatorname{ch} z; \quad (5)$$

$$\cos z = i \operatorname{sh} 2z. \quad (6)$$

2 Отображения

2.1 Как действует отображение e^z на прямую $x = y$, прямую ($y = \operatorname{const}, x \in R$), полосу $y \in (\phi, \psi), x \in R$?

2.2 Какая функция отображает полуплоскость $\operatorname{Im} z > 0$ в окружность единичного радиуса с центром в начале координат, причём $z_0 \rightarrow (0; 0)$?

- 2.3 Найти образы координатных осей OX и OY при преобразовании $w = \frac{z+1}{z-1}$.
- 2.4 Найти линейное преобразование, отображающий треугольник с вершинами $0, 1, i$ на подобный ему с вершинами $0, 2, 1+i$.
- 2.5 Найти линейную функцию, отображающую круг $|z| < 1$ на круг $|w - w_0| < R$ так, чтобы центры кругов соответствовали друг другу и горизонтальный диаметр переходил в диаметр, образующий угол α с направлением действительной оси.
- 2.6 Построить область на плоскости w , в которую отображается угол $0 < \phi < \pi/4$ с помощью функции $w = \frac{z}{z-1}$.
- 2.7 Во что преобразуется окружность $|z| = 1$ при отображении $w = \frac{1-z}{z}$?
- 2.8 В какую область преобразуется круг $|z - 1/2 + i/2| \leq \frac{\sqrt{2}}{2}$ при отображении $w = \frac{iz-2}{z+i}$?
- 2.9 Найти в какую область преобразуется квадрат $0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1$ функцией $w = z^2 + z + 1$.
- 2.10 Найти образ плоскости с разрезом вдоль положительной части вещественной оси при отображении однозначной ветвью логарифма, когда $z_0 = i$ переходит в $w_0 = \frac{5}{2}\pi i$.
- 2.11 Отобразить треугольник, заключённый между прямыми $y = 2, x = 0, y = x$ с помощью функции $w = 1/2z^2 - z$ на плоскость w .
- 2.12 Найти однолистное и конформное отображение вертикальной полосы $1 < \operatorname{Re} z < 2$ на верхнюю полуплоскость $\operatorname{Im} w > 0$.

3 Разрезы

- 3.1 Найти однолистное и конформное отображение полосы $0 < \operatorname{Im} z < \pi$ с разрезом $-\infty < \operatorname{Re} z \leq 0, \operatorname{Im} z = \frac{\pi}{2}$ на полосу $0 < \operatorname{Im} w < \pi$.
- 3.2 Найти функцию $w(z)$, конформно отображающую всю плоскость z с разрезом по дуге окружности $|z| = 1, \operatorname{Im} z > 0$, на всю плоскость w с разрезом по отрезку $[-1, 1]$ и удовлетворяющую условиям $w(1) = 1, w(\infty) = \infty$.
- 3.3 Найти функцию $w(z)$, конформно отображающую полукруг $|z| < 1, \operatorname{Im} z > 0$, на всю плоскость w на круг $|w| < 1$.
- 3.4 Найти функцию $w(z)$, конформно отображающую разрезанную по отрезку $[0, i]$ полуплоскость $\operatorname{Im} z > 0$ на круг $|w| < 1$ и удовлетворяющую условиям $w(\frac{5i}{4}) = 0, w(i) = -i$.
- 3.5 Найти однолистное и конформное отображение верхней полуплоскости с разрезом по отрезку от точки $z_1 = 0$ до точки $z_2 = i$ на верхнюю полуплоскость $\operatorname{Im} w > 0$.
- 3.6 Найти функцию $w(z)$, конформно отображающую круг $|z| < 1$, разрезанный по радиусу $[1/3, 1]$ на круг $|w| < 1$.
- 3.7 Найти функцию $w(z)$, конформно отображающую верхнюю полуплоскость $\operatorname{Im} z > 0$ с вырезанной точкой $z = ih$, где h - вещественное число, на верхнюю полуплоскость $\operatorname{Im} w > 0$.

- 3.8 Найти функцию, отображающую область $\frac{\pi}{4} < \arg(z) < \frac{3\pi}{4}$ с разрезом по мнимой оси в виде луча $Imz > h, Rez = 0$ на область $Imz > 0$.
- 3.9 Найти какую-либо функцию $w(z)$, конформно отображающую область $Im(z) > 0, z \notin [k\pi, k\pi + i\pi], (k = 0, \pm 1, \dots)$, на верхнюю полуплоскость.
- 3.10 Найти конформное отображение расширенной плоскости z с разрезом вдоль дуги АВ окружности, концы которой лежат в точках $\pm a$ вещественной оси (внешность дуги АВ), на внешность круга расширенной плоскости W , граница которого проходит через те же точки $\pm a$ (*построение профилей Жуковского*)

4 Пределы функции

4.1 Найти все точки, в которых дифференцируемы функции:

- Rez ;
- $x^2 + iy^2$;
- tgz ;
- $\frac{\cos z}{\cos z - \sin z}$;

4.2 Вывести условия Коши-Римана для представления комплексных чисел в полярных координатах.

4.3 Функция $w = \frac{Imz}{z}$ определена для $z \neq 0$. Можно ли доопределить ее в точке $z = 0$ так, чтобы она стала непрерывной в этой точке? 4.4 Вычислить пределы последовательностей

- $z_n = \left(\frac{n-2}{n+2}\right)^{-3n} + i\left(1 + \frac{5}{n-2}\right)^{4n}$;
- $z_n = \frac{\sin 5z}{z^2 + \sin 3z}$;

4.5 Найти области дифференцируемости функций:

- $w = z + i\bar{z}$;
- $Re(w) = \arctg \frac{y}{x} + x^2 + y^2$;
- $w = \frac{z+5i}{iz-7}$;
- $w = e^{\bar{z}^2}$;
- $w = |x^2 - y^2| + 2i|zy|$;
- $w = \sin x \sin y - i \cos x \cos y$;

4.6 Проверить аналитичность и восстановить, где это возможно функцию:

- $v = \arctg \frac{y}{x} + e^x \sin y + 3y$;

- $v = e^{3x} \cos 3y;$
- $u = \ln(x^2 + y^2) + x^2;$

4.7 Разложить в ряд Тейлора в окрестности точки a и определить область сходимости:

- $z^3, a = 2;$
- $e^z, a = 3;$
- $\frac{1}{1-z^2}, a = 0;$
- $\frac{1}{z}, a = 1;$
- $\frac{z}{(1-z^2)^3}, a = 0;$
- $\int_0^z \frac{\sin z}{z}, a = 0;$
- $\int_0^z e^{z^2}, a = 0;$
- $f(z) = \sqrt{z+3}, a = 1, f(1) = -2;$
- $f(z) = \operatorname{Arcsin} z, a = 0, f(0) = 4\pi.$

4.8 Представить рядом Лорана по степеням (za) и определить область сходимости:

- $\frac{z}{(z-a)^n}, a = a;$
- $\frac{1}{z^2(z-b)^3}, a = 0, (b = \text{const});$
- $z^3 \cos \frac{1}{z}, a = 0;$
- $z^5 e^{\frac{1}{z}}, a = 0.$

4.9 Разложить в ряд Фурье (рассмотреть как ряд Лорана с $\sum c_n z^n, z = e^{i\phi}$ на окружности $|z| = 1$):

- $\frac{1-a \cos \phi}{1-2a \cos \phi + a^2}, -1 < a < 1;$
- $\frac{1}{1-a \sin \phi}, -1 < a < 1;$
- $\cos \phi (1 + a^2 \cos^2 \phi), 0 < a < 1;$
- $\ln |\sin \frac{\phi}{2}|;$
- $\frac{\pi - \phi}{2}.$

Hint. $\ln |\sin \frac{\phi}{2}| = \operatorname{Re} \ln \frac{1-e^{i\phi}}{2}$

5 Интегрирование функции комплексного переменного. Вычеты

5.1 Вычислить интеграл $\int (z - a)^n dz$, n -целое число, по

- полуокружности $|z - a| = R, 0 \leq \arg(z - a) \leq \pi$, начало пути в точке $z = a + R$;
- по окружности $|z - a| = R$;
- по периметру квадрата с центром в точке a и сторонам, параллельным осям координат.

5.2 Вычислить интегралы:

- $\int_{|z|=1} z^n \operatorname{Ln} z dz$, где n -целое число, (а) $\operatorname{Ln}(1) = 0$, (б) $\operatorname{Ln}(-1) = \pi i$;
- $\int_0^{\infty} e^{-x^2} \cos(2bx) dx$;
- $\int_0^{\infty} \frac{\sin x}{x} dx$;
- $\int_0^{\infty} x^{s-1} \cos x dx, 0 < s < 1, \gamma(t) = \int_0^{\infty} x^{t-1} e^{-x} dx$;

5.3 Доказать, что если $|a| \neq R$, то

$$\int_{|z|=R} \frac{|dz|}{|z - a||z + a|} < \frac{2}{|R^2 - |a|^2|}$$

5.4 Доказать, что "Для того чтобы изолированная особая точка z_0 функции $f(z)$ была существенно особой, необходимо и достаточно, чтобы главная часть лорановского разложения функции $f(z)$ в окрестности z_0 содержала бы бесконечное число членов: $f(z) = \sum_{n=-\infty}^{n=\infty} a_n(z - z_0)^n$ ".