Вводное занятие. Знакомство

anastasiya.zhyrkevich@yandex.ru

Дискретная математика Cеминар 1

09 February, 2020

Краткое содержание

Структура курса

Знакомство

Введение в математическую логику

Решение задачи 1

Составление таблицы истинности

Домашнее задание

Дискретная математика

- 1. Курс состоит из 16 семинарских занятий
- 2. Зачет в конце курса
- 3. 2 теста на irunner, 2 контрольные работы
- 4. Отметка за курс среднее письменных работ

Дискретная математика (cont.)

- 1. Семинары в формате разбора задач
- 2. Строгие требования к письменным работам
- 3. Начало курса может показаться простым
- 4. Задавайте вопросы
- 5. Чат в ТГ

Дискретная математика (cont.)

Самая полезная ссылка

https://acm.bsu.by/wiki/DM2020

Все данные, все условия задач.

Полезные ссылки

- 1. github с полными данными семинаров
- 2. Диск с данными семинаров

Знакомство

Жиркевич Анастасия Борисовна

Телеграм @anastzhyr

+375296601770

Anastasiya.Zhyrkevich@gmail.com

Знакомство (cont.)

Игра

- ▶ Интересный факт
- ▶ Животное, с которым Вы себя ассоциируете
- Что такое дискретная математика? Знакомы ли с предметом? Что ожидаете от него?

Введение в математическую логику

Материал лекции:

- 1. Понятие простого высказывания True, False
- 2. Логические связки:
 - HE (отрицание) \overline{A}
 - И (конъюнкция) ∧ ·
 - ИЛИ (дизъюнкция) ∨
 - ullet СЛЕДУЕТ (импликация) ightarrow
- 3. Таблица истинности формулы

Решение задачи 1

Импликация.

$$A \rightarrow B$$

Таблица истинности

 $A \rightarrow B$

Аналоги в русском языке:

- **▶** Если *A*, то *B*
- ightharpoonup B в том случае, если A
- ▶ При *A* будет *B*
- ▶ Из А следует В
- ightharpoonup В случае A произойдёт B
- ▶ B, так как A
- \triangleright B, потому что A
- ▶ A достаточное условие для B
- ▶ B необходимое условие для A

Задание:

Выделив условие и заключение теоремы, сформулируйте ее посредством связки "Если ..., то ... "

Задание:

Выделив условие и заключение теоремы, сформулируйте ее посредством связки "Если ..., то ... "

1. Для того, чтобы функция была дифференцируема в некоторой точке, необходимо, чтобы она была непрерывна в этой точке

Задание:

Выделив условие и заключение теоремы, сформулируйте ее посредством связки "Если ..., то ... "

1. Для того, чтобы функция была дифференцируема в некоторой точке, необходимо, чтобы она была непрерывна в этой точке

Ответ:

Если функция была дифференцируема в некоторой точке, то она непрерывна в этой точке

Решение зад \overline{a} чи 1 (cont.)

Задание:

Выделив условие и заключение теоремы, сформулируйте ее посредством связки "Если ..., то ... "

2. Необходимым свойством прямоугольника является равенство его диагоналей.

Задание:

Выделив условие и заключение теоремы, сформулируйте ее посредством связки "Если ..., то ... "

2. Необходимым свойством прямоугольника является равенство его диагоналей.

Ответ:

Если фигура прямоугольник, то у него равны диагонали.

Задание:

Выделив условие и заключение теоремы, сформулируйте ее посредством связки "Если ..., то ... "

3. Для делимости многочлена f(x) на линейный двучлен x-a достаточно, чтобы исло a было корнем этого многочлена.

Задание:

Выделив условие и заключение теоремы, сформулируйте ее посредством связки "Если ..., то ... "

3. Для делимости многочлена f(x) на линейный двучлен x-a достаточно, чтобы число a было корнем этого ногочлена.

Ответ:

Если число a корень многочлена, то многочлен f(x) делится на линейный двучлен x-a

Задание:

Выделив условие и заключение теоремы, сформулируйте ее посредством связки "Если ..., то ... "

4. На 5 делятся те целые числа, которые оканчиваются цифрой 0 или цифрой 5

Задание:

Выделив условие и заключение теоремы, сформулируйте ее посредством связки "Если ..., то ... "

4. На 5 делятся те целые числа, которые оканчиваются цифрой 0 или цифрой 5

Ответ:

Если число оканчивается на 0 или 5, то число делится на 5.

19 / 40

Задание:

Выделив условие и заключение теоремы, сформулируйте ее посредством связки "Если ..., то ... "

5. Две прямые на плоскости тогда параллельны, когда они перпендикулярны одной и той же прямой.

Задание:

Выделив условие и заключение теоремы, сформулируйте ее посредством связки "Если ..., то ... "

5. Две прямые на плоскости тогда параллельны, когда они перпендикулярны одной и той же прямой.

Ответ:

Если две прямые перпендикулярны одной и той же прямой, то они параллельны.

Решение зад \overline{a} чи 1 (cont.)

Задание:

Выделив условие и заключение теоремы, сформулируйте ее посредством связки "Если ..., то ... "

6. Комплексные числа равны, только если равны соответсвенно их действительные и мнимые части.

22 / 40

Задание:

Выделив условие и заключение теоремы, сформулируйте ее посредством связки "Если ..., то ... "

6. Комплексные числа равны, только если равны соответсвенно их действительные и мнимые части.

Ответ:

Если равны соответсвенно действительные и мнимые части комплексных чисел, то числа равны.

Задание:

Выделив условие и заключение теоремы, сформулируйте ее посредством связки "Если ..., то ... "

7. Всякое квадратное уравнение с действительными коэффициентами имеет не более двух действительных корней.

Задание:

Выделив условие и заключение теоремы, сформулируйте ее посредством связки "Если ..., то ... "

7. Всякое квадратное уравнение с действительными коэффициентами имеет не более двух действительных корней.

Ответ:

Если уравнение с действительными коэффииентами, то оно имеет не более двух действительных корней.

Задание:

Выделив условие и заключение теоремы, сформулируйте ее посредством связки "Если ..., то ... "

8. Из того, что четырехугольник – ромб, следует, что каждая ихз его диагоналей служит его осью симметрии.

Задание:

Выделив условие и заключение теоремы, сформулируйте ее посредством связки "Если ..., то ... "

8. Из того, что четырехугольник – ромб, следует, что каждая ихз его диагоналей служит его осью симметрии.

Ответ:

Если четырехугольник – ромб, то каждая ихз его диагоналей служит его осью симметрии.

Задание:

Выделив условие и заключение теоремы, сформулируйте ее посредством связки "Если ..., то ... "

9. Четность суммы есть необходимое условие четности каждого слагаемого.

Задание:

Выделив условие и заключение теоремы, сформулируйте ее посредством связки "Если ..., то ... "

9. Четность суммы есть необходимое условие четности каждого слагаемого.

Ответ:

Если каждое слагаемое четно, то сумма - четна.

Решение зад \overline{a} чи 1 (cont.)

Задание:

Выделив условие и заключение теоремы, сформулируйте ее посредством связки "Если ..., то ... "

10. Равенство треугольников есть достаточное условие их равновеликости.

Задание:

Выделив условие и заключение теоремы, сформулируйте ее посредством связки "Если ..., то ... "

10. Равенство треугольников есть достаточное условие их равновеликости.

Ответ:

Если треугольники равны, то они равновелики.

Задание:

Выделив условие и заключение теоремы, сформулируйте ее посредством связки "Если ..., то ... "

11. Для делимости произведения на некоторое число достаточно, чтобы по меньшей мере один из сомножителей делился на это число.

32 / 40

Задание:

Выделив условие и заключение теоремы, сформулируйте ее посредством связки "Если ..., то ... "

11. Для делимости произведения на некоторое число достаточно, чтобы по меньшей мере один из сомножителей делился на это число.

Ответ:

Если хоть один из сомножителей делится на число, то и произведение делится на это же число.

Составим таблицу истинности

$$(A \rightarrow B) \lor (A \rightarrow (A \cdot B))$$

$$(A \rightarrow B) \lor (A \rightarrow (A \cdot B))$$

Нумеруем последовательность операций по приоритету.

- 1. $A \rightarrow B$
- 2. A · B
- 3. $A \rightarrow (A \cdot B)$
- **4**. $(A \rightarrow B) \lor (A \rightarrow (A \cdot B)) = \alpha$

Α	В	(A o B)	$A \cdot B$	
0	0	1	0	
0	1	1	0	
1	0	0	0	
1	1	1	1	

Α	В	(A o B)	$A \cdot B$	$A o (A \cdot B)$	
0	0	1	0	1	
0	1	1	0	1	
1	0	0	0	0	
1	1	1	1	1	

$$(A \to B) \lor (A \to (A \cdot B)) = \alpha$$
A B $(A \to B)$ A · B A \to $(A \cdot B)$ α
0 0 1 0 1 1
0 1 1 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1

Домашнее задание

Составить таблицу истинности:

Задачи первого-второго практического занятия (Высказывания. Логические операции над высказываниями. Формулы)

Задание 3 (б, в, г)

- $((A \sim B) \to \overline{C}) \cdot (A \vee C).$
- $\blacktriangleright (((\overline{A \vee B}) \cdot \overline{C}) \to \overline{B}) \sim A.$
- $\blacktriangleright ((\overline{A} \cdot \overline{B}) \to (\overline{\overline{B}} \to \overline{A})) \cdot ((A \vee B) \sim C).$

40 / 40