

Группа N3149 _____ К работе допущен _____

Студент Синюта Анастасия _____ Работа выполнена _____

Преподаватель Иванов Виктор Юрьевич Отчет принят _____

Рабочий протокол и отчет по Проектной работе №2

Вариант 2. Исследование процесса диффузии.

1. Формулировка задания.

Общее задание:

- 1) Ознакомиться с предложенной моделью, написать основные уравнения, описывающие модель и найти аналитическое решение
- 2) Выбрать разностную схему, выбрать шаг по времени и пространственный шаг интегрирования уравнения, обосновать выбор (см. проект №1)
- 3) Провести численный эксперимент, самостоятельно выбрать коэффициент диффузии (выбрать газ и найти к-т диффузии для него), размер сосуда и координаты перегородки.
- 4) Изобразить результат графически

Есть сосуд с перегородкой, заполненный воздухом при нормальных условиях. Примесный газ А с начальной концентрацией C_0 находится в одной части сосуда, между плоскостями $x = 0$ и $x = h$ (h – координата перегородки). Перегородку убрали и газ А начал диффундировать в область, ограниченную плоскостями $x = h$ и $x = l$ ($l > h$). Исследовать процесс диффузии - изменения концентрации газа А.

2. Аналитическое решение.

Задача сводится к решению уравнения в частных производных:

$$\frac{\partial C}{\partial t} = D \frac{\partial^2 C}{\partial x^2} \quad (1)$$

при краевых условиях

$$\left. \frac{\partial C(x,t)}{\partial x} \right|_{x=0} = 0, \quad (2)$$

$$\left. \frac{\partial C(x,t)}{\partial x} \right|_{x=l} = 0, \quad (3)$$

$$C(x, 0) = \begin{cases} C_0, & x \in [0, h], \\ 0, & x \in [h, l]. \end{cases} \quad (4)$$

При данных условиях решением уравнения (1) является функция

$$C(xt) = 2C_0\left(\frac{h}{2l} + \frac{1}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} \sin \frac{k\pi h}{l} \cos \frac{k\pi x}{l} e^{-Dk^2\pi^2 t/l^2}\right). \quad (5)$$

Код для аналитического решения на языке программирования Python + построение графика:

```
import matplotlib.pyplot as plt
from mpl_toolkits import mplot3d
import numpy as np
import math

#Исходные данные
D = 0.25
l = 10
h = 1 // 2
T = 90
n = 10
k = 800
p = 1/n
q = T/k
C0 = 100
pi = math.pi

#Заполнение матрицы концентраций
C=[0]*k
for i in range(k):    C[i] = [0.0] * n
for j in range (k):
    for i in range (n):
        if j == 0:
            if (i+2) < (n//2):
                C[j][i] = C0
            else:
                C[j][i] = 0.0
        else:
            sum = 0
            for o in range(1,k):
                sinus = math.sin(o*pi*h/l)
                cosinus = math.cos(o*pi*i/l)
                exp = math.exp(-D*(o**2)*(pi**2)*j/(l**2))
                sum += (1/o) * sinus * cosinus * exp
            C[j][i] = 2*C0 * (h/(2*l) + (1/pi)*sum)

#Построение 3d графика
fig = plt.figure()
ax = fig.add_subplot(111, projection='3d')
ax.set(title = 'Аналитическое решение', xlabel = 'x', ylabel = 't', zlabel = 'C')
x_val = np.linspace(0, l, n)
y_val = np.linspace(0, T, k)
X, Y = np.meshgrid(x_val, y_val)
C=np.array(C)
ax.plot_surface(X, Y, C);
plt.show()
```

3. Численное решение.

Решение будем искать в прямоугольнике Π , ограниченном прямыми $t = 0$, $x = 0$, $x = l$, $t = T$. При этом должны быть заданы значения искомой функции C на стороне $t = 0$.

Покроем Π сеткой, образованной прямыми $x = ip$, $i = 1..n$, $t = jq$, $j = 1..k$, и будем определять приближенные значения решения в узлах (i, j) сетки, т. е. в точках пересечения этих прямых. Положим $C(ip, jq) = C_{ij}$. Вместо (1) запишем соответствующее ему уравнение в конечных разностях для точки C_{ij} . При решении уравнений в частных производных методом

конечных разностей производные заменяются соответствующими разностями:

$$\frac{\partial C(x,t)}{\partial t} \approx \frac{C(x,t+q) - C(x,t)}{q}, \quad (6)$$

$$\frac{\partial^2 C(x,t)}{\partial x^2} \approx \frac{1}{p} \left(\frac{C(x+p,t)}{p} - \frac{C(x,t) - C(x-p,t)}{p} \right). \quad (7)$$

Согласно (6), (7),

$$\frac{C_{i,j+1} - C_{i,j}}{q} = D \frac{C_{i+1,j} - 2C_{i,j} + C_{i-1,j}}{p^2}. \quad (8)$$

Из (8) следует:

$$C_{i,j+1} = \left(1 - \frac{2Dq}{p^2}\right) C_{i,j} + Dq(C_{i+1,j} + C_{i-1,j})/p^2. \quad (10)$$

Из (10) следует, что если известны три значения в j -м ряду: $C_{i-1,j}$, $C_{i,j}$, $C_{i+1,j}$, то определяется значение $C_{i,j+1}$ в следующем ряду. Формула (10) упрощается, если $q = p^2 / (2D)$. Тогда

$$C_{i,j+1} = \frac{1}{2}(C_{i+1,j} + C_{i-1,j}). \quad (11)$$

Для выполнения условий (2), (3) мы сначала вычислим значения $C_{i,j+1}$ для $i = 2..n-1$, а затем положим

$$C_{1,j+1} = \frac{1}{2}(C_{1,j} + C_{2,j+1}),$$

$$C_{n,j+1} = \frac{1}{2}(C_{n,j} + C_{n-1,j+1}).$$

Код для численного решения на языке программирования Python + построение графика:

```
import matplotlib.pyplot as plt
from mpl_toolkits import mplot3d
import numpy as np

#Исходные данные
D = 0.25
l = 10
h = 1 // 2
T = 90
n = 10
k = 800
p = 1/n
q = T/k
C0 = 100

#Заполнение матрицы концентраций
C=[0]*k
for i in range(k):    C[i] = [0.0] * n
for i in range(n):
    if (i+2) < (n // 2):
        C[0][i] = C0
    else:
        C[0][i] = 0.0
for j in range(1,k):
    for i in range(1,n-1):
        C[j][i] = C[j-1][i] + (D*q/(p*p))*(C[j-1][i+1] - 2*C[j-1][i] + C[j-1][i-1])
    C[j][0] = (C[j-1][0] + C[j][1])/2
    C[j][n-1] = (C[j-1][n-1] + C[j][n-2])/2


# Построение 3d графика
fig = plt.figure()
ax = fig.add_subplot(111, projection='3d')
ax.set(title = 'Численное решение', xlabel = 'x', ylabel = 't', zlabel = 'C')
x_val = np.linspace(0, 1, n)
y_val = np.linspace(0, T, k)
```

```
X, Y = np.meshgrid(x_val, y_val)
C=np.array(C)
ax.plot_surface(X, Y, C);
plt.show()
```


4. Графики и вывод:

Для исходных данных $D = 0.25$, $l = 10$, $h = l/2$, $T = 90$, $n = 10$, $k = 800$, $C_0 = 100$ получились такие:

Аналитическое решение



Численное решение



Вывод: По графикам видно, что к моменту времени $T=90$ произошло выравнивание концентрации по всей площади сосуда. Графики выглядят схоже, имеют одинаковое поведение, значит поставленная задача была выполнена правильно, правильность формул доказана. Однако второй график получился более сглаженный и точный, значит, численный метод для исследования процесса диффузии лучше.