



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования  
«Московский государственный технический университет  
имени Н.Э. Баумана  
(национальный исследовательский университет)»  
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

---

ФАКУЛЬТЕТ «Информатика и системы управления»  
КАФЕДРА «Программное обеспечение ЭВМ и информационные технологии»

---

## Отчёт

### по лабораторной работе №1

Название «Гистограмма и эмпирическая функция распределения»  
Дисциплина «Математическая статистика»

---

Студент	<u>ИУ7-65Б</u>	<hr/>	<u>Бугаенко А.П.</u>
		(подпись, дата)	(Фамилия И.О.)
Преподаватель		<hr/>	<u>Андреева Т.В.</u>
		(подпись, дата)	(Фамилия И.О.)

Москва, 2022

## 1 Цели и задачи работы

Цель работы — построение гистограммы и эмпирической функции распределения. Задачи работы:

1) Для выборки объёма  $n$  из генеральной совокупности  $X$  реализовать в виде программы на ЭВМ:

- а) вычисление максимального значения  $M_{max}$  и минимального значения  $M_{min}$
- б) размаха  $R$  выборки
- в) вычисление оценок  $\hat{\mu}$  и  $S^2$  и математического ожидания  $MX$  и дисперсии  $DX$
- г) группировку значений выборки в  $m = [\log_2 n] + 2$  интервала
- д) построение на одной координатной плоскости гистограммы и графика функции плотности распределения вероятностей нормальной случайной величины в математическим ожиданием  $\hat{\mu}$  и дисперсией  $S^2$
- е) построение в другой координатной плоскости графика эмпирической функции распределения и функции распределения нормальной случайной величины с математическим ожиданием  $\hat{\mu}$  и дисперсией  $S^2$

2) Провести вычисления и построить графики для выборки из индивидуального варианта

## 2 Теоретическая часть

### 2.1 Необходимые формулы

Пусть  $(x_1, \dots, x_n)$  - некая случайная выборка.

$M_{max}, M_{min}$  вычисляются соответственно как  $max(x_1, \dots, x_n), min(x_1, \dots, x_n)$  - максимальное и минимальное значение выборки.

Размах вычисляется как  $R = M_{max} - M_{min}$ .

Оценка  $\hat{\mu}$  для математического ожидания МХ вычисляется как  $\hat{\mu}(\vec{X}_n) = \overline{X_n} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ .

Оценка  $S^2$  для дисперсии (несмещённая) вычисляется как  $S^2(\vec{X}_n) = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \overline{X_n})^2$ .

### 2.2 Эмпирическая плотность и гистограмма

Пусть есть выборка  $\vec{x}$ , тогда эмпирическая плотность распределения  $\vec{x}$  задаётся как:

$$f_n(x) = \begin{cases} \frac{n_i}{n\Delta}, x \in J_i, i = \overline{1, m}, \\ 0 \end{cases} \quad (2.1)$$

В данной формуле:  $J_i, i = \overline{1, m}$  - полуинтервал из  $J = [min(x_1, \dots, x_n), max(x_i, x_n))$ , при этом все интервалы, кроме последнего не содержат правую границу;

$m$  - количество полуинтервалов;

$\Delta$  - длина полуинтервала  $J_i, i = \overline{1, m}$ , равная  $\Delta = \frac{x_{(n)} - x_{(1)}}{m} = \frac{|J|}{m}$ ;

$n_i$  - количество элементов выборки в полуинтервале  $J_i, i = \overline{1, m}$ ;

$n$  - количество элементов в выборке.

График эмпирической функции распределения называют гистограммой.

### 2.3 Эмпирическая функция распределения

Эмпирической функцией распределения, отвечающей выборке  $\vec{x}$  называют функцию  $F_n : R \rightarrow R, F_n(x) = \frac{n(x, \vec{x})}{n}$ , где  $n(x, \vec{x})$  - количество элементов выборки  $\vec{x}$ , которые меньше  $x$ .

## 3 Практическая часть

### 3.1 Листинг программы

```
1 disp("Lab 1")
2 # Выборка
3 x_unsorted = [-0.23 -1.03 -4.11 -0.65 -2.58 -0.79 -1.53 -0.18 -2.79 -1.97 -2.21
    -1.59 -0.22 -3.18 -1.18 -1.42 -1.29 -2.22 -0.82 -1.87 -2.30 -0.94 -0.74 -2.45
    -1.40 -2.09 -0.68 0.02 -1.80 -2.25 -1.19 -2.17 -1.89 -1.14 -1.50 -1.76 -0.69
    -2.21 -1.65 -1.51 -2.11 -2.24 -0.72 0.94 -0.67 -2.44 -2.27 -1.33 -3.03 -0.42
    -2.86 -2.00 -1.37 -1.90 -2.80 -0.89 -2.04 -1.66 -0.14 -2.79 -0.21 -1.29 -2.81
    -0.29 -1.55 -0.45 -1.16 -3.96 -3.77 -3.36 -1.81 0.13 -2.61 -3.69 -3.00 -2.61
    -0.74 -0.41 -0.78 -1.49 -1.89 -1.24 -0.00 -2.72 -1.69 -1.25 -1.59 0.20 -1.08
    -2.42 -3.14 -2.54 -2.09 -2.51 -2.65 -2.42 -1.30 -0.65 1.40 -2.33 -1.97 -0.54
    -1.13 -2.04 0.77 -1.03 -1.55 -1.47 -0.09 -2.11 -2.08 -1.79 -1.36 -1.92 -3.04
    -1.08 -1.67 -2.11 -1.99 -1.64];
4
5 x = sort(x_unsorted);
6
7 # Максимальное значение
8 M_max = max(x);
9 printf("Mmax: %f\n", M_max);
10
11 # Минимальное значение
12 M_min = min(x);
13 printf("Mmin: %f\n", M_min);
14
15 # Размах выборки
16 R_x = M_max - M_min;
17 printf("R: %f\n", R_x);
18
19 # Оценка матожидания
20 u_x = (1/numel(x))*sum(x);
21 printf("u: %f\n", u_x);
22
23 # Несмещённая оценка дисперсии
24 val = 0;
25 for i = 1:numel(x)
26     val +=(x(i) - u_x)*(x(i) - u_x);
27 endfor
28 S_2_x = val*(1/(numel(x) - 1));
29 printf("S square: %f\n", S_2_x);
30
31 # Нахождение количества интервалов
32 m = floor(log2(numel(x))) + 2;
33 printf("m: %f\n", m);
34
```

```

35 # Разбиение выборки на m интервалов от min до max
36 intervals = [];
37 pos = M_min;
38 for i = 1:(m + 1)
39     intervals(i) = pos;
40     pos += R_x/m;
41 endfor
42
43 eps = 1e-6;
44
45 count = [];
46 j = 1;
47 for i = 1:(m - 1)
48     cnt = 0;
49     for j = 1:numel(x)
50         if (intervals(i) < x(j) || abs(intervals(i) - x(j)) < eps) && x(j) < intervals(i
            + 1)
51             cnt += 1;
52         endif
53     endfor
54     count(i) = cnt;
55 endfor
56
57 cnt = 0;
58 for j = 1:numel(x)
59     if (intervals(m) < x(j) || abs(intervals(i) - x(j)) < eps) && (x(j) < intervals(m
        + 1) || abs(intervals(m + 1) - x(j)) < eps)
60         cnt += 1;
61     endif
62 endfor
63 count(m) = cnt;
64
65 # Вывод интервалов и количества элементов в интервале
66 printf("Интервалы и количества значений в этих интервалах при m = %d\n", m);
67 for i = 1:(m - 1)
68     printf("[%f %f] - %d\n", intervals(i), intervals(i + 1), count(i));
69 endfor
70 printf("[%f %f] - %d\n", intervals(m), intervals(m + 1), count(m));
71
72 function draw_hist(x, J, count, R, m)
73     n = numel(x);
74     delta = R/m;
75     xes = zeros(1, m + 2);
76     xes(1) = 0;
77     for i = 2:(m + 1)
78         xes(i) = count(i - 1) / (n * delta);
79     endfor

```

```

80     J = [0 J];
81     stairs(J, xes);
82 endfunction
83
84 function f(x, mx, dx, m, R)
85     delta = R/m;
86     step = delta/30;
87     sigma = sqrt(dx);
88     x_n = min(x):step:max(x);
89     y = normpdf(x_n, mx, sigma);
90     plot(x_n, y, 'r');
91 endfunction
92
93 function F(x, mx, dx, m, R)
94     delta = R/m;
95     step = delta/30;
96     x_n = min(x):step:max(x);
97     y = 1/2 * (1 + erf((x_n - mx) / sqrt(2 * dx)));
98     plot(x_n, y, 'r');
99 endfunction
100
101 function drawDist(x, m, R)
102     delta = R/m;
103     step = delta/30;
104     x_n = min(x):step:max(x);
105     res = empirical_cdf(x_n, x); # эмпирическая интегральная функция распределения
106     stairs(x_n, res);
107 endfunction
108
109 # Функции
110 figure;
111 hold on;
112 f(x, u_x, S_2_x, m, R_x);
113 draw_hist(x, intervals, count, R_x, m);
114 xlabel('X')
115 ylabel('Количество в интервале')
116 hold off;
117
118 figure;
119 hold on;
120 F(x, u_x, S_2_x, m, R_x);
121 drawDist(x, m, R_x);
122 xlabel('X')
123 ylabel('Распределение от X')
124 hold off;

```

### 3.2 Результаты работы для выборки по варианту

Вариант выборки - 1. Вывод программы:

```
1 Lab 1
2 Mmax: 1.400000
3 Mmin: -4.110000
4 R: 5.510000
5 u: -1.604583
6 S square: 1.034091
7 m: 8.000000
8 Интервалы и количества значений в этих интервалах при m = 8
9 [-4.110000 -3.421250) - 4
10 [-3.421250 -2.732500) - 11
11 [-2.732500 -2.043750) - 26
12 [-2.043750 -1.355000) - 33
13 [-1.355000 -0.666250) - 26
14 [-0.666250 0.022500) - 15
15 [0.022500 0.711250) - 2
16 [0.711250 1.400000] - 3
```



