



FORUM DE CANCEROLOGIE DE ROCHE

DOUBLE BLOCAJE HER2, SYNERGIE PROUVÉE

TRAITEMENT ADJUVANT



www.forumcancerologie-roche.com



- Sur la base de l'étude **APHINITY**, L'association **PERTUZUMAB-TRASTUZUMAB** a été établie comme **le traitement adjuvant de référence** pour les patientes ayant obtenu **une réponse pathologique complète** après le traitement néoadjuvant ^{1,2,3}



National Comprehensive Cancer Network (v6-2020)⁴

En cas de réponse pathologique complète ou en absence de traitement préopératoire (ou arrêt du Ado-trastuzumab emtansine en cas de toxicité): **compléter jusqu'à 1 an (18 cycles) de traitement ciblé HER2 avec Trastuzumab ± Pertuzumab**



European Society of Medical Oncology (2019)¹

En cas de réponse pathologique complète : compléter jusqu'à 1 an de traitement ciblé HER2 avec *Trastuzumab* ± *Pertuzumab* pour les patientes avec atteinte ganglionnaires ou récepteurs hormonaux négatifs



German Gynecological Oncology Group (2020)²

En cas de réponse pathologique complète : *Pertuzumab* + *Trastuzumab* pour les patientes à haut risque de récurrence (atteinte ganglionnaire) pendant 12 mois



Saint Gallen (2019)³

En cas de réponse pathologique complète : *Trastuzumab* ou *Trastuzumab plus Pertuzumab* tel que proposé à l'origine dans le schéma de traitement systémique néoadjuvant initial de la patiente

1. Cardoso F, et al. Ann Oncol 2019;AGO Breast


2. Cancer Guidelines. Version 1, 2020;

3. Burstein HJ, et al. Ann Oncol 2019.

4. NCCN Breast Cancer Guidelines. Version 6, 2020

Conception de l'étude **APHINITY**⁵

- **APHINITY** était une vaste étude de phase III multicentrique, multinationale, randomisée, menée en double aveugle contre placebo en collaboration avec le Breast International Group (BIG)
- Elle visait à évaluer l'efficacité et l'innocuité de l'association **PERTUZUMAB-TRASTUZUMAB** adjuvante plus chimiothérapie chez des patientes atteintes de cancer du sein HER2-positif



Critères d'évaluation primaires⁵

- Survie sans maladie invasive (SSMI) (à l'exclusion du second cancer primaire non mammaire)[†]

Critères d'évaluation secondaires⁵

- Survie globale
- Survie sans maladie
- Survie sans maladie invasive incluant le deuxième cancer primaire non mammaire
- Intervalle sans rechute
- Intervalle sans récidive à distance
- Innocuité
- Qualité de vie liée à la santé

Les protocoles de chimiothérapie standard à base d'anthracycline ou sans anthracycline (TCH) étaient autorisés⁵:

3-4 cycles FEC (ou FAC) → 3-4 cycles TH



4 cycles AC (ou EC) → 4 cycles TH

6 cycles TCH

AC: doxorubicine + cyclophosphamide; EC: épirubicine + cyclophosphamide; FAC: 5-fluorouracile + doxorubicine + cyclophosphamide; FEC: 5-fluorouracile + épirubicine + cyclophosphamide; TCH: docétaxel + carboplatine + Herceptin; TH: docétaxel + Herceptin.

L'association **PERTUZUMAB-TRASTUZUMAB** plus chimiothérapie en traitement adjuvant a réduit le risque d'évènements par rapport à l'association **PERTUZUMAB-TRASTUZUMAB** plus chimiothérapie ⁵.

Survie sans maladie invasive^{5,6,7}




5. Gunter von Minckwitz and Al. Adjuvant Pertuzumab and Trastuzumab in Early HER2-Positive Breast Cancer. N Engl J Med 2017;377:122-31. DOI: 10. 1056/NEJMoa1703643

6. Martine Piccart and Al. Adjuvant Pertuzumab and Trastuzumab in Early HER Positive Breast Cancer in the APHINITY Trial: 6 Years' Follow-Up published at ascopubs.org/journal/jco on February 4, 2021: DOI <https://doi.org/10.1200/JCO.20.01204>

7. S. Loibl and al, VP6-2022: Adjuvant pertuzumab and trastuzumab in patients with early HER-2 positive breast cancer in APHINITY: 8.4 years' follow-up. 2022 European Society for Medical Oncology. Published by Elsevier Ltd. Volume 33 - Issue 9 - 2022

Survie globale ⁷



Données sur la tolérance⁷

Après un suivi médian de 8,4 ans, **l'incidence des événements cardiaques primaires est restée faible** (< 1% dans chaque groupe de traitement)

L'incidence des effets indésirables mortels est restée faible (≤ 1,5% dans chaque groupe)

ITT: intention de traiter

N+: Présence d'une invasion ganglionnaire

N-: Absence d'invasion ganglionnaire

7. S. Loibl and al, VP6-2022: Adjuvant pertuzumab and trastuzumab in patients with early HER-2 positive breast cancer in APHINITY: 8.4 years' follow-up. 2022 European Society for Medical Oncology. Published by Elsevier Ltd. Volume 33 - Issue 9 - 2022

Pour toute déclaration d'événements indésirables merci d'envoyer un mail à Roche Côte d'Ivoire Sarl au global.irt_sahubtcs@roche.com ou de téléphoner au +225 27 22 48 23 55

Pour toute demande d'information médicale merci d'envoyer un mail à westafrica.medinfo@roche.com ou de téléphoner au +225 27 22 48 23 55.

ROCHE Côte d'Ivoire SARL

Ivoire Trade Center, Cocody les ambassades Angle de la rue Hassan 2 et de la rue Booker Washington, Bâtiment D1er étage

18 BP 2377 Abidjan 18, Côte d'Ivoire

Tél : +225 27 22 48 23 55

M-CI-00000274