























































# Lista de Vacinas

## ( pública e privada )

| Vacina   |                   | Rede Pública <sup>(1)</sup><br>(UBS)   | Vacina   |                   | Rede Pública <sup>(1)</sup><br>(UBS)  |
|--|--|--|--|--|---|
| Dengue   |                   |                                     | Meningocócica C Conjugada  |                   |  <sup>(7)</sup>    |
| dTpa (Difteria, Tétano, Coqueluche)  |                   |  <sup>(2)</sup>                     | Meningocócica B Recombinante   |                   |                    |
| Febre Amarela  |  <sup>(*)</sup>   |                                     | Meningocócica Quadrivalente A/C/W135/Y   |                   |  <sup>(7)</sup>    |
| Febre Tifóide  |                 |  <sup>(3)</sup><br><sup>(1)</sup> | Penta acelular (dTpa+Hib+VIP)<br>(Difteria, Tétano, Coqueluche + <i>Haemophilus influenzae</i> tipo b+ Poliomielite inativada) |                  |                   |
| Hepatite B   |                 |                                   | Quadra acelular (dTpa+VIP)<br>(Difteria, Tétano, Coqueluche + Poliomielite inativada)  |  <sup>(3)</sup> |                  |
| Hepatite A   |                 |  <sup>(4)</sup>                   | Pneumocócica Conjugada 13v   |                 |  <sup>(5)</sup>  |
| Hepatite AB  |  <sup>(3)</sup> |                                   | Pneumocócica Conjugada 10v   |                 |                  |
| Herpes zóster  |                 |                                   | Pneumocócica Polissacarídica 23v   |                 |                  |
| Hexa (dTpa+Hib+VIP+HBV)<br>(Difteria,Tétano,Coqueluche+Haemophilus influenzae b+Poliomielite inativada+Hepatite B) |                 |  <sup>(5)</sup>                   | Tetraviral<br>(Sarampo, Caxumba, Rubéola e Varicela)   |                 |  <sup>(8)</sup>  |
| <i>Haemophilus influenzae</i> tipo b (Hib)   |                 |  <sup>(5)</sup>                   | Tríplice Viral<br>(Sarampo, Caxumba e Rubéola)   |                 |  <sup>(9)</sup>  |
| HPV Quadrivalente<br>(6,11,16,18)  |                 |  <sup>(6)</sup>                   | Rotavírus Monovalente  |                 |                  |
| Influenza (Gripe)<br>Quadrivalente   |                 |                                   | Rotavírus Pentavalente   |                 |                  |
| Influenza (Gripe)<br>Trivalente  |                 |                                   | Varicela   |                 |  <sup>(10)</sup> |

(1) Nos Centros de Referências Especiais de Imunobiológicos/CRIEs; (2) A partir da 20ª semana gestacional (até 45 dias após o parto); (3) Viajantes deslocando para áreas de risco e de acordo com a situação epidemiológica e atividades exercidas; (4) Dose única dos 15 meses até < de 5 anos de idade (4 anos, 11 meses e 29 dias); (5) Indicada em situações especiais; (6) Para meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 anos: 2 doses - 0 e 6 meses a depender da situação vacinal. Adolescentes e adultos de 9 a 26 anos vivendo com HIV/AIDS: 3 doses - 0, 2 e 6 meses; (7) Para adolescentes na faixa etária de 11 a 12 anos de idade, com a vacina Meningo ACWY, independente de dose anterior de Meningo C ou dose de reforço; (8) Dose única até < de 5 anos de idade (4 anos, 11 meses e 29 dias); (9) Profissionais de saúde receber 2 doses independente da idade e crianças e adultos até 29 anos: 2 doses; adultos entre 30 a 59 anos: 1 dose; (10) Pode ser feita até < 7 anos de idade.

**(\*) Emissão do Certificado Internacional de Vacinação e Profilaxia/CIVP**