Manual para el curso Modelos Lineales Avanzados (XS-0125) Primer Examen

Anderson Martínez, Sebastián Calvo, Justin Zhu

Contents

1 Modelos Mixtos **1**
1.1 Efectos fijos . . . 1
1.2 Efectos aleatorios . . . 1
1.3 En resumen: . . . 3

2 Tipos y estructuras de datos **3**

3 Diferencia entre un modelo con bloques y un modelo mixto. **3**

4 Parcelas divididas **4**

5 Diferencias entre modelo mixto y modelo lineal clásico. **4**

6 Modelos lineales mixtos **4**
6.1 El modelo . . . 4
6.2 Distribuciones del modelo . . . 4
6.2.1 Apuntes importantes de los errores . . . 5
6.2.2 ¿¿Cuántas varianzas hay en cada nivel? . . . 5

1 Modelos Mixtos

1.1 Efectos fijos

- En un factor de efectos fijos el interés está sólo en aquellos niveles que están siendo usados en el experimento y sus efectos. Todas las conclusiones de están limitadas a los tratamientos que están siendo observados en el experimento.
- Se asume que el experimentador ha considerado para el factor todos los posibles niveles que éste puede tomar o se escogieron deliberadamente, no de forma aleatoria.
- Ejemplo: la temperatura (10°, 16°, 27°) sería un factor fijo si esas fueran las únicas temperaturas de interés para el investigador.

1.2 Efectos aleatorios

- En un factor de efectos aleatorios se asumen que se ha considerado tan solo una muestra de los posibles niveles que éste puede tomar.
- El efecto que tiene cada nivel de ese factor se considera proveniente de una distribución de efectos cuya esperanza es cero.
- Los efectos de los niveles escogidos son aleatorios en el sentido de que son una muestra de esa distribución de efectos.

ATENCIÓN AL SIGUIENTE EJEMPLO EXPUESTO EN CLASE

Ejemplo: la escuela es analizada como un factor que puede influir sobre el nivel de aprendizaje y se han considerado en el experimento solo 10 de las muchas escuelas posibles. La escuela es un factor aleatorio en el experimento y sus efectos provienen de una distribución.Además se toma en cuenta otro factor sobre si la escuela es privada o pública.



Descripción del gráfico

Negro: La distribución de los grupos de una escuela pública.

Azul: La distribución de los grupos de una escuela privada .

Celeste: La distribución de las escuelas públicas.

Rojo: La distribución de las escuelas privadas.

Unidades del nivel 1

Son los grupos de las escuelas, las distribuciones de este nivel son las de color **Negro** y **Azul**. Es decir cada distrobución corresponde a una escuela.

- La variable respuesta (Y) se mide en el nivel 1,la distribución es la siguiente $f(Y|\text{Escuela})$
- μ_j: Es el promedio de una escuela (una distribución negra o azul). Todas las μ_j se unen y forman las curvas de los colores **Celeste** y **Rojo**
- σ_j^2: Es la varianza del error, esta se encuentra en el nivel 1.
- Debido a la homocedasticiadad podemos asumir que σ_j^2 es constante.

Unidades del nivel 2

Este nivel corresponde a las medias de todas las escuelas, cada tipo de escuela tiene una distribución, **Celeste** para las escuelas pública y **Rojo** para las escuelas privadas. Puede ser que las varianzas de estas distribuciones sean iguales, pero no necesarimente sucede ese caso, de hecho es muy utópico pensar que todo tenga la misma varianza.

- Los μ_j son los que forman las distribución en el nivel 2
- La forma de la distribución es $f(\mu_j|\text{Tipo de escuela})$

Conceptos importantes

Error: Es la distancia de un punto de la distribución a su media, por ejemplo imagine un punto de una de las distribuciones negras a su media.

Efecto: Un ejemplo de efecto es la distancia entre la media de una de las distribuciones **negras** con la media de la distribución **celeste**. Como hay escuelas infitas, esto implica que hay efectos infinitos.

Sea γ el efecto, este se distribuye como $\gamma \sim f(0, \sigma_\gamma^2)$. Para cada uno de los tipos de escuelas hay infinitos efectos con una cierta varianza, en donde ambos tipos de escuela pueden tener la misma.

1.3 En resumen:

- Efectos fijos son los factores
- Efectos aleatorios son las unidades

Cuando las unidades están en el nivel 1, los experimentos son como los del curso pasado, en cambio cuando estas unidades se encuentran del nivel 2 hacia arriba a esto le llamaremos como un modelo mixto. Estos corresponden a lo que se llama un modelo multinivel.

Notas:

- Normalmente a los efectos aleatorios se le asigna un factor fijo
- La unidad normalmente contiene efectos aleatorios.
- Siempre tienen que haber unidades aleatorias en el nivel 1

2 Tipos y estructuras de datos

Datos agrupados	**Medidas repetidas**	**Datos longitudinales**
* La variable dependiente se mide una vez por cada sujeto.	* La variable dependiente se mide más de una vez en la misma unidad de análisis.	* La variable dependiente se mide en muchos momentos a lo largo del tiempo, para cada unidad de análisis.
* Las unidades de análisis se agrupan (clusters de unidades).	* La medición se realiza en varios niveles de un factor de medidas repetidas.	

3 Diferencia entre un modelo con bloques y un modelo mixto.

Es un modelo mixto, cuando hay dos factores o más en el nivel 1, en un diseño de dos niveles o más. Por el contrario cuando hay dos niveles, pero el nivel 1 solo tiene un factor es un diseño de bloques. Además si hay un factor en el nivel dos, también hay que usar modelos mixtos.

4 Parcelas divididas

Cuando el diseño es de dos niveles con un factor en cada nivel, al mismo se le puede llamar como parcelas divididas. Un ejemplo de esto sería un experimento que quiere comparar el crecimiento de dos especies de papá en dos tipos de clima. En donde se siembran dos especies de papas en fincas que se encunetran en un clima frió y en otras que tienen un clima caliente.

5 Diferencias entre modelo mixto y modelo lineal clásico.

- El modelo de regresión lineal simple requiere de formular muchos supuestos para que su uso sea adecuado.
- Los modelos lineales mixtos permiten tomar en cuenta la violación a algunos de los supuestos del modelo lineal simple.
- En la práctica, permiten modelar situaciones comunes en las ciencias sociales y en otras ciencias, como la presencia de estructuras jerárquicas.
- Los Modelos Lineales Mixtos Generalizados (GLMM) incluyen técnicas de modelación no solo para variables continuas, sino también nominales, ordinales, conteos, respuestas asimétricas, entre otras.

6 Modelos lineales mixtos

Modelos para variables continuas en los que los residuos se distribuyen normalmente, pero podrían no ser independientes o no tener varianza constante.

El término "lineal" proviene del hecho de que estos modelos son lineales en los parámetros.

El término "mixto" es debido a que las covariables pueden incluir un "mix" de efectos fijos y efectos aleatorios.

6.1 El modelo

El efecto de la unidad i-ésima del nivel 2 se denota como: δ_i.

La j-ésima observación dentro de la i-ésima unidad del nivel 2 se puede expresar como:

$$y_{ij} = \beta_0 + \delta_i + \varepsilon_{ij}$$

La esperanza condicional dado la unidad del nivel dos es:

$$E[Y|i] = \mu_i = \beta_0 + \delta_i$$

donde:

- $\beta_0 = \mu$ (Intercepto)
- $\delta_i = \mu_i - \mu$ (Definición de error)

6.2 Distribuciones del modelo

1. Se consideran dos fuentes de variabilidad:

- La variación de unidad del nivel 2 a una unidad del nivel 2 (inter sujeto): σ_δ^2
- La variación entre los datos dentro de una misma unidad de nivel 2.

Tomando como ejemplo el diseño de las escuelas vistas en clase

$$V(Y|\text{escuela}) = V(error)$$

Nota: La definción de error se encuentra arriba.

6.2.1 Apuntes importantes de los errores

- Los errores se distribuyen como $\varepsilon \sim N(0, \sigma_\varepsilon)$
- Debido a que hay homocesticidad yo los puedo juntar a todos los errores. La función de unir todos los errores es para observar la normalidad.

6.2.2 ¿¿Cuántas varianzas hay en cada nivel?

Existen dos en el ejemplo de las escuelas:

$V(\varepsilon)$: Esta corresponde a una varianza por cada escuela, pero si hay homocesasticidad habría solo una. En un caso extremo se puede tener $V(\varepsilon|\text{Pública}) \neq V(\varepsilon|\text{Privada})$

$V(\mu|\text{Tipo de escuela})$: Hay dos una para la escuela pública y otra para la privada. De igual forma si hay homocedasticidad solo habría una, es decir $V(\mu|\text{Pública}) = V(\mu|\text{Privada})$

2. Los efectos de las unidades del nivel 2 son aleatorias y se obtienen de una distribución normal con media cero:

$$\delta \sim N(0, \sigma_\delta^2)$$

3. La distribución condicional de la respuesta dado la unidad del nivel 2 también es normal:

$$Y|i \sim N(\mu_i, \sigma_\varepsilon^2)$$

4. La variancia total de la respuesta es la suma de la variancia de los componentes aleatorios más la variancia del error:

$$V(Y) = \sigma_\delta^2 + \sigma_\varepsilon^2$$

```r
# Este código se verá bonito en el manual, pero R NO lo ejecutará.
modelo_complejo <- lm(y ~ x1 + x2, data = mis_datos)
```