

1.

Veamos que $\text{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta)/\mathbb{Q})$ es cíclico de orden $p-1$. Sea $\sigma \in \text{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta)/\mathbb{Q})$.

$$\zeta^p - 1 = 0 \Rightarrow \sigma(\zeta)^p - 1 = 0$$

Tenemos que $\sigma(\zeta)$ es raíz p -ésima de la unidad. Ahora, por ser ζ raíz primitiva.

$$\sigma(\zeta) = \zeta^d$$

para $d \in \{1, \dots, p-1\}$. Veamos que σ es automorfismo. Teniendo en cuenta que $\{\zeta, \zeta^2, \dots, \zeta^{p-1}\}$ es base de $\mathbb{Q}(\zeta)/\mathbb{Q}$:

$$\begin{array}{ccc} \sigma : \mathbb{Q}(\zeta) & \longrightarrow & \mathbb{Q}(\zeta) \\ q \in \mathbb{Q} & \longmapsto & q \\ \zeta & \longmapsto & \zeta^d \\ \zeta^2 & \longmapsto & \zeta^{2d} \\ & \vdots & \\ \zeta^{p-1} & \longmapsto & \zeta^{(p-1)d} \end{array}$$

Supongamos que $\sigma(\zeta^{k_1}) = \sigma(\zeta^{k_2})$ con $k_1 > k_2$.

$$\zeta^{dk_1} = \zeta^{dk_2} \Rightarrow 1 = \zeta^{d(k_1-k_2)} \Rightarrow p \mid d(k_1 - k_2)$$

pero p es primo y $d, (k_1 - k_2) \in \{1, \dots, p-1\}$, que es contradictorio. Por lo tanto σ es inyectivo y

$$\sigma(\{\zeta, \zeta^2, \dots, \zeta^{p-1}\}) = \{\zeta, \zeta^2, \dots, \zeta^{p-1}\}$$

es decir, σ es automorfismo. Si llamamos σ_d al automorfismo que satisface $\zeta \mapsto \zeta^d$. tenemos que

$$\begin{array}{ccc} \varphi : \text{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta)/\mathbb{Q}) & \longrightarrow & ((\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*, \cdot) \\ \sigma_k & \longmapsto & \bar{k} \end{array}$$

Es isomorfismo de grupos

$$\sigma_a \circ \sigma_b : \zeta \longmapsto \zeta^{ab} \Rightarrow \varphi(\sigma_a \circ \sigma_b) = \overline{ab}$$

$\text{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta)/\mathbb{Q}) \simeq ((\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*, \cdot) \simeq (\mathbb{Z}/(p-1)\mathbb{Z}, +)$, Probando que $\text{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta)/\mathbb{Q})$ es cíclico. Ahora,

$$\begin{aligned} |\text{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta)/\mathbb{Q}) : \text{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta)/E)| |\text{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta)/E)| &= \\ &= |\text{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta)/\mathbb{Q})| \\ \Rightarrow [E : \mathbb{Q}] |\text{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta)/E)| &= |\text{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta)/\mathbb{Q})| \\ \Rightarrow 2 |\text{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta)/E)| &= |\text{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta)/\mathbb{Q})| \\ \Rightarrow |\text{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta)/E)| &= \frac{p-1}{2} \end{aligned}$$

Como $\frac{p-1}{2}$ es divisor de $p-1$ existe un único subgrupo de orden $\frac{p-1}{2}$ (2.30 en el libro de rojo). Resumiendo, si $[E : \mathbb{Q}] = 2$ entonces solo existe un posible $\text{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta)/E)$ y por lo tanto $\exists! E$ por la correspondencia de Galois ya que $\mathbb{Q}(\zeta)/\mathbb{Q}$ es de Galois $p-1 = [\mathbb{Q}(\zeta) : \mathbb{Q}]$.

2.

i) Las raíces de $(x^3 - 3)(x^2 - 3)$ son $\{\sqrt[3]{3}\zeta_3, \sqrt[3]{3}\zeta_3^2, \pm\sqrt{3}\}$.

$$\zeta_3 = e^{i\frac{2\pi}{3}} = \cos\left(\frac{2\pi}{3}\right) + i\sin\left(\frac{2\pi}{3}\right) = -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\zeta_3^2 = e^{i\frac{4\pi}{3}} = \cos\left(\frac{2\pi}{3}\right) + i\sin\left(\frac{4\pi}{3}\right) = -\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}$$

Veamos que

$$\left\{-\frac{\sqrt[3]{3}}{2} \pm i\frac{\sqrt[6]{3}}{2}, \pm\sqrt{3}\right\} \subset \mathbb{Q}(\sqrt[6]{3}, i)$$

Es suficiente con observar que $\sqrt[6]{3}^2 = \sqrt[3]{3}$ y $\sqrt[6]{3}^3 = \sqrt[2]{3}$. Veamos ahora que

$$\begin{aligned} \{\sqrt[6]{3}, i\} \subset \mathbb{Q}\left(-\frac{\sqrt[3]{3}}{2} \pm i\frac{\sqrt[6]{3}}{2}, \pm\sqrt{3}\right) \\ -\left(-\frac{\sqrt[3]{3}}{2} + i\frac{\sqrt[6]{3}}{2} - \frac{\sqrt[3]{3}}{2} - i\frac{\sqrt[6]{3}}{2}\right) = \sqrt[3]{3} \end{aligned}$$

$$\frac{\sqrt{3}}{\sqrt[3]{3}} = \sqrt[6]{3}$$

$$\left(-\frac{\sqrt[3]{3}}{2} + i\frac{\sqrt[6]{3}}{2}\right) - \left(-\frac{\sqrt[3]{3}}{2} - i\frac{\sqrt[6]{3}}{2}\right) = i\sqrt[6]{3}$$

$$i\frac{\sqrt[6]{3}}{\sqrt[6]{3}} = i$$

Tenemos que $\mathbb{Q}(\sqrt[6]{3}, i) = \mathbb{Q}\left(-\frac{\sqrt[3]{3}}{2} \pm i\frac{\sqrt[6]{3}}{2}, \pm\sqrt{3}\right)$. $\mathbb{Q}(\sqrt[6]{3}, i)$ es el cuerpo de escisión de $(x^3 - 3)(x^2 - 3)$ sobre \mathbb{Q} y F/\mathbb{Q} es de Galois.

Las raíces de $x^3 + \sqrt{3}$ son $-\sqrt[6]{3}$ y $\frac{\sqrt[6]{3}}{2} \pm i\frac{\sqrt[3]{3}^2}{2}$. Por un lado,

$$\left(\frac{\sqrt[6]{3}}{2} + i\frac{\sqrt[3]{3}^2}{2}\right) - \left(\frac{\sqrt[6]{3}}{2} - i\frac{\sqrt[3]{3}^2}{2}\right) = i\sqrt[3]{3}^2$$

$$i\frac{\sqrt[3]{3}^2}{\sqrt[6]{3}^4} = i$$

$$\Rightarrow F \subset \mathbb{Q}\left(-\sqrt[6]{3}, \frac{\sqrt[6]{3}}{2} \pm i\frac{\sqrt[3]{3}^2}{2}\right)$$

Por otro lado,

$$\sqrt[6]{3}^2 = \sqrt[3]{3} \Rightarrow \mathbb{Q}\left(-\sqrt[6]{3}, \frac{\sqrt[6]{3}}{2} \pm i\frac{\sqrt[3]{3}^2}{2}\right) \subset F$$

es decir, F es el cuerpo de escisión de $x^3 + \sqrt{3}$ sobre $\mathbb{Q}(\sqrt{3})$.

- ii)
- iii)
- iv)