# Type theory

 $\mathsf{Con}_- : \mathbb{N} \to \mathsf{Set}$ 

 $\mathsf{Ty}_{-} \hspace{1cm} : \mathbb{N} \to \mathsf{Con}_{i} \to \mathsf{Set}$   $\mathsf{Sub} \hspace{1cm} : \mathsf{Con}_{i} \to \mathsf{Con}_{i} \to \mathsf{Set}$ 

 $\mathsf{Tm} \qquad : (\Gamma : \mathsf{Con}_i) \to \mathsf{Ty}_j \: \Gamma \to \mathsf{Set}$ 

#### Substitution calculus

· :  $\mathsf{Con}_0$ 

 $- \triangleright -$  :  $(\Gamma : \mathsf{Con}_i) \to \mathsf{Ty}_j \Gamma \to \mathsf{Con}_{i \sqcup j}$ 

 $-[-] \hspace{1cm} : \operatorname{Ty}_j \Delta \to \operatorname{Sub} \Gamma \Delta \to \operatorname{Ty}_j \Gamma$ 

 $\mathsf{id} \qquad : \mathsf{Sub}\,\Gamma\,\Gamma$ 

 $- \circ - \qquad : \operatorname{\mathsf{Sub}}\nolimits \Theta \, \Delta \to \operatorname{\mathsf{Sub}}\nolimits \Gamma \, \Theta \to \operatorname{\mathsf{Sub}}\nolimits \Gamma \, \Delta$ 

 $\epsilon$  : Sub  $\Gamma$  ·

 $-,- \qquad : (\sigma : \operatorname{\mathsf{Sub}}\nolimits \Gamma \Delta) \to \operatorname{\mathsf{Tm}}\nolimits \Gamma \left( A[\sigma] \right) \to$ 

 $\operatorname{\mathsf{Sub}}\Gamma(\Delta \triangleright A)$ 

 $\pi_1$  :  $\operatorname{Sub}\Gamma(\Delta \triangleright A) \to \operatorname{Sub}\Gamma\Delta$ 

 $\pi_2 \qquad \qquad : \left(\sigma : \operatorname{Sub}\Gamma\left(\Delta \rhd A\right)\right) \to \operatorname{Tm}\Gamma\left(A[\pi_1\,\sigma]\right)$ 

 $-[-] \hspace{1cm} : \operatorname{Tm} \Delta \, A \to (\sigma : \operatorname{Sub} \Gamma \, \Delta) \to \operatorname{Tm} \Gamma \, (A[\sigma])$ 

 $[\mathsf{id}] \qquad : A[\mathsf{id}] = A$ 

 $[\circ] : A[\sigma \circ \delta] = A[\sigma][\delta]$ 

ass :  $(\sigma \circ \delta) \circ \nu = \sigma \circ (\delta \circ \nu)$ 

idl :  $id \circ \sigma = \sigma$ 

idr :  $\sigma \circ id = \sigma$ 

 $\cdot \eta$  :  $(\sigma : \mathsf{Sub}\,\Gamma \cdot) = \epsilon$ 

 $\triangleright \beta_1 \qquad : \pi_1 \left( \sigma, t \right) = \sigma$ 

 $\triangleright \beta_2 \qquad : \pi_2 \left( \sigma, t \right) = t$ 

 $\triangleright \eta \qquad : (\pi_1 \, \sigma, \pi_2 \, \sigma) = \sigma$ 

 $,\circ \qquad \qquad :(\sigma,t)\circ\delta=(\sigma\circ\delta,t[\delta])$ 

## Function space

 $\Pi \qquad \qquad : (A: \mathsf{Ty}_i \, \Gamma) \to \mathsf{Ty}_j \, (\Gamma \triangleright A) \to \mathsf{Ty}_{i \sqcup j} \, \Gamma$ 

 $\operatorname{lam} \qquad :\operatorname{Tm} \left(\Gamma \rhd A\right)B \to \operatorname{Tm} \Gamma \left(\Pi \, A \, B\right)$ 

 $\mathsf{app} \qquad : \mathsf{Tm}\,\Gamma\,(\Pi\,A\,B) \to \mathsf{Tm}\,(\Gamma \triangleright A)\,B$ 

 $\Pi \beta$  : app  $(\operatorname{lam} t) = t$  $\Pi \eta$  :  $\operatorname{lam} (\operatorname{app} t) = t$   $\Pi[] \hspace{1cm} : (\Pi \, A \, B)[\sigma] = \Pi \, (A[\sigma]) \, (B[\sigma^{\uparrow}])$ 

 $\operatorname{lam}[] \qquad : (\operatorname{lam} t)[\sigma] = \operatorname{lam} (t[\sigma^{\uparrow}])$ 

Sigma

 $\Sigma \qquad \qquad : (A: \mathsf{Ty}_i \, \Gamma) \to \mathsf{Ty}_j \, (\Gamma \triangleright A) \to \mathsf{Ty}_{i \sqcup j} \, \Gamma$ 

 $-,- \qquad : (u:\operatorname{Tm}\Gamma\,A) \to \operatorname{Tm}\Gamma\,(B[\langle u\rangle]) \to$ 

 $\mathsf{Tm}\,\Gamma\,(\Sigma\,A\,B)$ 

 $\operatorname{proj}_1 : \operatorname{Tm}\Gamma(\Sigma AB) \to \operatorname{Tm}\Gamma A$ 

 $\operatorname{proj}_2 \qquad : (t:\operatorname{Tm}\Gamma\left(\Sigma\,A\,B\right)) \to \operatorname{Tm}\Gamma\left(B[\langle \operatorname{proj}_1 u \rangle]\right)$ 

 $\Sigma\beta_{1} \qquad : \operatorname{proj}_{1}\left(u,v\right) = u$ 

 $\Sigma\beta_2 \qquad : \operatorname{proj}_2\left(u,v\right) = v$ 

 $\Sigma \eta \qquad \qquad : (\operatorname{proj}_1 t, \operatorname{proj}_2 t) = t$ 

 $\Sigma[] \hspace{1cm} : (\Sigma \, A \, B)[\sigma] = \Sigma \, (A[\sigma]) \, (B[\sigma^{\uparrow}])$ 

, []  $: (u,v)[\sigma] = (u[\sigma],v[\sigma])$ 

#### Unit

 $\top$  :  $\mathsf{Ty}_0 \Gamma$ 

 $\mathsf{tt} \qquad : \mathsf{Tm}\,\Gamma\,\top$ 

 $\top \eta \qquad \qquad : (t: \mathsf{Tm}\,\Gamma\,\top) = \mathsf{tt}$ 

 $\top[] \hspace{1cm} : \top[\sigma] = \top$ 

 $\mathsf{tt}[] \qquad : \mathsf{tt}[\sigma] = \mathsf{tt}$ 

## Empty

 $\perp$  : Ty<sub>0</sub>  $\Gamma$ 

 $\mathsf{abort} \qquad : \mathsf{Tm}\,\Gamma \,\bot \to \mathsf{Tm}\,\Gamma\, C$ 

 $\perp[]$  :  $\perp[\sigma] = \perp$ 

abort[] :  $(abort t)[\sigma] = abort (t[\sigma])$ 

## Coquand universes

 $\mathsf{U} \qquad : (i:\mathbb{N}) \to \mathsf{Ty}_{i+1} \, \Gamma$ 

EI :  $\operatorname{Tm} \Gamma \operatorname{U}_i \to \operatorname{Ty}_i \Gamma$ 

c :  $\operatorname{Ty}_i \Gamma \to \operatorname{Tm} \Gamma \operatorname{U}_i$ 

 $\mathsf{U}\beta \qquad : \mathsf{El}\,(\mathsf{c}\,A) = A$ 

 $\mathsf{U}\eta \qquad \qquad :\mathsf{c}\left(\mathsf{El}\,a\right)=a$ 

 $\mathsf{U}[] \qquad : \mathsf{U}_i[\sigma] = \mathsf{U}_i$ 

 $\mathsf{EI}[] \qquad : (\mathsf{EI}\,a)[\sigma] = \mathsf{EI}\,(a[\sigma])$ 

#### Booleans

Bool :  $Ty_0$ 

true :  $\mathsf{Tm}\,\Gamma\,\mathsf{Bool}$  false :  $\mathsf{Tm}\,\Gamma\,\mathsf{Bool}$ 

if  $: (P : \mathsf{Ty}_i (\Gamma \triangleright \mathsf{Bool})) \to \mathsf{Tm} \Gamma (P[\langle \mathsf{true} \rangle]) \to$ 

 $\operatorname{\mathsf{Tm}}\Gamma\left(P[\langle\operatorname{\mathsf{false}}\rangle]\right) \to (t:\operatorname{\mathsf{Tm}}\Gamma\operatorname{\mathsf{Bool}}) \to$ 

 $\operatorname{\mathsf{Tm}}\Gamma\left(P[\langle t \rangle]\right)$ 

 $\mathsf{Bool}\beta_{\mathsf{true}}\,:\mathsf{if}\,P\,u\,v\,\mathsf{true}=u$ 

 $\mathsf{Bool}\beta_{\mathsf{false}}: \mathsf{if}\,P\,u\,v\,\mathsf{false} = v$ 

 $\mathsf{Bool}[] \qquad : \mathsf{Bool}[\sigma] = \mathsf{Bool}$ 

true[] :  $true[\sigma] = true$ false[] :  $false[\sigma] = false$ 

false[] : false[ $\sigma$ ] = false

 $\mathsf{if}[] \qquad \qquad : (\mathsf{if}\,P\,u\,v\,t)[\sigma] = \mathsf{if}\,(P[\sigma^\uparrow])\,(u[\sigma])\,(v[\sigma])\,(t[\sigma])$ 

## Abbreviations

wk : Sub  $(\Gamma \triangleright A) \Gamma := \pi_1 \text{ id}$ 

vz :  $\mathsf{Tm} (\Gamma \triangleright A) (A[\mathsf{wk}]) := \pi_2 \mathsf{id}$ 

vs  $(t: \mathsf{Tm}\,\Gamma\,A): \mathsf{Tm}\,(\Gamma \triangleright B)\,(A[\mathsf{wk}]) := t[\mathsf{wk}]$ 

 $\langle - \rangle$   $(t: \mathsf{Tm}\,\Gamma\,A): \mathsf{Sub}\,\Gamma\,(\Gamma \triangleright A) := (\mathsf{id},t)$ 

 $-^{\uparrow}$   $(\sigma : \mathsf{Sub}\,\Gamma\,\Delta) : \mathsf{Sub}\,(\Gamma \triangleright A[\sigma])\,(\Delta \triangleright A) :=$ 

 $(\sigma: \mathsf{Sub} \, 1 \, \Delta): \mathsf{Sub} \, (1 \, \triangleright A[\sigma]) \, (\Delta \triangleright A) :=$ 

 $(\sigma \circ \mathsf{wk}, \mathsf{vz})$ 

 $[\mathsf{id}] \qquad : t[\mathsf{id}] = t$ 

 $[\circ] : t[\sigma \circ \delta] = t[\sigma][\delta]$ 

 $\pi_1 \circ \qquad : (\pi_1 \, \sigma) \circ \delta = \pi_1 \, (\sigma \circ \delta)$ 

 $\pi_2[]$  :  $(\pi_2 \sigma)[\delta] = \pi_2 (\sigma \circ \delta)$ 

 $\operatorname{app}[] \qquad : (\operatorname{app} t)[\sigma^{\uparrow}] = \operatorname{app} (t[\sigma])$ 

 $- \Rightarrow - \quad : (A\,B : \mathsf{Ty}_i\,\Gamma) \to \mathsf{Ty}_{i\sqcup j}\,\Gamma := \Pi\,A\,(B[\mathsf{wk}])$ 

 $-\,\$\,-\qquad :\,(t:\operatorname{Tm}\Gamma\,(\Pi\,A\,B))(u:\operatorname{Tm}\Gamma\,A):$ 

 $\operatorname{Tm}\Gamma\left(B[\langle u\rangle]\right):=(\operatorname{app}t)[\langle u\rangle]$ 

 $\$\beta \qquad \qquad : (\operatorname{lam} t)\,\$\,u = t[\langle u \rangle]$ 

 $\$\eta \qquad \qquad : \mathsf{lam}\left(t[\mathsf{wk}]\,\$\,\mathsf{vz}\right) = t$ 

 $\mathsf{proj}_1[] \qquad : (\mathsf{proj}_1\,t)[\sigma] = \mathsf{proj}_1\,(t[\sigma])$ 

 $\operatorname{proj}_{2}[]$  :  $(\operatorname{proj}_{2} t)[\sigma] = \operatorname{proj}_{2}(t[\sigma])$ 

 $c[] \qquad : (c A)[\sigma] = c (A[\sigma])$