

Laboratorio #3: Modelos de Regresión en R

Ejercicio #1: En un script de R realice una función que dado un dataframe cualquiera de dos columnas, donde la primera (índice 1) sea el valor de la variable independiente (X) y la segunda sea el valor de una variable dependiente (Y), devuelva una lista con los siguientes elementos:

- 1) Un arreglo con los valores de los estimadores para β_0 y β_1 .
- 2) El valor del coeficiente de determinación r^2 del modelo.
- 3) El coeficiente de correlación r .
- 4) Un arreglo con los valores de los residuos.
- 5) Una gráfica con la nube de puntos y la recta de regresión del modelo.

Nota: Para este ejercicio no está permitido utilizar la función `lm()` para calcular ninguno de los elementos solicitados (incisos 1 al 4), sin embargo puede utilizar `ggplot` para realizar la gráfica del inciso 5.

Ejercicio #2: Para este ejercicio se le solicita que desarrolle las siguientes actividades utilizando RStudio Con el dataset Lab #3 - Admissions que podrá encontrar en la sección de Material de Apoyo, realice lo siguiente:

1. Realice un análisis estadístico sobre todas las variables del dataset, recuerde que puede usar la función `summary()`.
2. Realice una gráfica de densidad para cada una de las variables numéricas en el dataset: GRE.Score, TOEFEL.Score, CGPA y Chance of Admit.
3. Realice una gráfica de correlación entre las variables del inciso anterior.
4. Realice comentarios sobre el análisis estadístico de las variables numéricas y la gráfica de correlación.
5. Realice un scatter plot de todas las variables numéricas contra la variable Chance of Admit.
6. Realice un modelo de regresión lineal simple con cada variable numérica como X y la variable Chance of Admit como Y.
7. Realice una gráfica de cada modelo de regresión lineal en su scatter plot correspondiente.
8. Como en la Parte #2, realice un análisis sobre los resultados de cada modelo y diga cual de estos considera que es mejor y por que.

Ejercicio #3: A continuación se le muestran tres imágenes que muestran los resultados obtenidos de correr la función `summary()` a dos modelos de regresión lineal, para este ejercicio se le solicita que realice la interpretación de las tablas resultantes. Recuerde tomar en cuenta la significancia de los parámetros (signficancia local), la significancia del modelo (signficancia global), el valor del r^2 : y cualquier observación que considere relevante para determinar si el modelo estructuralmente es adecuado o no.

Modelo #1:

```
Call:
lm(formula = ROLL ~ UNEM, data = datavar)

Residuals:
    Min       1Q   Median       3Q      Max
-7640.0 -1046.5   602.8  1934.3  4187.2

Coefficients:
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)   3957.0     4000.1   0.989   0.3313
UNEM           1133.8       513.1   2.210   0.0358 *
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 3049 on 27 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.1531, Adjusted R-squared:  0.1218
F-statistic: 4.883 on 1 and 27 DF,  p-value: 0.03579
```

Modelo #2:

```
Call:
lm(formula = ROLL ~ UNEM + HGRAD + INC, data = datavar)

Residuals:
    Min       1Q   Median       3Q      Max
-1148.840  -489.712   -1.876   387.400  1425.753

Coefficients:
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) -9.153e+03  1.053e+03  -8.691 5.02e-09 ***
UNEM         4.501e+02  1.182e+02   3.809 0.000807 ***
HGRAD        4.065e-01  7.602e-02   5.347 1.52e-05 ***
INC          4.275e+00  4.947e-01   8.642 5.59e-09 ***
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 670.4 on 25 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.9621, Adjusted R-squared:  0.9576
F-statistic: 211.5 on 3 and 25 DF,  p-value: < 2.2e-16
```

Modelo #3:

Call:

```
lm(formula = Cab.Price ~ Months, data = training_set)
```

Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-11.034	-2.305	-1.034	2.764	9.241

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)
(Intercept)	72.6826	3.2377	22.45	6.92e-10 ***
Months	4.8626	0.3495	13.91	7.18e-08 ***

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 5.657 on 10 degrees of freedom

Multiple R-squared: 0.9509, Adjusted R-squared: 0.946

F-statistic: 193.6 on 1 and 10 DF, p-value: 7.181e-08