

Reti di calcolatori

VR443470

ottobre 2022

Indice

1	Lezione 01	3
1.1	Equazioni a variabili separabili	3
1.2	Problema di Cauchy	5

1 Lezione 01

1.1 Equazioni a variabili separabili

Le equazioni differenziali a **variabili separabili** hanno due forme:

- **Forma canonica.** $y'(x) = f(x) \cdot g(y(x))$
- **Forma alternativa.** $y' = f(x) \cdot g(y)$

Dove f e g sono funzioni continue “in un intervallo reale”, più formalmente:

$$\begin{aligned} f &\text{ continua in } I \subseteq \mathbb{R} \\ g &\text{ continua in } J \subseteq \mathbb{R} \end{aligned}$$

Le **soluzioni** di un'equazione differenziale possono essere:

- ✓ **Costanti.** Quando $\bar{y} \in \mathbb{R}$ è uno zero di $g(y)$ e dunque vale:

$$y(x) = \bar{y} \quad \forall x \in I$$

Quindi, quando un valore annulla $g(y)$, vuol dire che è stata trovata una soluzione costante dell'equazione differenziale.

- ✓ **Non costanti.** Quando $g(y)$ non si annulla e quindi ci sarà la relazione:

$$y'(x) = f(x) \cdot g(y(x)) \longrightarrow \frac{y'(x)}{g(y(x))} = f(x)$$

Tuttavia, supponendo che $G(y)$ sia una primitiva di $\frac{1}{g(y)}$, allora:

$$\frac{d}{dx} G(y(x)) = f(x) \quad \text{con} \quad G(x) = F(x) + c \quad c \in \mathbb{R}$$

Dove $F(x)$ è la primitiva di $f(x)$. Ma dato che G è invertibile, si scrive:

$$y(x) = G^{-1}(F(x) + c) \quad \text{con } c \in \mathbb{R} \quad (1)$$

L'equazione 1 rappresenta l'**insieme delle soluzioni dell'equazione differenziale** e viene chiamato anche **integrale generale**.

Esempio equazione differenziale a variabili separabili

Equazione differenziale: $y' = xy$ in cui la x rappresenta $f(x)$ e la y rappresenta la $g(y)$. Una **nuova notazione** utilizzata negli esercizi è la seguente:

$$f, g \in \mathcal{C}^0(\mathbb{R})$$

Che indica che le **funzioni f e g sono continue nell'intervallo \mathbb{R}** .

L'esercizio si svolge *cercando* inizialmente le soluzioni costanti. Il modo più semplice per farlo è porre $y = 0$ e verificare se $g(y)$ si annulla: in caso affermativo esiste una soluzione costante. In questo esercizio si annulla, quindi *ha soluzione costante*.

Al contrario, le soluzioni non costanti si trovano quando $y \neq 0$. Quindi:

$$y' = xy \rightarrow \frac{dy}{dx} = xy \rightarrow \frac{1}{y} dy = x dx \rightarrow \int \frac{1}{y} dy = \int x dx \rightarrow \ln |y| = \frac{1}{2} x^2 + c \quad c \in \mathbb{R}$$

Esplicitando il risultato:

$$|y(x)| = e^{\frac{1}{2}x^2 + c} \quad c \in \mathbb{R} \longrightarrow y(x) = \pm e^c \cdot e^{\frac{1}{2}x^2} \quad c \in \mathbb{R}$$

Dato che e^c può essere positivo o negativo escluso lo zero (soluzione costante!), si riscrive più precisamente l'**integrale generale dell'equazione**:

$$y(x) = k \cdot e^{\frac{1}{2}x^2} \quad k \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$$

È possibile **verificare la soluzione** dell'equazione differenziale effettuando una derivazione:

$$\begin{aligned} y(x) &= k \cdot e^{\frac{1}{2}x^2} \\ y'(x) &= k \cdot x \cdot e^{\frac{1}{2}x^2} \quad \forall x \in \mathbb{R} \quad \checkmark \text{Verificata} \end{aligned}$$

1.2 Problema di Cauchy

Nel caso in cui si è interessati ad una soluzione particolare, è necessaria una condizione. In questo caso, si è di fronte al **problema di Cauchy**, il quale è caratterizzato dalla presenza di un'equazione differenziale e da almeno una condizione.

L'**obiettivo** è verificare la/le condizione/i tramite una soluzione (o più soluzioni).

La **struttura** è la seguente:

$$\begin{cases} y' = f(x) \cdot g(y) \\ y(x_0) = y_0 \end{cases} \quad x_0 \in I \quad (2)$$

Esempio problema di Cauchy

Il problema:

$$\begin{cases} y' = -3y \\ y(0) = 2 \end{cases}$$

La risoluzione: