

Guida agli Esami di Analisi II

VR443470

luglio 2023

Indice

1	Esercizio 1 - Problema di Cauchy	3
1.1	Problema di Cauchy - Soluzione	3
1.2	Alcuni esercizi d'esame svolti	5
2	Esercizio 2 - Problema di Cauchy con variabile t e y''	6
2.1	Risoluzione del problema di cauchy con y''	6
2.2	Alcuni esercizi d'esame svolti	9
3	Esercizio 3 - Studio di funzione	10
3.1	Tipologie di esercizio	10
3.1.1	Rappresentare la funzione nel piano cartesiano	10
3.1.2	Dimostrazione che un punto sia interno al dominio	14
3.1.3	Direzione della funzione affinché essa sia di massima crescita	15
3.1.4	Specificare se un dominio è aperto/chiuso, limitato/illimitato, connesso/sconnesso, compatto	18
3.1.5	Trovare l'equazione al piano tangente	20
3.1.6	Calcolare il gradiente della funzione (∇f)	23
3.1.7	Calcolare la derivata direzionale	25
3.2	Alcuni esercizi d'esame svolti	27
4	Esercizio 4 - Stabilire se una funzione è continua e parametriz- zazioni	28
4.1	Tipologie di esercizio 1	28
4.1.1	Stabilire se una funzione è continua	28
4.1.2	Variante (rara) - Stabilire se una funzione è continua . . .	30
4.1.3	Dimostrazione di una disuguaglianza e di un limite (Teo- rema del confronto)	31
4.1.4	Verificare l'esistenza di un limite in un punto	33
4.2	Tipologie di esercizio 2	35
4.2.1	Parametrizzazione retta tangente in un punto all'arco di ellisse	35

1 Esercizio 1 - Problema di Cauchy

1.1 Problema di Cauchy - Soluzione

Il primo esercizio è sempre uguale e riguarda il problema di Cauchy. Un esempio di testo tratto dal tema d'esame del 25/06/2021: *Si trovi una soluzione locale del seguente problema di Cauchy e si determini l'intervallo massimale in cui tale soluzione è definita.*

$$\begin{cases} y' + \frac{y^3}{x^2 + 1} = 0 \\ y(0) = 1 \end{cases}$$

Il **primo passo** è esplicitare la derivata, per cui:

$$\begin{cases} y' + \frac{y^3}{x^2 + 1} = 0 \\ y(0) = 1 \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} y' = -\frac{y^3}{x^2 + 1} \\ y(0) = 1 \end{cases}$$

Il **secondo passo** è risolvere l'integrale per ciascuna parte:

$$\rightarrow \int -\frac{y^3}{x^2 + 1} dx$$

↓ y^3 è costante, quindi si porta fuori dall'integrale

$$\rightarrow -y^3 \cdot \int \frac{1}{x^2 + 1} dx$$

↓ l'integrale corrisponde all'arcotangente: $\int \frac{1}{x^2 + a^2} dx = \frac{1}{a} \cdot \arctan\left(\frac{x}{a}\right)$

$$-\int \frac{1}{y^3} dy = \frac{1}{1} \cdot \arctan\left(\frac{x}{1}\right)$$

↓ risoluzione dell'integrale a sinistra

$$\frac{1}{2y^2} = \arctan(x)$$

↓ si somma la costante c

$$\frac{1}{2y^2} = \arctan(x) + c$$

Il risultato rappresenta la famiglia delle soluzioni delle funzioni y , chiamata anche *soluzione generale*.

Il **terzo passo** è sostituire la condizione iniziale all'interno della soluzione e calcolare il valore della costante c :

$$\text{Condizione iniziale} \longrightarrow y(0) = 1$$

$$\text{Sostituzione nella soluzione generale} \longrightarrow \frac{1}{2 \cdot 1^2} = \arctan(0) + c$$

Quindi il valore di $c = \frac{1}{2}$.

Il **quarto e ultimo passo** riguarda l'intervallo massimale. Per trovarlo, è necessario prendere in considerazione la soluzione generale trovata al punto 2:

$$\frac{1}{2y^2} = \arctan(x) + c$$

Sostituire il valore c con la soluzione trovata, nel nostro caso $\frac{1}{2}$:

$$\frac{1}{2y^2} = \arctan(x) + \frac{1}{2}$$

Esplicitando la y , si ottiene:

$$\begin{aligned} \frac{1}{y^2} &= 2 \cdot \arctan(x) + 1 \\ y^{-2} &= \frac{1}{2 \arctan(x) + 1} \\ y &= \frac{1}{\sqrt{2 \arctan(x) + 1}} \end{aligned}$$

A questo punto, si afferma che il problema ha soluzione solo se:

$$\arctan(x) + \frac{1}{2} > 0$$

Si esplicita la x ricordando che $\tan^{-1}(x) = y$ è l'inversa di $x = \tan(y)$:

$$\begin{aligned} \arctan(x) + \frac{1}{2} &> 0 \\ \arctan(x) &> -\frac{1}{2} \\ x &> \tan\left(-\frac{1}{2}\right) \\ x &> -\tan\left(\frac{1}{2}\right) \end{aligned}$$

1.2 Alcuni esercizi d'esame svolti

2 Esercizio 2 - Problema di Cauchy con variabile t e y''

2.1 Risoluzione del problema di cauchy con y''

Il secondo esercizio è un problema di Cauchy un po' più complesso poiché utilizza il metodo di somiglianza¹. Un esempio di testo estratto dal tema d'esame del 25/06/2021: *Si trovi la soluzione del seguente problema di Cauchy definita per ogni $t \in \mathbb{R}$:*

$$\begin{cases} y'' - y' = 1 - 2t \\ y(0) = 0 \\ y'(0) = 2 \end{cases}$$

Il **primo passo** è scrivere l'equazione caratteristica che corrisponde sempre alla prima equazione:

$$y'' - y' = 1 - 2t \longrightarrow \lambda^2 - \lambda = 0$$

L'equazione caratteristica deve essere posta uguale a zero.

Il **secondo passo** è risolvere l'equazione caratteristica così da avere le soluzioni reali distinte:

$$\lambda_1 = 0, \lambda_2 = 1$$

Il **terzo passo** è scrivere l'integrale generale $y(t)$ indicando con $y_P(t)$ una soluzione particolare dell'equazione completa:

$$y(t) = y_P(t) + c_1 e^{0t} + c_2 e^{1t} \quad c_1, c_2 \in \mathbb{R}$$

Escludendo questo esercizio, in generale l'integrale generale è sempre così. Gli unici termini che cambiano sono le e che hanno come esponente la soluzione dell'equazione moltiplicata per t .

Dato che una soluzione dell'equazione caratteristica è 0 e $1 - 2t$ è un polinomio di primo grado, $y_P(t)$ sarà:

$$y_P(t) = (at + b)t^1 = at^2 + bt$$

Dove l'esponente 1 indica quante volte si ripete il valore zero.

N.B. Esistono diverse casistiche e ciascuno cambia l'equazione della soluzione particolare:

- **Polinomio di secondo grado.** In questo caso si scrive un'equazione di secondo grado generale

$$\text{Esercizio di esempio:} \longrightarrow y'' + 3y' + 2y = 2x^2 - 1$$

$$\text{Soluzione particolare:} \longrightarrow y_P(x) = ax^2 + bx + c$$

¹[Link utile](#)

- **Polinomio con un esponenziale.** In questo caso si scrive un'equazione contenente l'esponenziale per un valore generico:

$$\text{Esercizio di esempio: } \longrightarrow y'' + y' - 2y = 3e^{-x}$$

$$\text{Soluzione particolare: } \longrightarrow y_P(x) = ae^{-x}$$

- **Polinomio di primo grado.** In questo caso si scrive un'equazione di primo grado generale:

$$\text{Esercizio di esempio: } \longrightarrow y'' + y' - 2y = x + 2$$

$$\text{Soluzione particolare: } \longrightarrow y_P(x) = ax + b$$

- **Soluzione dell'equazione caratteristica che compare nel polinomio.** In questo caso, è necessario aggiungere la x elevandola al numero di ripetizioni nel polinomio:

$$\text{Esercizio di esempio: } \longrightarrow y'' + 3y' + 2y = 3e^x$$

$$\text{Soluzione particolare: } \longrightarrow y_P(x) = a \cdot x^1 \cdot e^x$$

- **Soluzione dell'equazione caratteristica uguale a zero ($\lambda = 0$).** In questo caso, è necessario aggiungere una x elevandola al numero di volte in cui $\lambda = 0$ annulla l'equazione (molteplicità algebrica):

$$\text{Esercizio di esempio: } \longrightarrow y'' + y' = x + 2$$

$$\text{Soluzione particolare: } \longrightarrow y_P(x) = (ax + b)x^1$$

- **Coseno o seno.** In questo caso, è necessario scrivere entrambe le funzioni trigonometriche:

$$\text{Esercizio di esempio: } \longrightarrow y'' + y' = \cos(2x)$$

$$\text{Soluzione particolare: } \longrightarrow y_P(x) = a \cos(2x) + b \sin(2x)$$

Il **quarto passo** è eseguire la derivata prima e seconda della soluzione particolare:

$$\begin{aligned} y_P(t) &= at^2 + bt \\ y'_P(t) &= 2at + b \\ y''_P(t) &= 2a \end{aligned}$$

Il **quinto passo** è sostituire le derivate trovate nel problema iniziale, ovvero in $y'' - y'$, e risolvere il sistema equivalente:

$$\begin{aligned} y'' - y' &= 1 - 2t \\ (2a) - (2at + b) &= 1 - 2t \\ 2a - 2at - b &= 1 - 2t \\ (-2a)t + (2a - b) &= (-2)t + (1) \end{aligned}$$

$$\begin{cases} -2a = -2 \\ 2a - b = 1 \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} a = 1 \\ b = 1 \end{cases}$$

Il **sesto passo** è sostituire i valori trovati nella soluzione particolare:

$$y_P(t) = at^2 + bt \rightarrow y_P(t) = 1 \cdot t^2 + 1 \cdot t = t^2 + t$$

Il **settimo passo** è riscrivere l'integrale generale $y(t)$ con la soluzione particolare:

$$y(t) = t^2 + t + c_1 + c_2 e^{1t}$$

Ed eseguire la derivata prima di tale equazione:

$$\begin{aligned} y'(t) &= \frac{d}{dt} t^2 + t + c_1 + c_2 e^t \\ y'(t) &= 2t + 1 + c_2 e^t \end{aligned}$$

L'**ottavo passo** conclude l'esercizio. Si esegue una sostituzione delle condizioni del problema nell'integrale generale e nella sua derivata così da trovare le costanti c_1 e c_2 :

$$\begin{cases} y(0) = 0 \\ y'(0) = 2 \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} 0^2 + 0 + c_1 + c_2 e^0 = 0 \\ 2 \cdot 0 + 1 + c_2 e^0 = 2 \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} c_1 + c_2 = 0 \\ c_2 = 1 \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} c_1 = -1 \\ c_2 = 1 \end{cases}$$

Infine, si scrive la soluzione del problema di Cauchy sostituendo le costanti nell'integrale generale:

$$y(t) = t^2 + t - 1 + e^t$$

2.2 Alcuni esercizi d'esame svolti

3 Esercizio 3 - Studio di funzione

3.1 Tipologie di esercizio

3.1.1 Rappresentare la funzione nel piano cartesiano

Un esercizio semplice che ad oggi viene fuso con altri esercizi, è quello della rappresentazione della funzione nel piano cartesiano. Si prenda in considerazione l'esame del 25/06/2021: *Sia $D \subset \mathbb{R}^2$ il dominio naturale della funzione:*

$$f(x, y) = \sqrt{y - x^2} - \ln(4x - x^2 - 4y^2)$$

Si rappresenti D nel piano cartesiano.

Il **primo passo** è rappresentare il dominio della funzione. In questo caso, è necessario affermare che l'espressione sotto radice sia maggiore/uguale di zero (per rimanere nei reali) e l'espressione del logaritmo sia strettamente maggiore di zero (con zero il logaritmo non ha soluzione):

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : (y - x^2 \geq 0) \wedge (4x - x^2 - 4y^2 > 0)\}$$

N.B. Esistono diverse casistiche:

- **Frazione:**

$$f(x, y) = \frac{\log(x + 1)}{\sqrt{x^2 + 4y^2 - 1}}$$

Nonostante ci sia una radice quadrata, al denominatore non può esserci uno zero! Per cui, il dominio deve essere:

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : (x + 1 > 0) \wedge (x^2 + 4y^2 - 1 > 0)\}$$

- **Radice quadrata e logaritmo annidato:**

$$f(x, y) = y + \frac{1}{\sqrt{1 - \ln(y - x^2)}} - \ln(x)$$

In cui il suo dominio è:

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : (y > x^2) \wedge (y < x^2)\}$$

Il **secondo passo** è calcolare i punti appartenenti al dominio, così da poter rappresentare il grafico sul piano cartesiano. Per farlo, si prende ogni condizione presente nel dominio e si calcolano un po' di punti:

x	y
0	0
± 1	1
± 2	4

Punti di $y - x^2$

x	y
0	0
1	$\pm \frac{\sqrt{3}}{4}$
2	± 1

Punti di $4x - x^2 - 4y^2$




Grafico $4x - x^2 - 4y^2 > 0$.




Grafico $y - x^2 \geq 0$.




Grafico del dominio completo.

3.1.2 Dimostrazione che un punto sia interno al dominio

Una richiesta banale ma che potrebbe capitare, nonostante sia molto raro, è la seguente (estratta dall'esame del 25/06/2021): *Sia $D \subset \mathbb{R}^2$ il dominio naturale della funzione:*

$$f(x, y) = \sqrt{y - x^2} - \ln(4x - x^2 - 4y^2)$$

Si dimostri che il punto $P(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ è interno all'insieme D .

Il **primo passo** è prendere le disuguaglianze del dominio e considerarle in modo stretto, ovvero:

$$\begin{array}{ll} y - x^2 \geq 0 & \longrightarrow y - x^2 > 0 \\ 4x - x^2 - 4y^2 > 0 & \longrightarrow 4x - x^2 - 4y^2 > 0 \end{array}$$

Il **secondo passo** è sostituire i valori del punto dato dall'esercizio e verificare la veridicità delle disuguaglianze. In questo caso, si sostituisce il punto $P(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ all'interno delle due disuguaglianze:

$$\begin{array}{ll} y - x^2 > 0 & \longrightarrow \frac{1}{2} - \frac{1^2}{2^2} > 0 \implies \frac{1}{4} > 0 \quad \checkmark \\ 4x - x^2 - 4y^2 > 0 & \longrightarrow 4 \cdot \frac{1}{2} - \frac{1^2}{2^2} - 4 \cdot \frac{1^2}{2^2} > 0 \implies \frac{3}{4} > 0 \quad \checkmark \end{array}$$

Il punto P rispetta entrambe le disuguaglianze, quindi è un punto interno al dominio.

3.1.3 Direzione della funzione affinché essa sia di massima crescita

Una richiesta che si può trovare negli esami ma non è tra le più richieste, è la seguente: *Sia $D \subset \mathbb{R}^2$ il dominio naturale della funzione:*

$$f(x, y) = \sqrt{y - x^2} - \ln(4x - x^2 - 4y^2)$$

In quale direzione ci si deve muovere da P per garantire a f la massima crescita?

La direzione \vec{v} di massima crescita è quella del gradiente di f nel punto P . Per cui, per calcolare il gradiente sono necessari due passaggi fondamentali. Il **primo passo** è calcolare la derivata parziale rispetto a x :

$$f(x, y) = \sqrt{y - x^2} - \ln(4x - x^2 - 4y^2)$$

$$f(x, y) = \frac{\partial}{\partial x} \left(\sqrt{y - x^2} - \ln(4x - x^2 - 4y^2) \right)$$

$$\downarrow \text{ si utilizza la regola } \frac{\partial}{\partial x} (f + g) = \frac{\partial}{\partial x} (f) + \frac{\partial}{\partial x} (g)$$

$$f(x, y) = \frac{\partial}{\partial x} \left(\sqrt{y - x^2} \right) - \frac{\partial}{\partial x} \left(\ln(4x - x^2 - 4y^2) \right)$$

$$\downarrow \text{ derivata della radice quadrata per la derivata dell'argomento}$$

$$f(x, y) = \frac{1}{2\sqrt{y - x^2}} \cdot (-2x) - \frac{\partial}{\partial x} \left(\ln(4x - x^2 - 4y^2) \right)$$

$$\downarrow \text{ derivata del logaritmo per la derivata dell'argomento}$$

$$f(x, y) = \frac{1}{2\sqrt{y - x^2}} \cdot (-2x) - \frac{1}{4x - x^2 - 4y^2} \cdot (4 - 2x)$$

$$\downarrow \text{ semplificazioni}$$

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = -\frac{x}{\sqrt{y - x^2}} - \frac{4 - 2x}{4x - x^2 - 4y^2}$$

Il **secondo passo** è calcolare la derivata parziale rispetto a y :

$$f(x, y) = \sqrt{y - x^2} - \ln(4x - x^2 - 4y^2)$$

$$f(x, y) = \frac{\partial}{\partial y} \left(\sqrt{y - x^2} - \ln(4x - x^2 - 4y^2) \right)$$

$$\downarrow \text{ si utilizza la regola } \frac{\partial}{\partial y} (f + g) = \frac{\partial}{\partial y} (f) + \frac{\partial}{\partial y} (g)$$

$$f(x, y) = \frac{\partial}{\partial y} \left(\sqrt{y - x^2} \right) - \frac{\partial}{\partial y} (\ln(4x - x^2 - 4y^2))$$

$$\downarrow \text{ derivata della radice quadrata per la derivata dell'argomento}$$

$$f(x, y) = \frac{1}{2\sqrt{y - x^2}} \cdot (1) - \frac{\partial}{\partial y} (\ln(4x - x^2 - 4y^2))$$

$$\downarrow \text{ derivata del logaritmo per la derivata dell'argomento}$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = \frac{1}{2\sqrt{y - x^2}} - \frac{1}{4x - x^2 - 4y^2} \cdot (-8y)$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = \frac{1}{2\sqrt{y - x^2}} + \frac{8y}{4x - x^2 - 4y^2}$$

Il **terzo passo** è quello di andare a sostituire i valori del punto P all'interno delle derivate parziali. Così facendo, si troverà la direzione di massima crescita, ovvero il gradiente:

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) &= -\frac{x}{\sqrt{y-x^2}} - \frac{4-2x}{4x-x^2-4y^2} \\ \frac{\partial f}{\partial x}\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right) &= -\frac{\frac{1}{2}}{\sqrt{\frac{1}{2}-\frac{1^2}{2^2}}} - \frac{4-2 \cdot \frac{1}{2}}{4 \cdot \frac{1}{2} - \frac{1^2}{2^2} - 4 \cdot \frac{1^2}{2^2}} \\ \frac{\partial f}{\partial x}\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right) &= -1 - \frac{3}{2 - \frac{1}{4} - 1} \\ \frac{\partial f}{\partial x}\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right) &= -5\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) &= \frac{1}{2\sqrt{y-x^2}} + \frac{8y}{4x-x^2-4y^2} \\ \frac{\partial f}{\partial y}\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right) &= \frac{1}{2\sqrt{\frac{1}{2}-\frac{1^2}{2^2}}} + \frac{8 \cdot \frac{1}{2}}{4 \cdot \frac{1}{2} - \frac{1^2}{2^2} - 4 \cdot \frac{1^2}{2^2}} \\ \frac{\partial f}{\partial y}\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right) &= 1 + \frac{4}{2 - \frac{1}{4} - 1} \\ \frac{\partial f}{\partial y}\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right) &= \frac{19}{3}\end{aligned}$$

Si conclude l'esercizio:

$$\vec{v} = \nabla f(P) = \left(-5, \frac{19}{3}\right)$$

3.1.4 Specificare se un dominio è aperto/chiuso, limitato/illimitato, connesso/sconnesso, compatto

Questa richiesta è molto probabile che ci sia all'esame. Solitamente, viene accoppiata con la scrittura del dominio e della sua rappresentazione (pagina 10). Un esempio di tema d'esame (03/03/2023): *Data la funzione:*


$$f(x, y) = ye^{\sqrt{x-2y}} - \ln(xy)$$

Determinare analiticamente il suo dominio naturale D e poi rappresentarlo nel piano cartesiano. Stabilire se D è un insieme limitato/illimitato, aperto/chiuso, connesso/sconnesso (motivare le risposte!).

Prima di tutto si stabilisce il dominio:

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : (x - 2y \geq 0) \wedge (xy > 0)\}$$

Ovvero si impone le condizioni di esistenza sulla radice quadrata e il logaritmo. La sua rappresentazione grafica:




- **Limitato o illimitato?** Il dominio è illimitato, dato che continua all'infinito, ovvero non esiste una palla con centro l'origine e raggio $r \in \mathbb{R}$ che contiene D .
- **Aperto o chiuso?** Il dominio non è né chiuso né aperto poiché contiene alcuni punti della sua frontiera ma non tutti.

- **Connesso o sconnesso?** Il dominio è sconnesso poiché non è connesso per archi. Infatti, come si può vedere dal grafico del dominio, quest'ultimo è l'unione di due insiemi.

Nell'esame del 07/02/2023, la funzione di riferimento e il dominio erano:

$$f(x, y) = y + \frac{1}{\sqrt{1 - \ln(y - x^2)}} - \ln(x)$$

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : (y > x^2) \wedge (y < x^2 + e) \wedge (x > 0)\}$$



Dominio della funzione.

In questo caso, il dominio è illimitato per lo stesso motivo dell'esercizio precedente; il dominio è aperto poiché tutti i punti sono interni e inoltre è connesso per archi.

3.1.5 Trovare l'equazione al piano tangente

Uno degli esercizi più richiesti insieme alla derivata direzionale, è quello di trovare l'equazione al piano tangente. Si prenda in considerazione il tema d'esame del 07/02/2023 in cui veniva chiesto: **Data la funzione:**

$$f(x, y) = y + \frac{1}{\sqrt{1 - \ln(y - x^2)}} - \ln(x)$$

Scrivere l'equazione del piano tangente al grafico di f nel punto $(1, 2, f(1, 2))$.

Anche in questo caso, come accadeva nel caso in cui si doveva trovare la direzione della funzione affinché essa sia di massima crescita (pagina 15), è necessario calcolare le derivate parziali di $f(x, y)$. Quindi, il **primo passo** è calcolare la derivata parziale rispetto a x :

$$\begin{aligned} f(x, y) &= y + \frac{1}{\sqrt{1 - \ln(y - x^2)}} - \ln(x) \\ f(x, y) &= \frac{\partial}{\partial x} \left(y + \frac{1}{\sqrt{1 - \ln(y - x^2)}} - \ln(x) \right) \\ &\downarrow \text{ si utilizza la regola } \frac{\partial}{\partial x} (f + g) = \frac{\partial}{\partial x} (f) + \frac{\partial}{\partial x} (g) \\ f(x, y) &= \frac{\partial}{\partial x} (y) + \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{1}{\sqrt{1 - \ln(y - x^2)}} \right) - \frac{\partial}{\partial x} (\ln(x)) \\ &\downarrow \text{ si utilizza la regola } \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{1}{f} \right) = -\frac{\frac{\partial}{\partial x}(f)}{f^2} \\ \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) &= 0 - \frac{\frac{1}{2\sqrt{1 - \ln(y - x^2)}} \cdot \left(-\frac{1}{y - x^2} \cdot (-2x) \right)}{\sqrt{1 - \ln(y - x^2)}^2} - \left(\frac{1}{x} \cdot (1) \right) \\ \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) &= -\frac{\frac{1}{2\sqrt{1 - \ln(y - x^2)}} \cdot \left(\frac{2x}{y - x^2} \right)}{1 - \ln(y - x^2)} - \frac{1}{x} \\ \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) &= -\frac{\frac{x}{\sqrt{1 - \ln(y - x^2)} \cdot (y - x^2)}}{1 - \ln(y - x^2)} - \frac{1}{x} \\ \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) &= -\frac{x}{\sqrt{1 - \ln(y - x^2)} \cdot (y - x^2) \cdot (1 - \ln(y - x^2))} - \frac{1}{x} \end{aligned}$$

Il **secondo passo** è calcolare la derivata parziale rispetto a y :

$$\begin{aligned}
 f(x, y) &= y + \frac{1}{\sqrt{1 - \ln(y - x^2)}} - \ln(x) \\
 f(x, y) &= \frac{\partial}{\partial y} \left(y + \frac{1}{\sqrt{1 - \ln(y - x^2)}} - \ln(x) \right) \\
 &\downarrow \text{ si utilizza la regola } \frac{\partial}{\partial y} (f + g) = \frac{\partial}{\partial y} (f) + \frac{\partial}{\partial y} (g) \\
 f(x, y) &= \frac{\partial}{\partial y} (y) + \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{1}{\sqrt{1 - \ln(y - x^2)}} \right) - \frac{\partial}{\partial y} (\ln(x)) \\
 &\downarrow \text{ si utilizza la regola } \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{1}{f} \right) = -\frac{\frac{\partial}{\partial y}(f)}{f^2} \\
 \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) &= 1 - \frac{\frac{1}{2\sqrt{1 - \ln(y - x^2)}} \cdot \left(-\frac{1}{y - x^2} \cdot 1 \right)}{\sqrt{1 - \ln(y - x^2)}^2} - 0 \\
 \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) &= 1 + \frac{1}{2\sqrt{1 - \ln(y - x^2)} \cdot (y - x^2) \cdot (1 - \ln(y - x^2))}
 \end{aligned}$$

Il **terzo passo** è scrivere il gradiente valutato nel punto dato, ovvero in $P(1, 2)$. Quindi, si prendono le derivate parziali trovate, si sostituiscono i valori e si utilizzano nel gradiente:

$$\begin{aligned}
 \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) &= -\frac{x}{\sqrt{1 - \ln(y - x^2)} \cdot (y - x^2) \cdot (1 - \ln(y - x^2))} - \frac{1}{x} \\
 \frac{\partial f}{\partial x}(1, 2) &= -\frac{1}{\sqrt{1 - \ln(2 - 1^2)} \cdot (2 - 1^2) \cdot (1 - \ln(2 - 1^2))} - \frac{1}{1} \\
 \frac{\partial f}{\partial x}(1, 2) &= -\frac{1}{\sqrt{1 - \ln(1)} \cdot 1 \cdot (1 - \ln(1))} - 1 \\
 \frac{\partial f}{\partial x}(1, 2) &= -\frac{1}{1 \cdot 1 \cdot 1} - 1 \\
 \frac{\partial f}{\partial x}(1, 2) &= -2 \\
 \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) &= 1 + \frac{1}{2\sqrt{1 - \ln(y - x^2)} \cdot (y - x^2) \cdot (1 - \ln(y - x^2))} \\
 \frac{\partial f}{\partial y}(1, 2) &= 1 + \frac{1}{2\sqrt{1 - \ln(2 - 1^2)} \cdot (2 - 1^2) \cdot (1 - \ln(2 - 1^2))} \\
 \frac{\partial f}{\partial y}(1, 2) &= 1 + \frac{1}{2 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1} \\
 \frac{\partial f}{\partial y}(1, 2) &= \frac{3}{2}
 \end{aligned}$$

Per cui il gradiente corrisponde al valore:

$$\nabla f(P) = \nabla f(1, 2) = \left(-2, \frac{3}{2}\right)$$

Il **quarto e ultimo passo** è scrivere l'equazione del piano tangente. Il piano tangente nel punto $(x, y, (x_0, y_0))$ è rappresentato dall'equazione:

$$z = f(x_0, y_0) + \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)(x - x_0) + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)(y - y_0)$$

Dove $f(x, y)$ è la funzione e (x_0, y_0) è il punto in cui è differenziabile.

Grazie a questo richiamo di teoria, adesso è possibile scrivere l'equazione del piano tangente. Quindi, si prende il punto differenziabile, cioè $P(1, 2)$, e si sostituisce nell'equazione iniziale:

$$f(x, y) = y + \frac{1}{\sqrt{1 - \ln(y - x^2)}} - \ln(x)$$

$$f(1, 2) = 2 + \frac{1}{\sqrt{1 - \ln(2 - 1^2)}} - \ln(1)$$

$$f(1, 2) = 2 + \frac{1}{1} - 0$$

$$f(1, 2) = 3$$

E infine si sostituiscono i valori calcolati nell'equazione del piano tangente:

$$z = 3 - 2(x - 1) + \frac{3}{2}(y - 2) = 3 - 2x + 2 + \frac{3}{2}y - 3 = -2x + \frac{3}{2}y + 2$$

3.1.6 Calcolare il gradiente della funzione (∇f)

Esercizio difficile che venga richiesto, ma una volta è capitato, è la richiesta esplicita di calcolare il gradiente. Solitamente viene richiesto di trovare la massima crescita della funzione, cioè il gradiente, o la derivata direzionale. In questo caso, si calcola direttamente il gradiente come è stato fatto nei precedenti capitoli. Si riporta comunque i passaggi da eseguire. Si faccia riferimento al testo d'esame del 15/09/2021, gruppo A: **Data la funzione:**

$$f(x, y) = \log(x^2 - 4x + 4y^2) - \sqrt{2x - x^2}$$

Calcolare $\nabla f(P)$, dove P è il punto di coordinate $(1, 2)$.

Il **primo passo** è calcolare la derivata parziale rispetto x :

$$\begin{aligned}f(x, y) &= \log(x^2 - 4x + 4y^2) - \sqrt{2x - x^2} \\f(x, y) &= \frac{\partial}{\partial x} (\log(x^2 - 4x + 4y^2) - \sqrt{2x - x^2}) \\f(x, y) &= \frac{\partial}{\partial x} (\log(x^2 - 4x + 4y^2)) - \frac{\partial}{\partial x} (\sqrt{2x - x^2}) \\\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) &= \frac{1}{x^2 - 4x + 4y^2} \cdot (2x - 4) - \frac{1}{2\sqrt{2x - x^2}} \cdot (2 - 2x) \\\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) &= \frac{2x - 4}{x^2 - 4x + 4y^2} - \frac{2 - 2x}{2\sqrt{2x - x^2}}\end{aligned}$$

Il **secondo passo** è calcolare la derivata parziale rispetto y :

$$\begin{aligned}f(x, y) &= \log(x^2 - 4x + 4y^2) - \sqrt{2x - x^2} \\f(x, y) &= \frac{\partial}{\partial y} (\log(x^2 - 4x + 4y^2) - \sqrt{2x - x^2}) \\f(x, y) &= \frac{\partial}{\partial y} (\log(x^2 - 4x + 4y^2)) - \frac{\partial}{\partial y} (\sqrt{2x - x^2}) \\\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) &= \frac{1}{x^2 - 4x + 4y^2} \cdot (8y) - \frac{1}{2\sqrt{2x - x^2}} \cdot (0) \\\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) &= \frac{8y}{x^2 - 4x + 4y^2}\end{aligned}$$

Il **terzo passo** è sostituire il punto di coordinate $P(1, 2)$ all'interno delle derivate parziali e calcolare il gradiente:

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) &= \frac{2x - 4}{x^2 - 4x + 4y^2} - \frac{2 - 2x}{2\sqrt{2x - x^2}} \\\frac{\partial f}{\partial x}(1, 2) &= \frac{2 \cdot 1 - 4}{1^2 - 4 \cdot 1 + 4 \cdot 2^2} - \frac{2 - 2 \cdot 1}{2\sqrt{2 \cdot 1 - 1^2}} \\\frac{\partial f}{\partial x}(1, 2) &= -\frac{2}{13} - \frac{0}{2} = -\frac{2}{13}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) &= \frac{8y}{x^2 - 4x + 4y^2} \\ \frac{\partial f}{\partial y}(1, 2) &= \frac{8 \cdot 2}{1^2 - 4 \cdot 1 + 4 \cdot 2^2} \\ \frac{\partial f}{\partial y}(1, 2) &= \frac{16}{13}\end{aligned}$$

Il gradiente dunque corrisponde a:

$$\nabla f(P) = \nabla f(1, 2) = \left(-\frac{2}{13}, \frac{16}{13}\right)$$

3.1.7 Calcolare la derivata direzionale

Un esercizio richiestissimo, è il calcolo della derivata direzionale. Un esercizio tipo è il seguente, estratto dall'esame del 15/09/2021, gruppo A: **Data la funzione:**

$$f(x, y) = \log(x^2 - 4x + 4y^2) - \sqrt{2x - x^2}$$

Calcolare la derivata direzionale di f in P rispetto al vettore $\vec{v} = \left(\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}\right)$.

La derivata direzionale di una funzione in un punto rispetto ad un vettore, non è altro che la moltiplicazione del gradiente della funzione in quel punto per il vettore, ovvero:

$$\nabla f(P) \cdot \vec{v}$$

Viene da sé che è necessario prima calcolare il gradiente e poi calcolare il vettore. Come **primo passo** si calcolano le derivate parziali:

$$\begin{aligned} f(x, y) &= \log(x^2 - 4x + 4y^2) - \sqrt{2x - x^2} \\ f(x, y) &= \frac{\partial}{\partial x} (\log(x^2 - 4x + 4y^2) - \sqrt{2x - x^2}) \\ f(x, y) &= \frac{\partial}{\partial x} (\log(x^2 - 4x + 4y^2)) - \frac{\partial}{\partial x} (\sqrt{2x - x^2}) \\ \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) &= \frac{1}{x^2 - 4x + 4y^2} \cdot (2x - 4) - \frac{1}{2\sqrt{2x - x^2}} \cdot (2 - 2x) \\ \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) &= \frac{2x - 4}{x^2 - 4x + 4y^2} - \frac{2 - 2x}{2\sqrt{2x - x^2}} \\ f(x, y) &= \log(x^2 - 4x + 4y^2) - \sqrt{2x - x^2} \\ f(x, y) &= \frac{\partial}{\partial y} (\log(x^2 - 4x + 4y^2) - \sqrt{2x - x^2}) \\ f(x, y) &= \frac{\partial}{\partial y} (\log(x^2 - 4x + 4y^2)) - \frac{\partial}{\partial y} (\sqrt{2x - x^2}) \\ \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) &= \frac{1}{x^2 - 4x + 4y^2} \cdot (8y) - \frac{1}{2\sqrt{2x - x^2}} \cdot (0) \\ \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) &= \frac{8y}{x^2 - 4x + 4y^2} \end{aligned}$$

(calcoli già eseguiti nel paragrafo precedente, li riportiamo per convenienza)

Il **secondo passo** è sostituire il punto fornito $P(1, 2)$ all'interno delle derivate parziali così da ottenere il gradiente:

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = \frac{2x - 4}{x^2 - 4x + 4y^2} - \frac{2 - 2x}{2\sqrt{2x - x^2}}$$

$$\frac{\partial f}{\partial x}(1, 2) = \frac{2 \cdot 1 - 4}{1^2 - 4 \cdot 1 + 4 \cdot 2^2} - \frac{2 - 2 \cdot 1}{2\sqrt{2 \cdot 1 - 1^2}}$$

$$\frac{\partial f}{\partial x}(1, 2) = -\frac{2}{13} - \frac{0}{2} = -\frac{2}{13}$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = \frac{8y}{x^2 - 4x + 4y^2}$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(1, 2) = \frac{8 \cdot 2}{1^2 - 4 \cdot 1 + 4 \cdot 2^2}$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(1, 2) = \frac{16}{13}$$

Il gradiente dunque corrisponde a:

$$\nabla f(P) = \nabla f(1, 2) = \left(-\frac{2}{13}, \frac{16}{13}\right)$$

Fin qua l'esercizio è identico al calcolo del gradiente della funzione (pagina 23). Il **terzo passo** è eseguire la moltiplicazione tra il versore fornito dall'esercizio \vec{v} e il gradiente calcolato:

$$\nabla f(P) \cdot \vec{v} = \left(-\frac{2}{13} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{16}{13} \cdot \frac{1}{2}\right) = \left(-\frac{\sqrt{3}}{13}, \frac{8}{13}\right) = -\frac{\sqrt{3}}{13} + \frac{8}{13} = \frac{-\sqrt{3} + 8}{13}$$

3.2 Alcuni esercizi d'esame svolti

4 Esercizio 4 - Stabilire se una funzione è continua e parametrizzazioni

4.1 Tipologie di esercizio 1

4.1.1 Stabilire se una funzione è continua

Un *evergreen* nell'esercizio 4 è la richiesta di stabilire se la funzione data è continua in un certo insieme. Il procedimento è il seguente; si estrae un esercizio dal tema d'esame del 15/09/2021, gruppo A: **Stabilire se la funzione:**

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{y^4}{x^2 + y^4} & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

è continua in \mathbb{R}^2 .

La soluzione di questo esercizio, il più delle volte, è affermare che la funzione non è continua nell'insieme dato. Tuttavia, talvolta non è così scontato ed è necessario dimostrare il motivo della risposta.

Il **primo passo**, banale e al 90% verificabile visivamente, è verificare che la funzione sia definita nel punto $(0, 0)$. Infatti, per stabilire se la funzione è continua in \mathbb{R}^2 , è necessario che sia continua nel punto $(0, 0)$.

In questo caso, l'esercizio afferma che nel caso in cui x e y siano zero $(x, y) = (0, 0)$, la funzione abbia risultato 0. Per cui, la funzione è definita.

Il **secondo passo** è verificare che esista il limite con x che tende a zero e con y che tende a zero. Nel caso in cui sia ∞ , è possibile affermare che la funzione non è continua facendo vedere i calcoli del limite. In questo caso:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} f(x, 0) &= \frac{0^4}{x^2 + 0^4} = \frac{0}{x^2} = 0 \\ \lim_{y \rightarrow 0} f(0, y) &= \frac{y^4}{0^2 + y^4} = \frac{y^4}{y^4} = 1 \end{aligned}$$

I limiti non coincidono, per cui è possibile affermare che la funzione non è continua nell'origine $(0, 0)$, ovvero i limite di f per $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ non esiste. Quindi, f non è continua in \mathbb{R}^2 .

Per completezza, si presenta un esercizio in cui una funzione è continua per capire come comportarsi. Si estrae un esercizio dal tema d'esame del 01/03/2022: **Stabilire se la funzione:**

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{(x-1)(y-2)}{\sqrt{(x-1)^2 + (y-2)^2}} & (x, y) \neq (1, 2) \\ 0 & (x, y) = (1, 2) \end{cases}$$

è continua in \mathbb{R}^2 .

Il **primo passo** è verificare che la funzione sia definita in $(1, 2)$. In questo caso lo è, quindi si passa avanti.

Il **secondo passo** è verificare i limiti con il punto $(1, 2)$:

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 1} f(x, 2) &= \frac{(x-1)(2-2)}{\sqrt{(x-1)^2 + (2-2)^2}} \\ &= \frac{0}{\sqrt{(x-1)^2}} \\ &= \frac{0}{0} \\ &= 0\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\lim_{y \rightarrow 2} f(1, y) &= \frac{(1-1)(y-2)}{\sqrt{(1-1)^2 + (y-2)^2}} \\ &= \frac{0}{\sqrt{(y-2)^2}} \\ &= \frac{0}{0} \\ &= 0\end{aligned}$$

I due limiti esistono e hanno lo stesso risultato. Per essere certi che la funzione sia continua, è necessario un **terzo passo**, ovvero:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$$

Dato che il limite esiste ed è uguale a zero per $(1, 2)$, nel caso di $f(1, 2)$, si continua ad avere il valore 0. Quindi, la funzione è continua.

4.1.2 Variante (rara) - Stabilire se una funzione è continua

Nell'esame del 03/03/2023 è stata fatta una richiesta diversa dal solito. È stato chiesto di stabilire un valore k tale che la funzione risulti continua nell'origine:
Si consideri la funzione:

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 + y^2}{x^2 + xy + y^2} & (x, y) \neq (0, 0) \\ k & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

Esiste un valore di $k \in \mathbb{R}$ tale che f risulti continua nell'origine?

Ipotizzando di muoversi lungo la retta per l'origine con $x \neq 0$, la funzione verrebbe riscritta come:

$$f(x, mx) = \frac{x^2 + m^2 x^2}{x^2 + mx^2 + m^2 x^2} = \frac{x^2 (1 + m^2)}{x^2 (1 + m + m^2)} = \frac{1 + m^2}{1 + m + m^2}$$

Si vede anche ad occhio, che il limite della funzione $f(x, mx)$ con x che tende a zero ($x \rightarrow 0$) dipende dal fattore m . Dunque è possibile concludere che tale limite non esiste:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y)$$

Per cui, è possibile concludere che per nessun valore di k la funzione f è continua in $(0, 0)$.

4.1.3 Dimostrazione di una disuguaglianza e di un limite (Teorema del confronto)

Nell'esame del 22/07/2021 è stato richiesto di eseguire dei calcoli insoliti rispetto alle classiche richieste degli esercizi: *Dimostrare che:*

$$x^2|y| \leq \frac{1}{2}(x^4 + y^2) \quad \text{per ogni } (x, y) \in \mathbb{R}^2$$

e utilizzare la precedente disuguaglianza per verificare che:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^3 y}{x^4 + y^2} = 0$$

Il **primo passo** è dimostrare che vale la disuguaglianza mostrata. Per farlo, è necessario verificare che tutte le espressioni siano maggiore o uguale a zero, ovvero:

$$\begin{aligned} x^2|y| &\leq \frac{1}{2}(x^4 + y^2) \\ 2 \cdot x^2|y| &\leq \frac{1}{2}(x^4 + y^2) \cdot 2 \\ 2x^2|y| &\leq (x^4 + y^2) \\ -x^4 + 2x^2|y| &\leq y^2 \\ -x^4 + 2x^2|y| - y^2 &\leq 0 \\ x^4 - 2x^2|y| + y^2 &\geq 0 \\ (x^2 - |y|)^2 &\geq 0 \end{aligned}$$

Disuguaglianza verificata. Infatti, anche se ci fosse un numero negativo, l'elevazione al quadrato la farebbe tornare positiva. Al massimo l'espressione può essere zero, ma anche in tal caso l'espressione è ammessa. Quindi, è possibile concludere affermando che l'espressione risulta non negativa per ogni $(x, y) \in \mathbb{R}^2$.

Il **secondo passo** è utilizzare la disuguaglianza per verificare il limite. Si utilizza il teorema del confronto², che afferma: se $\{a_n\}, \{b_n\}, \{c_n\}$ sono tre successioni di numeri tali che:

$$a_n \leq b_n \leq c_n$$

e se si ha:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} c_n = l$$

allora anche:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = l$$

²[Link alla fonte di YouMath in cui ci sono esempi](#)

Per applicarlo, si prende in considerazione l'argomento del limite, cioè $\frac{x^3 y}{x^4 + y^2}$, e si afferma che deve essere maggiore o uguale a zero:

$$0 \leq \left| \frac{x^3 y}{x^4 + y^2} \right|$$

Dato che l'esercizio chiede di utilizzare anche la disuguaglianza precedente, lo studente dovrebbe avere l'intuizione di notare che:

$$x^2 |y| \leq \frac{1}{2} (x^4 + y^2)$$

Corrisponde a:

$$\begin{aligned} x^2 |y| &\leq \frac{1}{2} (x^4 + y^2) \\ \frac{1}{x^4 + y^2} \cdot x^2 |y| &\leq \frac{1}{2} \cdot \cancel{(x^4 + y^2)} \cdot \frac{1}{\cancel{x^4 + y^2}} \\ \frac{x^2 |y|}{x^4 + y^2} &\leq \frac{1}{2} \end{aligned}$$

Di nuovo, se lo studente riesce ad avere l'intuizione, noterà che aggiungendo una $|x|$, è possibile ottenere $\frac{x^3 y}{x^4 + y^2}$:

$$0 \leq \frac{x^3 y}{x^4 + y^2} = |x| \cdot \frac{x^2 |y|}{x^4 + y^2} \leq \frac{1}{2} \cdot |x|$$

Quindi, grazie al teorema del confronto:

$$0 \leq |x| \cdot \frac{x^2 |y|}{x^4 + y^2} \leq \frac{1}{2} \cdot |x|$$

Basta verificare che i limiti esterni siano uguali per affermare che anche quello al centro sia uguale:

$$\begin{aligned} \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} 0 &= 0 \\ \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{1}{2} \cdot |x| &= 0 \end{aligned}$$

Quindi, grazie al teorema del confronto, si afferma che:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^3 y}{x^4 + y^2} = 0$$

4.1.4 Verificare l'esistenza di un limite in un punto

Un esercizio che è stato richiesto qualche volta, è la verifica dell'esistenza di un certo limite. Ovvero, viene fornita una funzione e un punto su cui verificare l'esistenza di tale limite. Si prenda d'esempio l'esame del 08/02/2022, gruppo A: *Stabilire se la funzione:*

$$f(x, y) = \frac{y^3 + |x - 1|}{(x - 1)^2 + y^2}$$

ammette limite per $(x, y) \rightarrow (1, 0)$.

Il primo passo è verificare con x fissato:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1} f(x, 0) &= \frac{0^3 + |x - 1|}{(x - 1)^2 + 0^2} \\ &= \frac{|x - 1|}{(x - 1)^2} \\ &\rightarrow \text{Forma indeterminata } \frac{0}{0} \text{ quindi si usa Hopital} \\ &= \frac{\frac{d}{dx}|x - 1|}{\frac{d}{dx}(x - 1)^2} \\ &\rightarrow \text{Sapendo che } |x| = \sqrt{x^2} \\ &= \frac{\frac{d}{dx}\left(\sqrt{(x - 1)^2}\right)}{\frac{d}{dx}(x - 1)^2} \\ &= \frac{\frac{1}{2\sqrt{(x - 1)^2}} \cdot (2x - 2)}{\frac{d}{dx}(x - 1)^2} \\ &= \frac{1}{2(x - 1) \cdot 1} \\ &= \frac{1}{2x - 2} \\ &= \infty \end{aligned}$$

Il **secondo passo** è verificare con y fissato:

$$\begin{aligned}\lim_{y \rightarrow 0} f(1, y) &= \frac{y^3 + |1 - 1|}{(1 - 1)^2 + y^2} \\ &= \frac{y^3}{y^2} \\ &= y \\ &= 0\end{aligned}$$

Dato che il risultato dei due limiti è diverso, il limite nel punto $(1, 0)$ non esiste.

4.2 Tipologie di esercizio 2

4.2.1 Parametrizzazione retta tangente in un punto all'arco di ellisse

Questa tipologia di esercizio si è presentata soltanto una volta, anche perché l'ellisse non è una figura semplice da trattare (parole testuali del professore). L'esame del 25/06/2021, gruppo A, chiedeva: *Si trovi una parametrizzazione della retta tangente in $P(-2 - \sqrt{3}, \frac{9}{2})$ all'arco di ellisse di equazione:*

$$9x^2 + 4y^2 + 36x - 24y + 36 = 0$$

che congiunge (nell'ordine) i punti $A(-2, 6)$ e $B(-4, 3)$.

Quando ci si trova davanti ad un'ellisse o un'iperbole, è sempre conveniente utilizzare la tecnica del completamento dei quadrati. Questo perché la sua applicazione consente di ottenere direttamente la forma canonica dell'equazione cercata e di determinare i valori senza calcoli complessi³.

Quindi, il **primo passo** dell'applicazione del completamento dei quadrati è il raggruppamento dei valori simili, ovvero sia:

$$\begin{aligned} 9x^2 + 4y^2 + 36x - 24y + 36 &= 0 \\ (9x^2 + 36x) + (4y^2 - 24y) + 36 &= 0 \end{aligned}$$

Il **secondo passo** è prendere in considerazione i termini con le x , e poi quelli con le y , e cercare un quadrato. Ovvero sia un valore c tale per cui il Δ (nella formula del calcolo di un'equazione di secondo grado $\Delta = b^2 - 4 \cdot a \cdot c$) sia uguale a zero:

$$\begin{aligned} 9x^2 + 36x &\longrightarrow 36^2 - 4 \cdot 9 \cdot c = 0 \\ 36^2 - 36c &= 0 \\ c &= 36 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 4y^2 - 24y &\longrightarrow 24^2 - 4 \cdot 4 \cdot c = 0 \\ 24^2 - 16c &= 0 \\ c &= 36 \end{aligned}$$

Suggerimento: per trovare tale valore, basta risolvere la banale equazione $b^2 - 4 \cdot a \cdot c = 0$ con c incognita e a, b termini noti.

³[Video tutorial di approfondimento](#)

Il **terzo passo** è riscrivere l'equazione con i nuovi valori c , ma per lasciare invariata l'equazione è necessario annullarli, ovvero scrivere $c - c$ (nessun problema, con manipolazioni algebriche si riuscirà ad evitare di ritornare al punto di inizio):

$$(9x^2 + 36x + 36 - 36) + (4y^2 - 24y + 36 - 36) + 36 = 0$$

Le manipolazioni algebriche riguardano $9x^2 + 36x + 36$ e $4y^2 - 24y + 36$. Ovvero, si riscrivono le due espressioni come quadrati!

$$\begin{aligned} 9x^2 + 36x + 36 &\longrightarrow 9(x+2)^2 \\ 4y^2 - 24y + 36 &\longrightarrow 4(y-3)^2 \end{aligned}$$

E si riscrive l'equazione generale:

$$9(x+2)^2 - 36 + 4(y-3)^2 - 36 + 36 = 0$$

Banali semplificazioni algebriche:

$$\begin{aligned} 9(x+2)^2 - 36 + 4(y-3)^2 - 36 + 36 &= 0 \\ \frac{1}{36} \cdot 9(x+2)^2 + \frac{1}{4} \cdot 4(y-3)^2 &= \frac{36}{36} \cdot \frac{1}{36} \\ \frac{(x+2)^2}{4} + \frac{(y-3)^2}{9} &= 1 \end{aligned}$$

Quest'ultima equazione corrisponde all'equazione canonica dell'ellisse.

Il **quarto passo** è la parametrizzazione vera e propria⁴.

⁴Link utili: [coordinate ellittiche](#) e [parametrizzazione di un'ellisse](#)