

1) Sia r la retta di equazioni cartesiane $2x + 4y + z + 1 = 0$, $x - y + 1 = 0$ e sia s la retta di equazioni cartesiane $2x + 3y + z = 0$, $x + y = 0$.

1. Si stabilisca se le rette sono parallele, incidenti, sghembe o coincidenti.
2. Si dica se le rette r e s sono complanari. In caso affermativo, si trovi l'equazione del piano che le contiene.
3. Si trovi la distanza tra r e s .

RISPOSTE: 1. rette sghembe

2. no.

3. $d = \sqrt{3/26}$.

2) Si considerino i vettori di \mathbb{R}^4

$$\mathbf{v}_1 = (1, 1, -1, 0), \mathbf{v}_2 = (1, 0, -1, -1), \mathbf{v}_3 = (2, 1, 1, 2)$$

1. Si provi che $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ è un insieme di vettori linearmente indipendente.
2. Si trovi il valore di k per il quale il vettore $\mathbf{v}_4 = (0, k, -1, 0)$ appartiene al sottospazio generato da $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2$ e \mathbf{v}_3 e, per tale valore, si scriva \mathbf{v}_4 come combinazione lineare di $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3$.

RISPOSTE: 1.

$$RREF[v_1 \ v_2 \ v_3 \ v_4] = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -k \\ 0 & 0 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 - k \end{bmatrix}$$

2. $k = 1$

3) Si enunci il Teorema di Rouché-Capelli, e lo si illustri con alcuni esempi.

4) Sia $V = \mathbb{R}_2[x]$ lo spazio dei polinomi a coefficienti reali di grado al più due. Sia $T : V \rightarrow V$ la funzione definita da

$$T(p(x)) = xp'(x) + p(0)x,$$

dove $p'(x)$ indica la derivata del polinomio $p(x)$.

1. Mostrare che la funzione T è lineare.
2. Trovare la matrice $M_B(T)$ associata a T rispetto alla base $B = \{1, x, x^2\}$ di V e stabilire se la funzione T è invertibile.

RISPOSTE: 2.

$$M = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

T non invertibile

5) Sia $f : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$ la funzione lineare con matrice rappresentativa rispetto alla base canonica

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 1 & 0 & 0 \\ -4 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -3 & -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Si trovino autovalori e autovettori di f e si stabilisca se f è diagonalizzabile.

RISPOSTE: Autovalori: $\lambda_1 = 1$, $\lambda_2 = 2$ doppi. La matrice non è diagonalizzabile (l'autospazio $E(2)$ ha dimensione 1 e base $\{(-1, 2, 0, 1)\}$, mentre $E(1)$ ha base $\{(0, 0, 0, 1), (0, 0, 1, 0)\}$).

6) Dare la definizione di dimensione di uno spazio vettoriale. Dare due esempi di spazi vettoriali reali di dimensione tre. Se W è un sottospazio di V , c'è qualche relazione tra le loro dimensioni?