

$$h = \{ 0; \pm a_0, a_1 a_2 \dots \}$$

\pm segno Con 0 in N_0 parte intera

a_i ($i \geq 1$) cifre

$$a_i \in \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$$

$$N \subseteq Z \subseteq Q \subseteq R$$

è numerico quindi è un sottoinsieme di R

$$x \in R \quad x \neq \emptyset$$

$$M \in X: M \geq m \quad \forall m \in X \quad M = \max X$$

$$m \in X: m \leq n \quad " \quad m = \min X$$

$h \in R$ maggiorante per X se $h \geq m \quad \forall x \in X$

$\bar{H}_X = m$ dei magg

$$\max X \in \bar{H}_X$$

$$K \in \bar{H}_X, K' > K \Rightarrow K' \notin \bar{H}_X$$

$$K \notin \bar{H}_X \text{ se } \exists x \in X: x > K$$

Definizione: X limitato superiormente se $\bar{H}_X \neq \emptyset$

Definizione: $\sup X < \min \bar{H}_X$ se $\bar{H}_X \neq \emptyset$
 $\sup X = +\infty$ se $\bar{H}_X = \emptyset$
 $\sup X$ è unico

Se $\sup X$ è un numero si hanno queste proprietà:

$$\sup X = L \Leftrightarrow 1) L \geq x \quad \forall x \in X$$

$$2) \forall \varepsilon > 0 \exists x \in X: x > L - \varepsilon$$

se $\exists M = \max X \Rightarrow \sup X = M$ infatti 1) vero

$$2) \exists x \in X: x > M - \varepsilon ?$$

Basta prendere $x = M$

$$\text{se } \sup X \in X \Rightarrow \exists \max X = \sup X$$

perché $\sup X$ è un maggiorante di X

Definizione: $h \in \mathbb{R}$ minorente di X se $h \leq x \quad \forall x \in X$

\underline{M}_X = insieme dei minorenti

$$\min X \in \underline{M}_X$$

$$h \in \underline{M}_X, h' < h \Rightarrow h' \in \underline{M}_X$$

$$h \notin \underline{M}_X, \text{ se } \exists x \in X: x < h$$

Definizione: X limitato inferiormente se $\underline{M}_X \neq \emptyset$

$$\inf X \begin{cases} \max \underline{M}_X & \text{se } \underline{M}_X \neq \emptyset \\ -\infty & \text{se } \underline{M}_X = \emptyset \end{cases}$$


\hookrightarrow è unico

$$\inf X = \underbrace{l \in \mathbb{R}}_{\substack{\downarrow \\ \text{numero} \\ \text{reale}}} \Leftrightarrow 1) l \leq x \quad \forall x \in X$$

$$2) \forall \varepsilon > 0 \exists x \in X: x < l + \varepsilon$$

Definizione: X è limitato se $\underline{M}_X \neq \emptyset$ e $\overline{M}_X \neq \emptyset$ cioè se è limitato superiormente e inferiormente

$$\Leftrightarrow \exists a, b \in \mathbb{R}: X \subseteq [a, b]$$




Proprietà del valore assoluto

$$x = \pm a_0, a_1 a_2$$

$$-x = \mp a_0, a_1 a_2$$

Definizione

$$|x| = \begin{cases} x & \text{se } x \geq 0 \\ -x & \text{se } x < 0 \end{cases}$$



$$|-x| = |x|$$

$$|x| \text{ sempre } \geq 0 \quad \forall x$$
$$= 0 \Leftrightarrow x = 0$$

$$|x| = \max(x, -x)$$

$$-|x| \leq x \leq |x|$$

$$|x-2| = 0 \Rightarrow x-2=0 \Rightarrow x=2$$



$$|x-2| > 0 \quad \forall x$$

$$|x-2| \geq 0 \quad x \neq 2$$


$$|x-2| < 0 \quad \exists x$$

$$|x-2| \leq 0 \quad x=2$$

ampiezza di (a, b)



quindi $|a-b|$



$$\left. \begin{array}{l} a < x < b \\ a < y < b \end{array} \right\} \Rightarrow |x-y| < b-a$$

$$|a \cdot b| = |a| \cdot |b|$$



$$|a + b| \leq |a| + |b|$$

$$\left| \frac{1}{a} \right| = \frac{1}{|a|} \quad (a \neq 0)$$


$$\nexists |x| < \varepsilon \quad \forall \varepsilon > 0 \Rightarrow x = 0$$

↗ Massimo

$$X \text{ limitato} \Leftrightarrow \exists M > 0 : |x| \leq M \quad \forall x \in X$$



$$|x| < a \quad (a > 0) \Leftrightarrow -a < x < a$$



Esercizi:


Determinare l'estremo inferiore e l'estremo superiore precisando se sono minimo e massimo

$$1) a, b \in \mathbb{R} \quad x = (a, b) \quad \inf x = a \quad \sup x = b$$

$$x = [a, b) \quad \min x = a \quad \sup x = b$$

2)

$$X = \left\{ \frac{1}{n} : n \in \mathbb{N} \right\}$$



$$\inf x = 0 \quad \begin{cases} 1) 0 \leq \frac{1}{n} \quad \forall n? \text{ Si} \\ 2) \forall \varepsilon > 0 \exists n \in \mathbb{N} : \frac{1}{n} < \varepsilon \Leftrightarrow n > \frac{1}{\varepsilon} \end{cases}$$

$$\sup x = n < x \quad x = 1$$

$$3) x = \left\{ -\frac{1}{n} : n \in \mathbb{N} \right\} \quad 0 < \frac{1}{n} \leq 1 \quad \forall n \Rightarrow -1 \leq -\frac{1}{n} < 0$$

$$\text{minimo} = -1$$

$$\sup x = 0$$

4)

$$x = \left\{ (-1)^n \frac{n}{n+1} : n \in \mathbb{N} \right\} \quad (-1)^n = \begin{cases} 1 & n \text{ pari} \\ -1 & n \text{ dispari} \end{cases}$$

n pari

$$\frac{2}{3} < \frac{4}{5} < \dots < 1$$

$$\sup = 1$$


$$\text{minimo} = \frac{2}{3}$$

n dispari

$$-\frac{n}{n+1} \quad \text{con} \quad \frac{n}{n+1} \quad \frac{1}{2} < \frac{2}{3} < \dots < 1$$

$$\frac{1}{2} \leq \frac{n}{n+1} < 1 \quad \Rightarrow \quad -1 < -\frac{n}{n+1} \leq -\frac{1}{2} \quad \inf = -1$$

$$\max x = -\frac{1}{2}$$



$$\inf x = -1$$

$$\sup x = 1$$

5)

$$x =]0, 1[\cup \{3\} \quad \inf x = 0 \quad \max x = 3$$

6)

$$x = \{x \in \mathbb{R} : |x+2| < 3\}$$

$$\Downarrow$$

$$-3 < x+2 < 3 \Rightarrow -5 < x < 1$$

$$\inf x = -5$$

$$\sup x = 1$$

7)

$$x = \{x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} : x^2 - |x| \leq 0\}$$

$$\begin{cases} x \geq 0 \\ x^2 - x \leq 0 \end{cases}$$

$$\Downarrow$$

$$\begin{cases} x \geq 0 \\ 0 \leq x \leq 1 \end{cases}$$

$$0 \leq x \leq 1$$

$$\begin{cases} x < 0 \\ x^2 + x \leq 0 \end{cases}$$

$$\Downarrow$$

$$\begin{cases} x < 0 \\ -1 \leq x < 0 \end{cases}$$

$$-1 \leq x < 0$$

$$x = \{x \in \mathbb{R} - \mathbb{Q} : -1 \leq x \leq 1\}$$

$$\inf x = -1$$

$$\sup x = 1$$

$$\min x = -1$$

$$\max x = 1$$

8)

$$x = \{x \in \mathbb{R} : | |x-1| - 2x | < x+3 \}$$

A) lim inf

B) lim sup

C) = sup e inf

D) mon = sup e inf

$$| |x-1| - 2x | < x+3$$

$$|x-1| = \begin{cases} x-1 \rightarrow x \geq 1 \\ 1-x \rightarrow x < 1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} m < 1 \\ |1-x-2x| < x+3 \end{cases} \sim \begin{cases} m \geq 1 \\ |x-1-2x| < m+3 \end{cases}$$

$$\begin{cases} m < 1 \\ |3x-1| < x+3 \end{cases}$$

$$\downarrow$$

$$\begin{cases} x \geq 1 \\ (x+1) < x+3 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x < \frac{1}{3} \\ 1-3x < x+3 \end{cases} \quad \begin{cases} \frac{1}{3} \leq x < 1 \\ 3x-1 < x+3 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x \geq 1 \\ x+1 < x+3 \end{cases}$$

$$x \geq 1$$

$$\begin{cases} x < \frac{1}{3} \\ x > -\frac{1}{2} \end{cases} \quad \begin{cases} \frac{1}{3} \leq x < 1 \\ x < 2 \end{cases}$$

$$x =]-\frac{1}{2}, +\infty[$$

$$\downarrow$$

$$-\frac{1}{2} < m < 1$$

$$\downarrow$$

$$\frac{1}{3} \leq x < 1$$

(A)

Esercizi per casa (sempre con le risposte multiple)

$$x = \{x \in \mathbb{R} : |x-3| - 2 < |x|\}$$


$$x = \{x \in \mathbb{R} : |2|x-1| - x+3| < 4\}$$

$c \in \mathbb{R} \quad \eta > 0 \quad \exists c - \eta; c + \eta [$ intorno di c di raggio η

$x \subseteq \mathbb{R} \quad c \in \mathbb{R}$

$c \in x \quad c$ è interno ad x se $\exists \eta > 0 :]c - \eta, c + \eta [\subseteq x$

$x = [0, 2]$



1 è interno ad x

0 non è interno ad x



$\exists x - \eta, x + \eta [\subseteq [0, 2]$

$x + \eta < 2 \Rightarrow \eta < 2 - x$

$\text{int } x = \text{insieme dei suoi interni}$

$\text{int}(a, b) =]a, b[$

x aperto se $x = \emptyset$ oppure \forall tutti i suoi punti sono interni

x aperto $\Leftrightarrow x = \text{int}(x)$

es: \emptyset è aperto

\mathbb{R} è aperto

trovare un insieme tale che $\text{int}(x) = \emptyset$