

$V, W$  spazi vettoriali

$B_V$  base di  $V$ ,  $B_W$  base di  $W$

$f: V \rightarrow W$

$B'_V$

$B'_W$

$$[f]_{B_W}^{B_V} \neq [f]_{B'_W}^{B'_V}$$

$$B_V = \{v_1 \dots v_m\} \quad B_W = \{w_1 \dots w_n\}$$

$$B'_V = \{b_1 \dots b_m\} \quad B'_W = \{c_1 \dots c_n\}$$

$$v \in V \Rightarrow v = \lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_m v_m = [v]_{B_V} = (\lambda_1 \dots \lambda_m)$$

$$b_j = b_{1j} v_1 + b_{2j} v_2 + \dots + b_{mj} v_m$$

$$B = (b_{ij})_{1 \leq i,j \leq m} \in M_{m,m}(R) \Rightarrow v = \mu_1 (b_{11} v_1 + \dots + b_{m1} v_m) + \dots + \mu_m (b_{1m} v_1 + \dots + b_{mm} v_m) =$$

$$\left( [b_1]_{B_V} \dots [b_m]_{B_V} \right) = B$$

$$v \in V \Rightarrow \exists \mu_1 \dots \mu_m \text{ t.c. } v = \mu_1 b_1 + \dots + \mu_m b_m \Leftrightarrow [v]_{B'_V}$$

$$(\mu_1 b_{11} + \mu_2 b_{12} + \dots + \mu_m b_{1m}) v_1 + \dots + (\mu_1 b_{m1} + \dots + \mu_m b_{mm}) v_m$$

$$\Rightarrow [v]_{B_V} = \begin{pmatrix} \mu_1 b_{11} + \dots + \mu_m b_{1m} \\ \vdots \\ \mu_1 b_{m1} + \dots + \mu_m b_{mm} \end{pmatrix} = B \begin{pmatrix} \mu_1 \\ \vdots \\ \mu_m \end{pmatrix} = B [v]_{B'_V}$$

$$[w]_{B_W} = C [w]_{B'_W}$$

$$\begin{aligned}
 v \in V &\Rightarrow f(v) \in W && \Rightarrow c[f(v)]_{B'_W} = [M(f)]_{B_W}^{B_V} \cdot B[v]_{B_V} \\
 [f(v)]_{B_W} &= [M(f)]_{B_W}^{B_V} \cdot [v]_{B_V} && \Rightarrow [f(v)]_{B'_W} = \boxed{C^{-1} \cdot [M(f)]_{B_W}^{B_V} \cdot B \cdot [v]_{B_V}} \\
 \parallel & && \parallel \\
 c[f(v)]_{B'_W} & && B \cdot [v]_{B_V}
 \end{aligned}$$

$\parallel$   
 $[M(f)]_{B'_W}^{B'_V}$

Definizione

$M_1, M_2 \in M_{m,m}(R)$  si dicono equivalenti se


$\exists C \in M_{m,m}(R) \exists B \in M_{m,m}(R)$  invertibili tale che  $M_1 = C^{-1} M_2 B$

Proposizione

$f: V \rightarrow W$  ommorfismo

$M_1$  e  $M_2$  rappresentano  $f$  rispetto a basi diverse

$M_1$  e  $M_2$  sono simili




Come funzione con gli endomorfismi?

$\rho: V \rightarrow V$     $\underbrace{B, B'}_{\text{base}}$  basi di  $V$     $B = \text{matrice di cambiamento di base}$   
 $\downarrow$     $\downarrow$   
 base    $\downarrow$     $\downarrow$   
 matrice

sono 2 cose diverse

$$[\rho]_{B \rightarrow B}^B, [\rho]_{B \rightarrow B'}^{B'}, \text{ ecc...}$$



quindi 
$$[\rho]_{B' \rightarrow B'}^{B'} = B^{-1} [\rho]_{B \rightarrow B}^B \cdot B$$

$$[\rho]_{B' \rightarrow B'}^{B'} = [\rho]_{B \rightarrow B}^B \cdot B$$

$$[\rho]_{B' \rightarrow B'}^{B'} = B^{-1} [\rho]_{B \rightarrow B}^B$$

Due matrici:  $M_1, M_2 \in M_{m,m}(R)$  sono simili se  $\exists B \in M_{m,m}(R)$  invertibile tale che  $M_1 = B^{-1} M_2 B$

## Esercizi

$$f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} x+2y+z \\ y+z \end{pmatrix}$$

1)  $f$  è lineare? *Si perché è data da polinomi omogenei di primo grado*

2) Scrivere  $\pi(f)$  rispetto a  $\mathbb{R}^3$  e  $\mathbb{R}^2$

$$\mathcal{E}_3 = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\} \quad \mathcal{E}_2 = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

$$f\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad f\left(\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad f\left(\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\pi(f) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

3)  $\text{Ker } f \neq 0$ ?

$$\text{Ker}(f) = \text{Ker}(\pi(f))$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_1 \rightarrow R_1 - 2R_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{Ker} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{cases} x - z = 0 \\ y + z = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x = z \\ y = -z \end{cases} \Rightarrow \begin{pmatrix} z \\ -z \\ z \end{pmatrix}$$

$$\text{Ker} \left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle \rightarrow \text{è diverso da } 0$$

$$\dim(\text{Ker}(f)) = 1 = \text{null}(f) \Rightarrow 2 = \text{rk}(A) = \text{rk}(f) = \dim(\text{Im}(f))$$

2)

$$w = f\left(\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 7 \\ 9 \end{pmatrix}$$

$$f^{-1}(w) = \left\{ v \in V \mid f(v) = \begin{pmatrix} 7 \\ 9 \end{pmatrix} \right\} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} + \ker f = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} + \left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle$$

$$v = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

$$f(v) = \begin{pmatrix} x + 2y + z \\ y + z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 \\ 9 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} x + 2y + z = 7 \\ y + z = 9 \end{cases}$$

Esercizio 8  $T: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2x_1 + x_3 \\ 2x_1 + x_2 + x_3 \\ x_2 + 2x_3 \end{pmatrix}$$

Scrivere  $[\pi(f)]_{\substack{\mathcal{E}_4 \\ \mathcal{E}_3}}$

$$x_1 \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} + x_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + x_3 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} + x_4 \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$[\pi(f)]_{\substack{\mathcal{E}_4 \\ \mathcal{E}_3}} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{Ker } f = \text{Ker}(\pi(f))$$

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{G-J}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ x_4 \end{pmatrix} \rightarrow x_4 \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{Ker } f = \left\langle \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle \quad \dim(\text{Ker}(f)) = 1 = \text{null}(f)$$

$$\text{Im}(f) = \left\langle \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \cancel{\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}} \right\rangle$$

↳ mettiamo a matrice e troviamo  $\text{rk}=3$   
quindi è lin ind cio vuol dire che è  
una base di  $f$

trovare  $[\pi(+)]_C^B$

$$B = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

$$C = \left\{ \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$C = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$T: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$$

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2x_1 + x_3 \\ 2x_1 + x_2 + x_3 \\ x_2 + 2x_3 \end{pmatrix}$$

relazione alla quale  
facciamo riferimento

Poi risolvere usando queste formule

$$C^{-1} \pi(+)_C^B$$

$$T(b_1) = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$T(b_2) = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$T(b_3) = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$T(b_4) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$[T(b_1)]_C = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}, [T(b_2)]_C = \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix}, [T(b_3)]_C = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 3 \end{pmatrix},$$

$$[T(b_4)]_C = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix},$$

$$[\pi(+)]_C^B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 3 & 4 & 0 \\ 1 & 2 & 3 & 0 \end{pmatrix}$$