

**BARN TRAUMA: FRAKTURER,  
LUXATIONER, BRÄNNSKADA**

**Panodil som smärtstillande (20-25 mg/kg)**

<u>Vikt</u>	<u>Dos</u>
10	1 supp. 250 mg
20 kg	2 supp. 250 mg
30 kg	3 supp. 250 mg
>40 kg	4 supp. 250 mg

**Morfin i.v. som smärtstillande (0,1 mg/kg)**

<u>Vikt</u>	<u>Dos</u>
10 kg	1 mg
20 kg	2 mg
30 kg	3 mg
>40 kg	4 mg Kan upprepas vid behov.

**Voltaren tabl. 25 mg (1-2 mg/kg) alternativt im injektion**

<u>Vikt</u>	<u>Dos</u>
10 kg	1 st - ½ ml
20 kg	1 st - ½ ml
30 kg	1 st - 1 ml
>40 kg	2 st - 1 ml

**Ketanest 5mg/ml (0,25 mg/kg i.v. vid svår smärta)**

<u>Vikt</u>	<u>Dos</u>
10 kg	0,5 ml
20 kg	1 ml Kan upprepas tidigast
30 kg	1,5 ml efter 20 min
>40 kg	2 ml

**Fentanyl 50 ug/ml ( 1,5 ug/kg intranasalt) Kan upprepas  
med halva dosen tidigast efter 15 minuter**

5 kg	0,15 ml
10 kg	0,30 ml
20 kg	0,60 ml
30 kg	0,90 ml