

ANDNINGSHINDER BARN

☐ Epiglottit

Oxygen

Inhalation Adrenalin 1 mg/ml

<u>Vikt</u>	<u>Dos</u>
10 kg	0,5 ml
20 kg	1 ml
30 kg	1,5
≥40	2 ml

Späds med NaCl till 2 ml. Behandlingen kan upprepas vb

☐ Främmande kropp

För detaljer se "Livräddande Första Hjälp Till Barn"

Uppmuntra till att fortsätta hosta

Oxygen

Transport i position som barnet föredrar

Om hostkraften avtar: 5 ryggdunk/brösttryck/buktryck

Om medvetslös: Försök avlägsna främmande föremål

(hjälp av Magills tång el. laryngoskop)

Gör 5 inblåsningar och kolla bröstkorgen

Starta HLR vb (barn A-HLR)

ANDNINGSHINDER BARN

☐ Pseudokrupp

Oxygen

Inhalation Adrenalin 1 mg/ml

<u>Vikt</u>	<u>Dos</u>
10 kg	0,5 ml
20 kg	1 ml
30 kg	1,5 ml
≥40 kg	2 ml

Späds med NaCl till 2 ml. Behandlingen kan upprepas.

Tablett Betapred 0,5 mg. Löses i vatten.

<u>Vikt</u>	<u>Dos</u>
<30 kg	8 tabletter
>30 kg	16 tabletter

Panodil som febernedsättande (20-25mg/kg)

<u>Vikt</u>	<u>Dos</u>
10 kg	1 supp. 250 mg
20 kg	2 supp. 250 mg
30 kg	3 supp. 250 mg
>40 kg	4 supp. 250 mg