

A D R E N A L I N

Katekolamin

Injektionsvätska 0,1 mg/ml och 1 mg/ml

Indikation	Hjärtstopp. Anafylaktisk reaktion. Svår astma. Epiglottit, Pseudokrupp
Dosering	Hjärtstopp: 0,1 mg/ml 10 ml IV/IO Anafylaktisk chock, astma (2:a hand), svår allergisk reaktion: 0,1 mg/ml 1-2 ml långsamt IV eller 1 mg/ml 0,3–0,5 ml SC/IM beroende på svårighetsgrad. Upprepas vb. Vid allergisk/anafylaktisk reaktion, svår astma/obstruktivitet (1:a hand), epiglottit, pseudokrupp kan läkemedlet inhaleras: 1 mg/ml – 2 ml. Behöver ej spädas. Upprepas vid behov
Försiktighet	Allvarlig hjärt- och kärlsjukdom, hyperthyreos, obehandlad hypokalemi
Egenskaper	Stimulerar sympatiska nervsystemet. Ökar myocardkontraktion, höjer blodtryck och puls. Ökar överledningen i hjärtat. Vidgar bronkerna och verkar avsvällande på slemhinnor genom perifer kärlkonstriktion.
Biverkningar	Tremor, huvudvärk, yrsel, oro