

## KETANEST®

**Esketamin** - Snabbverkande analgetikum  
Injektionsvätska 5 mg/ml och 25 mg/ml  
Ampull 5 ml resp 2 ml

<b>Indikation</b>	Svår smärta, framför allt vid trauma och vid samtidig hypovolemi samt procedursmärta.
<b>Dosering</b>	Smärtlindring vuxna och barn <u>Max</u> 0,25 mg/kg IV alt 0,5 mg/kg IM 50kg - 12,5mg - 2,5ml iv alt 25mg im 60kg - 15mg - 3ml iv alt 30mg im 70kg - 17,5mg - 3,5ml iv alt 35mg im 80kg - 20mg - 4ml iv alt 40mg im 90kg - 22,5mg - 4,5ml iv alt 45mg im 100kg - 25mg - 5ml iv alt 50mg im Upprepa tidigast efter 20 min. Första dosen kombineras med Stesolid Novum 5 mg/ml 0,5 ml i.v.
<b>Försiktighet</b>	Hjärtinkompensation och obehandlad hypertoni. Risk för högt intrakraniellt tryck.
<b>Kontraindikation</b>	Eclampsi och preeclampsi
<b>Egenskaper</b>	Smärtstillande effekt utan att negativt påverka cirkulation, respiration eller reflexerna i halsen
<b>Biverkningar</b>	Tachycardi och blodtryckshöjning. Uppvaknandereaktioner. Hallucinationer. Okontrollerat rörelsemönster.