

## M I D A Z O L A M

**Midazolam** – benzodiazepin Inj vätska 5 mg/ml Ampull 3 ml

<b>Indikation</b>	<p>Generella kramper, som förstahandsalternativ.</p> <p>Akut oro och ångesttillstånd hos vuxna</p> <p>I kombination med opioider för att optimera den analgetiska effekten</p>
<b>Dosering</b>	<p><u>Generella kramper</u>: 0,2 mg/kg i.n. fördelat i båda näsborrarna. Max 2 ml. Kan vid behov upprepas med halva dosen efter 5 minuter. Om ej krampfri fortsatt behandling med Diazepam</p> <p><u>Akut oro och ångesttillstånd samt i kombination med opioider</u>: 0,05-0,1 mg/kg i.n.fördelat i båda näsborrarna</p> <p><u>Komplement till analgesi och vid akut oro</u> 0,2 -0,4ml (=1-2 mg) i.v.</p>
<b>Kontraindikation</b>	Inga relevanta på ovan indikationer
<b>Försiktighet</b>	Nedsatt allmäntillstånd. Alkohol och narkotika potentierar effekten Känd mystenia gravis
<b>Egenskaper</b>	Kramplösande, sederande, ångstdämpande, muskelavslappande,
<b>Biverkningar</b>	Risk för andningspåverkan, blodtrycksfall. Beredskap att understödja andning och cirkulation.Smakar illa Brännande smärta i näsan hos vakna patienter vid i.n. bruk.