

ANAFYLAKTISK REAKTION B A R N

Oxygen

Tabl Loratadin 10 mg

<30 kg - 1 tabl ≥30 kg - 2 tabl

Adrenalin 1 mg/ml i.m (eller djupt s.c.)

10kg - 0,1 mg 20kg – 0,2mg 30 kg - 0,3 mg 40kg – 0,4 mg

Ges på lårets utsida. Kan upprepas vid behov

Inhalation Adrenalin 1 mg/ml

<u>Vikt</u>	<u>Dos</u>	
10 kg	0,5 ml	Späds med NaCl till 2 ml
20 kg	1 ml	Behandlingen kan upprepas vb
30 kg	1,5 ml	
>40 kg	2 ml	

Tablett Betapred 0,5 mg. Löses i vatten

<30 kg - 8 tabl >30 kg - 16 tabletter

Betapred 4 mg/ml i.v.

<30 kg - 1 ml >30 kg - 2 ml

Adrenalin 0,1 mg/ml

Intravenös/Intraosseös medicinering vid snabb progress.

FÖRSIKTIGHET!

<u>Vikt</u>	<u>Dos</u>
10 kg	1 ml
20 kg	2 ml
30 kg	3 ml
>40 kg	4 ml

Ringer-Acetat 20mg/kg om hypotoni