

Setul 2

de probleme și exerciții de matematică

(cu privire la șiruri numerice și de funcții și inegalități remarcabile din \mathbb{R})

S2.1 Să se demonstreze Propoziția 2.6 din cursul 2.

S2.2 Fie A o submulțime nevidă a lui \mathbb{R} . Să se arate că $\beta = \inf A$ ($\in \mathbb{R}$) dacă și numai dacă

- (i) $\beta \leq x, \forall x \in A$ și
- (ii) $\forall \epsilon > 0, \exists x_\epsilon \in A$ astfel încât $x_\epsilon < \beta + \epsilon$.

S2.3 Să se stabilească care dintre șirurile cu termenii generali următori este șir Cauchy și care nu este:

- 1) $x_n = \frac{\sin a}{2} + \frac{\sin 2a}{2^2} + \dots + \frac{\sin na}{2^n}, \forall n \in \mathbb{N}^*$ (unde a este un parametru real dat).
- 2) $x_n = 1 + \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{3}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{n}}, \forall n \in \mathbb{N}^*$.

S2.4 (Lema lui O. Stolz) Fie $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathbb{R}$ un șir oarecare, iar $(y_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathbb{R}^*$ un șir monoton și nemărginit. Să se arate că, dacă există

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1} - x_n}{y_{n+1} - y_n}, \text{ în } \overline{\mathbb{R}},$$

atunci există și $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n}$, având loc egalitatea:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1} - x_n}{y_{n+1} - y_n}.$$

S2.5 Să se arate că șirul cu termenul general

$$x_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n} - \ln n, \forall n \in \mathbb{N}^*$$

este convergent în \mathbb{R} (limita sa fiind așa numita constantă a lui Euler, $c = 0,577215... \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$).

S2.6 Să se arate că șirul $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathbb{R}$, unde

$$x_n = 1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \dots + \frac{1}{n^2}, \forall n \in \mathbb{N}^*$$

este convergent (limita sa este egală cu $\frac{\pi^2}{6}$, după cum se poate stabili pe o cale abordabilă ulterior).

S2.7 Să se calculeze următoarele limite

$$\text{a) } \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{(3n)!}{(n!)^3}}; \quad \text{b) } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{n!}}{n}; \quad \text{c) } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{(n+1)(n+2)\dots(n+n)}}{n}.$$

S2.8 Să se determine $L(x_n)$ pentru fiecare din șirurile cu termenul general x_n , unde:

a) $x_n = \frac{(-1)^n}{1 + \frac{1}{n} + e^{\frac{1}{n}}}, n \in \mathbb{N}^*$; b) $x_n = 2 + (-1)^n + \sin \frac{n\pi}{2}, n \in \mathbb{N}$; c) $x_n = \frac{(-1)^n + n \operatorname{tg} \frac{n\pi}{4}}{n}, n \in \mathbb{N}^*$.

S2.9 Fie $(x_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$, cu $x_n > 0, \forall n \in \mathbb{N}^*$. Să se arate că, dacă există $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1}}{x_n}$, în $[0, +\infty] \subset \overline{\mathbb{R}}$, atunci există și $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{x_n}$, având loc egalitatea

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{x_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1}}{x_n}.$$

S2.10 Să se arate că șirul $(x_n)_{n \in \mathbb{N}^*} \subset \mathbb{R}$, definit prin $x_1 = 1$ și

$$x_{n+1} = \left(1 - \frac{1}{3n^2}\right) x_n, \forall n \in \mathbb{N}^*,$$

este convergent și să i se afle limita.

S2.11 Să se calculeze următoarele limite

a) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + \sqrt{2} + \sqrt[3]{3} + \dots + \sqrt[n]{n}}{n}$;

b) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\sin \frac{\pi}{2} \cdot \sin \frac{\pi}{3} \cdot \dots \cdot \sin \frac{\pi}{n}}$;

c) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{(-1)^n}{n}\right)^{\frac{1}{\sin(\pi\sqrt{1+n^2})}}.$

S2.12 Să se găsească $L(x_n)$ pentru șirul $(x_n)_{n \in \mathbb{N}^*} \subset \mathbb{R}$, unde

$$x_n = [1 + (-1)^n] \cdot n^{(-1)^n} + \cos \frac{n\pi}{6}, \forall n \in \mathbb{N}^*.$$

S2.12 Să se studieze convergența punctuală și uniformă a următoarelor șiruri de funcții:

a) $(f_n)_{n \in \mathbb{N}^*}, f_n : (0, 1) \rightarrow \mathbb{R}, f_n(x) = \frac{1}{nx + 1}$; b) $(f_n)_{n \in \mathbb{N}^*}, f_n : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}, f_n(x) = nx(1 - x)^n$;

c) $(f_n)_{n \in \mathbb{N}^*}, f_n : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f_n(x) = \sqrt{\frac{n^2 x^2 + 1}{n^2}}$; d) $(f_n)_{n \in \mathbb{N}^*}, f_n : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f_n(x) = \operatorname{arctg} \frac{x}{1 + n(n+1)x^2}$;

e) $(f_n)_{n \in \mathbb{N}^*}, f_n : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f_n(x) = \left(|\sin x|^n + |\cos x|^n + \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^n\right)^{1/n}$;

f) $(f_n)_{n \in \mathbb{N}^*}, f_n : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f_n(x) = \frac{\sin(nx + 3)}{\sqrt{n+1}}$; g) $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}, f_n : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}, f_n(x) = n^2 x^2 e^{-n^2 x^2}$.

S2.13 Ce se poate spune despre convergența uniformă a următoarelor șiruri de funcții?

a) $(f_n)_{n \in \mathbb{N}^*}, f_n : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f_n(x) = \frac{n - (x-1)e^{nx}}{e^{nx} + n}$; b) $(f_n)_{n \in \mathbb{N}^*}, f_n : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f_n(x) = \sum_{k=1}^n \frac{\cos kx}{k(k+1)}$;

c) $(f_n)_{n \in \mathbb{N}^*}, f_n : (1, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}, f_n(x) = \sqrt{(n^2 + 1) \sin^2 \frac{\pi}{n} + nx - \sqrt{nx}}$.

S2.14 Să se demonstreze inegalitatea lui Hölder:

$$\sum_{k=1}^n |a_k| |b_k| \leq \left(\sum_{k=1}^n |a_k|^p \right)^{1/p} \cdot \left(\sum_{k=1}^n |b_k|^q \right)^{1/q}$$

pentru orice $a_1, a_2, \dots, a_n, b_1, b_2, \dots, b_n \in \mathbb{R}$, $n \in \mathbb{N}^*$, și orice $p, q \in (1, +\infty)$ astfel încât $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$.

S2.15 Să se arate că, pentru orice $a_1, a_2, \dots, a_n, b_1, b_2, \dots, b_n \in \mathbb{R}$ și $p \geq 1$, are loc inegalitatea lui Minkowski

$$\left(\sum_{k=1}^n |a_k + b_k|^p \right)^{1/p} \leq \left(\sum_{k=1}^n |a_k|^p \right)^{1/p} + \left(\sum_{k=1}^n |b_k|^p \right)^{1/p}.$$

S2.16 (*Inegalitatea generalizată a mediilor*) Să se arate că pentru orice $x_1, x_2, \dots, x_n \in \mathbb{R}_+^*$, $t_1, t_2, \dots, t_n \in [0, 1]$ cu $t_1 + t_2 + \dots + t_n = 1$, avem

$$x_1^{t_1} \cdot x_2^{t_2} \cdot \dots \cdot x_n^{t_n} \leq t_1 x_1 + t_2 x_2 + \dots + t_n x_n.$$

S2.17 (*Inegalitatea lui Carleman*) Să se demonstreze că, pentru orice $n \in \mathbb{N}^*$ și $a_1, a_2, \dots, a_n \in \mathbb{R}_+$, are loc inegalitatea

$$\sum_{k=1}^n (a_1 \cdot a_2 \cdot \dots \cdot a_k)^{1/k} \leq e \sum_{k=1}^n a_k,$$

unde e este un coeficient optimal când $n \rightarrow \infty$. Egalitatea are loc dacă și numai dacă $a_1 = a_2 = \dots = a_n = 0$.

S2.18 (*Inegalitatea lui Titu Andreescu*) Să se arate că, pentru orice $n \in \mathbb{N}^*$, $a_1, a_2, \dots, a_n \in \mathbb{R}_+^*$ și $x_1, x_2, \dots, x_n \in \mathbb{R}$, are loc

$$\frac{x_1^2}{a_1} + \frac{x_2^2}{a_2} + \dots + \frac{x_n^2}{a_n} \geq \frac{(x_1 + x_2 + \dots + x_n)^2}{a_1 + a_2 + \dots + a_n}.$$

S2.19 Să se demonstreze că, pentru orice $n \in \mathbb{N}^*$ și $a_1, a_2, \dots, a_n \in \mathbb{R}_+^*$, avem

$$\min(a_1, a_2, \dots, a_n) \leq \sqrt[n]{a_1 \cdot a_2 \cdot \dots \cdot a_n} \leq \frac{\sum_{k=1}^n a_k}{n} \leq \left(\frac{\sum_{k=1}^n a_k^2}{n} \right)^{1/2} \leq \max(a_1, a_2, \dots, a_n).$$

Bibliografie selectivă

1. Anca Precupanu - *Bazele analizei matematice*, (§1.5), ediția a III-a, Ed. Polirom, Iași, 1998.
2. W. J. Kaczor, M. T. Nowak - *Problems in Mathematical Analysis. Real numbers, sequences, series*, Student Mathematical Library, vol. 4, AMS Publ., 2000.
3. E. Popescu - *Analiză matematică. Calcul diferențial*, Ed. Matrix Rom, București, 2006.
4. V. Postolică - *Eficiență prin matematica aplicată*, Ed. Matrix Rom, București, 2006.
5. C. Drăgușin, O. Olteanu, M. Gavrilă - *Analiză matematică. Probleme (Vol. I)*, Ed. Matrix Rom, București, 2006.
6. N. Cotfas, L. A. Cotfas - *Elemente de analiză matematică*, Ed. Universit. din București, 2010.
7. W. Anscombe - *Cauchy Sequences: Cauchy's Criterion as a useful test for convergence*, University of Leeds, United Kingdom, 2013.
8. L. Fehér, G. Kós, Á. Tóth - *Mathematical Analysis. Problems and Exercises-II*, Eötvös Loránd University, Faculty of Science, Typotex, 2014.