

Геометрия и топология. Факты 2 сем.

Кабашный Иван (@keba4ok)

(по материалам лекций Фоминых Е. А.,
практик, а также других источников)

26 марта 2021 г.

Основные (по моему мнению) факты по топологии.

Содержание

1	Аффинные пространства.	3
1.1	Начальные определения и свойства.	3
1.2	Материальные точки.	3
1.3	Аффинные подпространства и оболочки.	3

1 Аффинные пространства.

1.1 Начальные определения и свойства.

Определение 1. *Аффинное пространство* - тройка $(X, \vec{X}, +)$, состоящая из непустого множества *точек*, векторного пространства над \mathbb{R} (*присоединённое*) и операцией $+$: $X \times \vec{X} \rightarrow X$ откладывания вектора.

Налагаемые условия - для любых точек $x, y \in X$ существует единственный вектор $v \in \vec{X}$ такой, что $x + v = y$ (\vec{xy}), а также ассоциативность откладывания вектора.

Определение 2. *Начало отсчёта* аффинного пространства - произвольная фиксированная точка $o \in X$.

Лемма 1. *Начало отсчёта* $o \in X$ задаёт биекцию $\varphi_o : X \rightarrow \vec{X}$ по правилу:

$$\varphi_o(x) = \vec{ox} \quad \forall x \in X.$$

Такая биекция называется *векторизацией аффинного пространства*.

Определение 3. *Линейная комбинация* $\sum t_i p_i$ точек с коэффициентами относительно начала отсчёта $o \in X$ - вектор $v = \sum t_i \vec{op_i}$, или точка $p = o + v$. Комбинация называется *барицентрической*, если сумма коэффициентов равна единице, и *сбалансированной*, если сумма коэффициентов равна нулю.

Теорема 1. *Барицентрическая комбинация точек - точка, не зависящая от начала отсчёта. Сбалансированная комбинация точек - вектор, не зависящий от начала отсчёта.*

1.2 Материальные точки.

Определение 4. Пусть x — некоторая точка аффинного пространства и m — ненулевое число. *Материальной точкой* (x, m) называется пара: точка x с вещественным числом m , причем число m называется *массой* материальной точки (x, m) , а точка x — носителем этой материальной точки.

Определение 5. *Центром масс* системы материальных точек (x_i, m_i) называется такая точка z (притом единственная), для которой имеет место равенство

$$m_1 \cdot z\vec{x}_1 + \dots + m_n \cdot z\vec{x}_n = 0.$$

1.3 Аффинные подпространства и оболочки.

Определение 6. Множество $Y \subset X$ - *аффинное подпространство*, если существуют такие линейное подпространство $V \subset \vec{X}$ и точка $p \in Y$, что $Y = p + V$. V называется *направлением* Y . Определение подпространства не зависит от выбора точки в нём.

Определение 7. *Размерность* $\dim X$ аффинного пространства есть размерность его присоединённого векторного пространства.

Определение 8. *Параллельный перенос* на вектор $v \in \vec{X}$ - отображение $T_v : X \rightarrow X$, заданное равенством $T_v(x) = x + v$.

Определение 9. Аффинные подпространства одинаковой размерности *параллельны*, если их направления совпадают.

Определение 10. *Прямая* - аффинное подпространство размерности 1, *гиперплоскость* в X - аффинное подпространство размерности $\sim X - 1$.

Утверждение 1. Две различные гиперплоскости не пересекаются тогда и только тогда, когда они параллельны.

Определение 11. *Суммой аффинных подпространств* называется наименьшее аффинное подпространство, их содержащее.

Теорема 2. *Пересечение любого набора аффинных подпространств - либо пустое множество, либо аффинное подпространство.*

Определение 12. *Аффинная оболочка* $\text{Aff } A$ непустого множества $A \subset X$ - пересечение всех аффинных подпространств, содержащих A . Как следствие, это - наименьшее аффинное подпространство, содержащее A .

Теорема 3. $\text{Aff}(A)$ - множество всех барицентрических комбинаций точек из A .

Определение 13. Точки p_1, \dots, p_k *аффинно зависимы*, если существуют такие коэффициенты $t_i \in \mathbb{R}$, не все равные нулю, что $\sum t_i = 0$ и $\sum t_i p_i = 0$. Если такой комбинации нет, то точки *аффинно независимы*.

Теорема 4. *(Переформулировки аффинной независимости.) Для $p_1, \dots, p_k \in X$ следующие свойства эквивалентны:*

- они аффинно независимы;
- векторы $p_1 p_i$, $i \in \{2, 3, \dots, k\}$, линейно независимы;
- $\dim \text{Aff}(p_1, \dots, p_k) = k - 1$;
- каждая точка из $\text{Aff}(p_1, \dots, p_k)$ единственным образом представляется в виде барицентрической комбинации p_i .