

# Геометрия и топология. Факты 2 сем.

Кабашный Иван (@keba4ok)

(по материалам лекций Фоминых Е. А.,  
практик, а также других источников)

26 марта 2021 г.

Основные (по моему мнению) факты по топологии.

## Содержание

<b>1</b>	<b>Аффинные пространства.</b>	<b>3</b>
1.1	Начальные определения и свойства. . . . .	3
1.2	Материальные точки. . . . .	3
1.3	Аффинные подпространства и оболочки. . . . .	3
1.4	Базисы и отображения. . . . .	4
<b>2</b>	<b>Проективные пространства.</b>	<b>5</b>
2.1	Начальные определения и свойства. . . . .	5
<b>3</b>	<b>Указатель.</b>	<b>7</b>

# 1 Аффинные пространства.

## 1.1 Начальные определения и свойства.

**Определение 1.** *Аффинное пространство* - тройка  $(X, \vec{X}, +)$ , состоящая из непустого множества *точек*, векторного пространства над  $\mathbb{R}$  (*присоединённое*) и операцией  $+$  :  $X \times \vec{X} \rightarrow X$  *откладывания вектора*.

Налагаемые условия - для любых точек  $x, y \in X$  существует единственный вектор  $v \in \vec{X}$  такой, что  $x + v = y$  ( $\vec{xy}$ ), а также ассоциативность откладывания вектора.

**Определение 2.** *Начало отсчёта* аффинного пространства - произвольная фиксированная точка  $o \in X$ .

**Лемма 1.** *Начало отсчёта*  $o \in X$  задаёт биекцию  $\varphi_o : X \rightarrow \vec{X}$  по правилу:

$$\varphi_o(x) = \vec{ox} \quad \forall x \in X.$$

Такая биекция называется *векторизацией* аффинного пространства.

**Определение 3.** *Линейная комбинация*  $\sum t_i p_i$  точек с коэффициентами относительно начала отсчёта  $o \in X$  - вектор  $v = \sum t_i \vec{op_i}$ , или точка  $p = o + v$ . Комбинация называется *барицентрической*, если сумма коэффициентов равна единице, и *сбалансированной*, если сумма коэффициентов равна нулю.

**Теорема 1.** *Барицентрическая комбинация точек - точка, не зависящая от начала отсчёта. Сбалансированная комбинация точек - вектор, не зависящий от начала отсчёта.*

## 1.2 Материальные точки.

**Определение 4.** Пусть  $x$  — некоторая точка аффинного пространства и  $m$  — ненулевое число. *Материальной точкой*  $(x, m)$  называется пара: точка  $x$  с вещественным числом  $m$ , причем число  $m$  называется *массой* материальной точки  $(x, m)$ , а точка  $x$  — носителем этой материальной точки.

**Определение 5.** *Центром масс* системы материальных точек  $(x_i, m_i)$  называется такая точка  $z$  (притом единственная), для которой имеет место равенство

$$m_1 \cdot z\vec{x}_1 + \dots + m_n \cdot z\vec{x}_n = 0.$$

## 1.3 Аффинные подпространства и оболочки.

**Определение 6.** Множество  $Y \subset X$  - *аффинное подпространство*, если существуют такие линейное подпространство  $V \subset \vec{X}$  и точка  $p \in Y$ , что  $Y = p + V$ .  $V$  называется *направлением*  $Y$ . Определение подпространства не зависит от выбора точки в нём.

**Определение 7.** *Размерность*  $\dim X$  аффинного пространства есть размерность его присоединённого векторного пространства.

**Определение 8.** *Параллельный перенос* на вектор  $v \in \vec{X}$  - отображение  $T_v : X \rightarrow X$ , заданное равенством  $T_v(x) = x + v$ .

**Определение 9.** Аффинные подпространства одинаковой размерности *параллельны*, если их направления совпадают.

**Определение 10.** *Прямая* - аффинное подпространство размерности 1, *гиперплоскость* в  $X$  - аффинное подпространство размерности  $\sim X - 1$ .

*Утверждение 1.* Две различные гиперплоскости не пересекаются тогда и только тогда, когда они параллельны.

**Определение 11.** *Суммой аффинных подпространств* называется наименьшее аффинное подпространство, их содержащее.

**Теорема 2.** Пересечение любого набора аффинных подпространств - либо пустое множество, либо аффинное подпространство.

**Определение 12.** *Аффинная оболочка*  $\text{Aff } A$  непустого множества  $A \subset X$  - пересечение всех аффинных подпространств, содержащих  $A$ . Как следствие, это - наименьшее аффинное подпространство, содержащее  $A$ .

**Теорема 3.**  $\text{Aff}(A)$  - множество всех барицентрических комбинаций точек из  $A$ .

**Определение 13.** Точки  $p_1, \dots, p_k$  *аффинно зависимы*, если существуют такие коэффициенты  $t_i \in \mathbb{R}$ , не все равные нулю, что  $\sum t_i = 0$  и  $\sum t_i p_i = 0$ . Если такой комбинации нет, то точки *аффинно независимы*.

**Теорема 4.** (Переформулировки аффинной независимости.) Для  $p_1, \dots, p_k \in X$  следующие свойства эквивалентны:

- они аффинно независимы;
- векторы  $p_1 p_i$ ,  $i \in \{2, 3, \dots, k\}$ , линейно независимы;
- $\dim \text{Aff}(p_1, \dots, p_k) = k - 1$ ;
- каждая точка из  $\text{Aff}(p_1, \dots, p_k)$  единственным образом представляется в виде барицентрической комбинации  $p_i$ .

## 1.4 Базисы и отображения.

**Определение 14.** *Аффинный базис* - набор  $n + 1$  точке в  $X$ , пространстве размерности  $n$ , являющийся аффинно независимым. Или же, это - точке  $o \in X$  и базис  $e_0, \dots, e_n$  пространства  $\vec{X}$ .

**Определение 15.** Каждая точка однозначно записывается в виде барицентрической комбинации  $\sum_{i=0}^n t_i e_i$ , а числа  $t_i$  называют *барицентрическими координатами* этой точки.

**Определение 16.** (Говно-определение). Отображение  $F : X \rightarrow Y$  называется *аффинным*, если отображение  $\tilde{F}_p$  линейно для некоторой точки  $p \in X$ . Отображение  $\tilde{F}_p : \vec{X} \rightarrow \vec{Y}$  индуцируется из любого отображения  $F : X \rightarrow Y$  посредством формулы  $\forall v \in \vec{X} \quad \tilde{F}_p(v) = \overrightarrow{F(p)F(q)}$ , где  $q = p + v$ .

**Определение 17.** Отображение  $\tilde{F}$  называется *линейной частью* аффинного отображения  $F$ .

**Определение 18.** (Нормальное определение.) Отображение  $F : X \rightarrow Y$  называется *аффинным*, если существует такое линейное  $L : \vec{X} \rightarrow \vec{Y}$ , что для любых  $q, p \in X$ ,  $\overrightarrow{F(p)F(q)} = L(\vec{pq})$ .

**Теорема 5.** Пусть  $x \in X$ ,  $y \in Y$ ,  $L : \vec{X} \rightarrow \vec{Y}$  линейно. Тогда существует единственное аффинное отображение  $F : X \rightarrow Y$  такое, что  $\tilde{F} = L$  и  $F(x) = y$ .

**Лемма 2.** Пусть  $p_1, \dots, p_n$  - аффинно независимые точки в аффинном пространстве  $X$ ,  $q_1, \dots, q_n$  - точки в аффинном пространстве  $Y$ . Тогда существует такое аффинное отображение  $F : X \rightarrow Y$ , что  $F(p_i) = q_i \forall i$ . Кроме того, если  $\dim X = n - 1$ , то такое отображение единственно.

**Лемма 3.** Аффинное отображение сохраняет барицентрические комбинации.

**Лемма 4.** Композиция аффинных отображений - аффинное отображение. При этом линейная часть композиции - композиция линейных частей.

**Утверждение 2.** Образ и прообраз аффинного подпространства - аффинное подпространство. Образы (прообразы) параллельных подпространств параллельны.

**Теорема 6.** Параллельный перенос - аффинное отображение, его линейная часть тождественна. Верно также и обратное.

**Определение 19.** Аффинное отображение  $F : X \rightarrow X$  такое, что  $\tilde{F} = k \text{id}$  для некоторого  $k \in \mathbb{R} \setminus \{0, 1\}$ , называется *гомотетией*, а  $k$  называют *коэффициентом растяжения* гомотетии  $F$ . Такое отображение имеет ровно одну неподвижную точку, называемую центром.

**Теорема 7.** (*Основная теорема аффинной геометрии.*) Пусть  $X, Y$  - аффинные пространства,  $\dim X \geq 2$ . Пусть  $F : X \rightarrow Y$  - инъективное отображение, и для любой прямой  $l \subset X$  её образ  $F(l)$  - тоже прямая. Тогда  $F$  - аффинное отображение.

## 2 Проективные пространства.

### 2.1 Начальные определения и свойства.

**Определение 20.** Пусть  $V$  - векторное пространство над полем  $K$ . На множестве  $V \setminus \{0\}$  введём отношение эквивалентности

$$x \sim y \iff \exists \lambda \in K : x = \lambda y.$$

Тогда фактор  $V$  по этому отношению называют *проективным пространством*  $(\mathbb{P}(V))$ , порождённым векторным  $V$ . Само отображение из векторного пространства в соответствующее проективное называют *проективизацией*.

**Примечание 1.** *Размерность*  $\mathbb{P}(V)$  по определению равна  $\dim V - 1$ .

**Теорема 8.** Пусть  $Y, Z \subset X$  - подпространства,  $\dim Y + \dim Z \geq \dim X$ , тогда

- $Y \cap Z \neq \emptyset$ ;
- $Y \cap Z$  - подпространство;
- $\dim(Y \cap Z) \geq \dim Y + \dim Z - \dim X$ .

**Определение 21.** Пусть  $W$  - непустое векторное подпространство  $V$ . Тогда  $\mathbb{P}(W)$  называется *проективным подпространством*  $\mathbb{P}(V)$ .

**Определение 22.** Пусть  $X = \mathbb{P}(V)$  - проективное пространство размерности  $n$ . Числа  $x_0, x_1, \dots, x_n$ , являющиеся координатами вектора  $v$ , порождающего  $p \in \mathbb{P}(V)$ , называются *однородными координатами*.

**Определение 23.**  $\hat{X} = \mathbb{P}(V)$  - *проективное пополнение* аффинного пространства  $X$ , а множество  $X_\infty = \mathbb{P}(\vec{X} \times 0) \subset \hat{X}$  - *бесконечно удалённые точки*. Также, множество этих точек есть гиперплоскость в  $\hat{X}$ , которая называется *бесконечно удалённой гиперплоскостью*.

**Определение 24.** Пусть  $V$  - векторное пространство,  $W \subset V$  - линейная гиперплоскость,  $X$  - гиперплоскость ей параллельная. Тогда биекцию  $\mathbb{P}(V) \setminus \mathbb{P}(W) \rightarrow X$  называют *картой* пространства  $\mathbb{P}(V)$ .

**Определение 25.** Пусть на  $\mathbb{R}p^1$  (прямая с бесконечно удалённой точкой) выбрана аффинная система координат, в которой  $A = a$ ,  $B = b$ ,  $C = c$  и  $D = d$ . Определим *двойное отношение* четвёрки точек  $(A, B, C, D)$  формулой

$$[A, B, C, D] = \frac{a - c}{a - d} \cdot \frac{b - c}{b - d}.$$

*Утверждение 3.* Данное определение инвариантно относительно выбора карты, а само отношение сохраняется при проективных преобразованиях.

### 3 Указатель.

Он самый.

аффинный базис	материальная точка
аффинная зависимость	направление аффинного $\pi/\pi$
аффинная независимость	начало отсчёта (ап)
аффинная оболочка	однородные координаты
аффинное отображение(1)	основная теорема аг
аффинное отображение(2)	откладывание вектора
аффинное подпространство	параллельные (ап/ $\pi$ )
аффинное пространство	параллельный перенос
барицентрическая лк	присоединённое (вп)
барицентрические координаты	проективизация
бесконечно удалённые точки	проективное подпространство
бесконечно удалённая гп	проективное пополнение
векторизация (ап)	проективное пространство
гиперплоскость	прямая
гомотетия	размерность (ап)
двойное отношение	размерность (пп)
карта	сбалансированная лк
коэффициент растяжения	сумма (ап/ $\pi$ )
линейная комбинация	точка
линейная часть (ао)	центр масс
масса	