

Алгебра. Конспект 2 сем.

Мастера Конспектов

(по материалам лекций В. А. Петрова,
а также других источников)

12 февраля 2021 г.

Некоторые записи по алгебре.

Содержание

1	Лекция 30.	3
2	Лекция 31.	6
3	Лекция 32.	8

1 Лекция 30.

Пусть R - кольцо главных идеалов, а M - конечно порождённый R -модуль (левый).

$$m_1, \dots, m_n \in M, \quad M = \left\{ \sum r_i m_i \mid r_i \in R \right\}$$

Пусть $\varphi : R^n \rightarrow M$ - функция, которая действует по правилу $e_i \mapsto m_i$ (базисные элементы R^n (именно тривиального базиса) в элементы m_i).

Тогда ядро $\text{Ker } \varphi \leq R^n$ - подмодуль. Причём равен он $\{(r_i) \mid \sum r_i m_i = 0\}$ - соотношения (линейные) между m_i . А также он есть *свободный* модуль R^k , $k \leq n$.

$$\text{Ker } \varphi = R^k, \quad R^k \leq R^n$$

$$\psi : R^k \rightarrow R^n$$

Подходящей заменой базиса в R^k и R^n можно добиться того, чтобы ψ стала диагональной матрицей (с нижними нулевыми строками, естественно) и числами $d_1 \mid d_2 \mid \dots \mid d_k$ на диагонали.

Тогда $M \cong R^{n-k} \oplus R/(d_1) \oplus \dots \oplus R/(d_k)$ (это планируется доказывать, но перед этим нужно ввести несколько определений).

Определение 1. Пусть R кольцо (не обязательно коммутативное), тогда M - *циклический*, если он порождён одним элементом ($M = \{rm \mid r \in R\}$).

Пусть $\theta : R \rightarrow M$ - гомоморфизм R -модулей, действующий по правилу $r \mapsto rm$, он сюръективен и $M \simeq R/\text{Ker } \theta$ по теореме о гомоморфизме.

$$\text{Ker } \theta = \{r \in R \mid rm = 0\} \leq R,$$

что также является левым идеалом.

А если R - область главных идеалов, то циклический модуль выглядит как $R/(d)$. Если $d = 0$, то R - свободный модуль ранга 1, а если он не равен нулю, то это есть *модуль кручения* $\forall x \in M \quad dx = 0$.

Теорема 1. Конечнопорождённый модуль над областью главных идеалов - конечная прямая сумма циклических модулей.

Была доказана в прошлом семестре (не у нас). Однако мы можем сформулировать следствие:

Следствие 1. Конечнопорождённая абелева группа - конечная прямая сумма циклических групп.

Пусть R - область, M - R -модуль, тогда подмодуль кручения -

$$\text{Tors}(M) = \{m \in M \mid \exists r \neq 0, \quad rm = 0\}$$

Утверждение 1. $\text{Tors}(M)$ - подмодуль в M .

Нужно выполнить проверку этого утверждения, но для этого достаточно проверить, что всё хорошо с нулём (он там лежит и $1 \cdot 0 = 0$), а затем несколько свойств:

$$m_1, m_2 \in \text{Tors}(M), \quad r_1, r_2 \neq 0, \quad r_1 m_1 = r_2 m_2 = 0,$$

тогда

$$r_1 r_2 (m_1 + m_2) = 0, \quad r_1 r_2 \neq 0,$$

а также, если

$$m \in \text{Tors}(M), s \in R, rm = 0 \Rightarrow r(sm) = rsm = s(rm) = 0.$$

Пусть $r \in R, r \neq 0, M[r] := \{m \in M : rm = 0\} \leq M$ - подмодуль, p - пргстой элемент R . Рассмотрим $M[p] \leq M[p^2] \leq M[p^3] \leq \dots$ - получили цепочку вложенных модулей.

$M_p := \bigcup_{i \geq 1} M[p^i]$ - подмодуль, p -кручение в M .

Сейчас начнётся пиздец. Наша цель: доказать, что $\text{Tors}(M) \cong \bigoplus_{p-\text{простое}} M_p$.

N_i - модули $i \in I, \bigoplus := \{(n_i)_{i \in I} | n_i \in N_i, \text{ почти все } n_i = 0\}$, операции покомпонентные. Это, получается, (бесконечная) прямая сумма модулей.

Теорема 2. (О примарном разложении). Пусть R - область главных идеалов, M - R -модуль. Тогда $\bigoplus M_p \rightarrow \text{Tors}(M)$, действующий по правилу $(m_p) \mapsto \sum m_p$ (конечная сумма) - изоморфизм модулей.

Доказательство. Докажем всё по порядку:

- Докажем, что это гомоморфизм. $(m_p + n_p) \mapsto \sum m_p + n_p = \sum m_p + \sum n_p$, а также $(rm_p) \mapsto \sum rm_p = r(\sum m_p)$.
- Теперь нужно доказать сюръективность. $m \in \text{Tors}(m), rm = 0, r = \prod_{i=1}^n p_i^{\alpha_i}$, где p_i - простое. Рассмотрим линейное разложение НОД:

$$r_1 p_2^{\alpha_2} \dots p_n^{\alpha_n} + \dots + r_n p_1^{\alpha_1} \dots p_{n-1}^{\alpha_{n-1}} = 1.$$

Тогда если мы домножим равенство на m , получим, что $r_i = \frac{rm}{p_i^{\alpha_i}} \in M_{p_i}$, тогда получили, что $(r_1 p_2^{\alpha_2} \dots p_n^{\alpha_n} m, \dots, r_n p_1^{\alpha_1} \dots p_{n-1}^{\alpha_{n-1}} m) \mapsto m$.

- Осталась инъективность. Пусть $0 \neq (m_p) \mapsto 0$, возьмём наименьшее число индексов, что $\sum m_p = 0$. А теперь начнём его уменьшать. Пусть у нас есть $p_1, \dots, p_n, p_i^{\alpha_i} m_{p_i} = 0$. Всё домножим на $p_n^{\alpha_n}$, получим $\sum p_n^{\alpha_n} m_p = 0$. Тогда раньше было $m_{p_n} \neq 0$, а теперь $p_n^{\alpha_n} m_{p_n} = 0$. Докажем, что ничего, кроме последнего не обнулилось. Предположим противное, $p_1^{\alpha_1} m_1 = 0, p_n^{\alpha_n} m_1 = 0$, но $p_1^{\alpha_1}, p_n^{\alpha_n}$ - взаимно просты, тогда есть линейное разложение $r_1 p_1^{\alpha_1} + r_n p_n^{\alpha_n} = 1$, домножим на m , получим $r_1 p_1^{\alpha_1} m_1 + r_n p_n^{\alpha_n} m_1 = m_1$, но оба они не могут быть равны нулю.

□

Сейчас будем заниматься в основном кольцом многочленов. Пусть $R = F[t]$, F - поле, V - R -модуль. В частности, V - F -модуль, то векторное пространство $A : v \mapsto tv$ - F -линейное отображение $V \rightarrow V$ оператор. Линейные операторы образуют кольцо (сумма - поточечно, умножение - композиция). $A(v)$ или Av .

$$(a_0 + a_1 t + \dots + a_n t^n) V = a_0 v + a_1 Av + \dots + a_n A^n v$$

V - векторное пространство с оператором, значит, $F[t]$ - модуль.

Пусть a - матрица $n \times n, F^n \rightarrow F^n, F[t]$ - модуль на F^n . $F[t]$ - как модуль над собой векторное пространство со счётным базисом.

Утверждение 2. Пусть V возьмём конечнопорождённый модуль над $F[t]$, тогда V - конечномерное векторное пространство над F тогда и только тогда, когда $V = \text{Tors}(V)$ (как $F[t]$ -модуль).

Доказательство. $F[t]^n \oplus F[t]/(f_i) \oplus \dots \oplus F[t]/(f_k)$, где $f_i \neq 0$. Если $n \neq 0$, то в V есть бесконечномерное подпространство $F[t]$. Если $n = 0$, то $\dim_F F[t]/(f_i) = \deg f_i < \infty$. \square

Теперь рассмотрим матрицы. Пусть $\dim V = n$, $A : V \rightarrow V$. Если зафиксировать базис в V , получается матрица a $n \times n$. Взяли другой базис, получим матрицу перехода c . $V \rightarrow V$ посредством A , причём стороны соответственно изоморфны вот таким вещам (по центру, я не умею так круто чертить, загляните в лекцию) $F^n \xrightarrow{c^{-1}} F^n \xrightarrow{a} F^n \xrightarrow{c} F^n$. И, кстати, $a \sim c^{-1}ac$ (сопряжённая матрица).

Рассмотрим модуль $F[t]/(f)$, что также есть V , A . Поймём, что такое f . Он обладает таким свойством: $(f) = \text{Ker}(F[t \rightarrow F[t]/(f)]) = \{g(t) \mid g(t) \cdot v = 0 \forall v \in V\}$. Однако последнее равенство неочевидно. По определению там может быть написано $\{g(t) \mid g(t) \cdot [1] = 0\}$, но $[h(t)] = h(t) \cdot 1$, поэтому он обнуляется $g(t) : g(t) \cdot [h(t)] = h(t) \cdot g(t) \cdot [1] = 0$, откуда и получаем искомое.

Давайте теперь запишем это в терминах оператора. Если

$$g(t) = a_0 + a_1 t + \dots + a_k t^k,$$

тогда

$$g(t) \cdot v = a_0 v + a_1 A v + \dots + a_k A^k v.$$

Каждый раз писать такие длинные вещи неудобно, поэтому введём следующее обозначение:

$$g(A) := a_0 v + a_1 A + \dots + a_k A^k.$$

В силу того, что A коммутирует с собой, то такая запись корректна. Тогда мы можем переписать:

$$\{g(t) \mid g(t) \cdot v = 0 \forall v \in V\} = \{g(t) \mid g(A)v = 0 \forall v \in V\},$$

но если последнее выполнено для любого $v \in V$, то получаем, что оператор - тождественный нуль, получаем $\{g(t) \mid g(A) = 0\}$.

Также можно пойти и в обратную сторону, то есть, пусть мы знаем A , рассмотрим $\{g(t) \mid g(A) = 0\}$. Это - идеал в $F[t]$, скажем, что это $(f(t))$, тогда $f(t)$ мы будем называть *минимальным многочленом* оператора A . Можно заметить, что минимальный многочлен не равен нулю, если у нас имеется конечномерное пространство, не может быть такого, что никакой многочлен A не обнуляет. Покажем это.

Найдём некую линейную зависимость между степенями A . Рассмотрим Id, A, A^2, \dots - элементы кольца операторов. Рассмотрим это кольцо как векторное пространство над F . Если $\dim V = n$, то у полученного пространства размерность есть n^2 , то есть, конечна. Поэтому бесконечной линейно независимой системы быть не может, тогда когда-то мы получим линейную зависимость:

$$a_0 + a_1 A + \dots + a_k A^k = 0,$$

тогда отсюда мы и нашли требуемый многочлен.

2 Лекция 31.

Начинаем опять с оператора. Рассматриваем векторное пространство V над каким-то полем F и мы действуем на него оператором $A : V \rightarrow V$. Мы его также рассматривали как $F[t]$ -модуль, $t \cdot v = Av$. Мы определили минимальный многочлен A такой, что $\{g(t) \in F[t] \mid g(A) = 0\} \triangleleft F[t]$, причём $F[t] = (f(t))$ - идеал унитарного (нуо) многочлена. Такой $f(t)$ и называется минимальным многочленом.

Теперь немного понятнее на языке модулей. Рассмотрим $V - F[t]$ -модуль, а также $\text{Ann}(V) := \{r \in V \mid rv = 0, \forall v \in V\}$. Это - идеал в R , причём даже двусторонний (можно будет потом записать проверку). Причём получаем, что $\text{Ann}(V) = (f(t))$, легко заметить, что они совпадают.

$g(A)v = 0$, но тогда

$$g = a_0 + a_1 t + \dots + a_k t^k$$

$$g = a_0 + a_1 Av + \dots + a_k A^k v = 0,$$

что также и равно $g(t) \cdot v$. Тогда $f(A)v = g(t) \cdot v$ как оператор и из структуры модуля соответственно. Тогда $g(A) = 0 \Leftrightarrow g(A) \cdot v = 0$ для любого $v \in V \Leftrightarrow g(t) \cdot v = 0 \forall v \in V \Leftrightarrow g(t) \in \text{Ann}(v)$.

Мы уже начинали рассматривать такой модуль: $F[t]/(f(t)) - F[t]$ -модуль, имеем также V , $Av = t \cdot v$. Мы хотим придумать базис V , в котором матрица A имеет простой вид. Возьмём такой базис: $[1], [t], \dots, [t^{k-1}]$, тогда $[t^k] = -a_0[1] - \dots - a_{k-1}[t^{k-1}]$. Как выглядит матрица A в этом базисе?

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & \dots & 0 & -a_0 \\ 1 & 0 & \dots & 0 & -a_1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \dots & 0 & -a_{k-2} \\ 0 & 0 & \dots & 1 & -a_{k-1} \end{pmatrix}$$

Такая матрица называется *фробениусовой клеткой*. А вообще, в итоге мы получили, что если V - циклический $F[t]$ -модуль, то A в некотором базисе записывается фробениусовой клеткой, причём последним столбцом будут коэффициенты минимального многочлена, только со знаком "минус".

А если модуль не циклический (произвольный и с конечномерным V), то мы можем его разложить в сумму циклических:

$$F[t]/(f_1(t)) \oplus F[t]/(f_2(t)) \oplus \dots \oplus F[t]/(f_m(t)),$$

причём мы можем даже потребовать, чтобы $f_1 \mid f_2 \mid \dots \mid f_m$.

Умножение на t будет действовать по координатам.

Для каждого слагаемого мы умеем выписывать матрицу оператора A в подходящем базисе. Матрица A тогда выглядит на всём пространстве как цепочка фробениусовых клеток, расставленных по порядку по диагонали.

Зададимся теперь вопросом: чему же в таком случае равен минимальный многочлен? Ответ таков:

$$A = f_m(t),$$

причём принципиально условие цепочки делений.

Как считать инвариантные факторы (то есть, $f_1(t), \dots, f_n(t)$)? Рассмотрим V и $F[t]$. e_1, \dots, e_n - базис V как векторное пространство над F , а тем более, это система образующих V как $F[t]$ -модуля. Какими соотношениями обладает этот набор? $t \cdot e_i = Ae_i$ - линейная комбинация e_1, \dots, e_n . Это соотношение между e_i с коэффициентами из $f(t)$, получаем $(t \cdot I - A)e_i = 0$.

Мы имеем n образующих и n таких последних соотношений. Рассмотрим матрицу $(t \cdot I - A)$, она имеет размер $n \times n$ над $F[t]$ и выглядит так:

$$\begin{pmatrix} t - a_{11} & -a_{12} & \dots & -a_{1n} \\ -a_{21} & t - a_{22} & \dots & -a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -a_{n1} & -a_{n2} & \dots & -a_{nn} \end{pmatrix}$$

Домножим её слева и справа на обратимые над $F[t]$ матрица и приведём её к диагональному виду, а на диагонали будут расставлены f_1, \dots, f_m (перед которыми $n - m$ единиц). Последний многочлен будет минимальным многочленом A .

Сравним определители этих матриц. Определитель обратимой матрицы лежит в $F[t]^* = F^*$. Идеал, порождённый в $F[t]$ определителем, не поменяется, тогда

$$(\det(t \cdot I - A)) = (f_1(t) \dots f_n(t)),$$

тогда $\det(t \cdot I - A) \in F[t]$ мы будем называть *характеристическим многочленом* матрицы A (обозначаем $\chi_A(t)$). Имеет он степень n , причём он ещё и унитарный в силу того, что максимальная степень будет содержаться в $(t - a_{11})(t - a_{22}) \dots (t - a_{nn})$.

Причём тогда мы можем получить такое равенство из того, что и характеристический многочлен, и приведение f_i унитарно:

$$\chi_a(t) = f_1(t) \cdot \dots \cdot f_n(t),$$

откуда минимальный многочлен делит характеристический многочлен, а характеристический делит минимальный в степени n .

Наборы неприводимых делителей у минимального и характеристического многочленов совпадают. В частности, наборы корней без учёта кратности совпадают.

Теорема 3. (Теорема Гамильтона-Кэли). *Минимальный многочлен делит характеристический, имеет такие же корни [и у них совпадают неприводимые делители].*

Приступим теперь к рассмотрению *нильпотентным* операторам.

Определение 2. $A : V \rightarrow V$ - *нильпотентный*, если $A^k = 0$ для некоторого k .

Нужно теперь научиться понимать, когда это выполнено. Берём $k : A^k = 0, A^{k-1} \neq 0$ (наименьшее возможное?). Минимальный многочлен у A - t^k , потому что он подходит, и никакой его делитель не подходит. Какой же характеристический многочлен у A ? Это есть t^n , где $n = \dim V$ из теоремы Гамильтона-Кэли.

Пусть $A^k = 0$ - минимальная такая степень. Рассмотрим V как $F[t]$ -модуль.

$$F[t]/(t^{k_1}) \oplus F[t]/(t^{k_2}) \oplus \dots \oplus F[t]/(t^{k_m}), \quad k_1 \leq k_2 \leq \dots \leq k_m = k,$$

а само k мы называем *степенью nilьпотентности*. Кстати, фробениусова клетка nilьпотентного оператора теперь выглядит ещё лучше, весь правый столбец теперь состоит из нулей (в подходящем базисе). В общем случае, она составлена из квадратиков такого вида. Получили мы матрицу строгонижнестреугольного вида.

Определение 3. Нижнетреугольная матрица - всё, выше главной диагонали - нули. Строгонижнетреугольная матрица - ещё и диагональ - нули.

Как найти такой базис (без формы Смита)? Запишем по индукции:

$$\begin{aligned} V[t] &= \{v \in V | tv = 0\} = \text{Ker}(A), \\ V[t^2] &= \{v \in V | t^2v = 0\} = \text{Ker}(A^2), \\ &\dots \\ V[t^{k-1}] &= \text{Ker}(A^{k-1}), \\ V[t^k] &= \text{Ker}(A^k) = V. \end{aligned}$$

Рассмотрим цепочку вложенных пространств:

$$0 < \text{Ker}(A) \leq \text{Ker}(A^2) \leq \dots \leq \text{Ker}(A^{k-1}) < V.$$

Посмотрим на образ A (то есть, $\text{Im } A$), он попадёт в $\text{Ker}(A^{k-1})$, а вот $A(\text{Ker}(A^{k-2})) \leq \text{Ker}(A^{k-2})$.

Осталось найти тот самый базис, в котором матрица A имеет нужный вид. Рассмотрим фактор-пространство $V/\text{Ker}(A^{k-1})$, и выберем в нём базис. Это даёт нам относительный базис V относительно $\text{Ker}(A^{k-1})$ (скажем, это e_1, \dots, e_s). Тогда что с ними происходит: $e_1.Ae_1, \dots, A^{k-1}e_1$, причём получается, что все они не равны нулю, так как они не лежат в классе нуля.

Рассмотрим $\langle e_1.Ae_1, \dots, A^{k-1}e_1 \rangle$ - A переводит его в себя. Рассмотрим матрицу A в данном базисе, это как раз будет фробениусова клетка размера k . Так сделаем для каждого элемента базиса и получим s фробениусовых клеток размера k , где s также было размерностью отфакторизованного пространства, тогда $s = \dim V - \dim \text{Ker}(A^{k-1})$.

Теперь рассмотрим $\text{Ker}(A^{k-1})/(\text{Ker } A^{k-2} + \text{Im } A)$ - подпространство, порождённое $\text{Ker } A^{k-2}$ и $\text{Im } A$. Возьмём относительный базис $e_{1,1}, \dots, e_{s_1,1}$, опять перейдём к $\langle e_{1,1}.Ae_{1,1}, \dots, A^{k-1}e_{1,1} \rangle$ - тут A имеет матрицу в виде фробениусовой клетки размера $k-1$ (если фробениусовых клеток такого размера нет, это пространство равно нулю). s_1 - количество таких клеток.

И, наконец, клетки размера $k-i$: $\text{Ker}(A^{k-i})/(\text{Ker}(A^{k-i-1}) + \text{Im } A^i)$, рассмотрим тут базис и сделаем аналогичные операции.

3 Лекция 32.

Примечание 1. В предыдущей лекции была допущена небольшая ошибка, в месте, где записано $\text{Ker } A^i/(\text{Ker } A^{i-1} + \text{Im } A^{n-i})$, нужно записать $\text{Ker } A^i/(\text{Ker } A^{i-1} + (\text{Im } A \cap \text{Ker } A^i))$.

Допустим, у нас есть два разных поля: пусть раньше мы рассуждали над полем K , а сейчас есть ещё $L \geq K$. Над K было векторное пространство V с базисом e_1, \dots, e_n . Мы можем рассмотреть такое же пространство над L , размерности тоже n . Рассмотрим V_L - пространство, натянутое на e_1, \dots, e_n над L , то есть, все линейные комбинации вида $\{\alpha_1 e_1 + \dots + \alpha_n e_n\}$. То есть, $\dim V = \dim V_L = n$. Тогда понятно, если у нас есть оператор $A: V \rightarrow V$, то мы можем его продолжить до оператора $A_L: V_L \rightarrow V_L$.

Представить себе это можно по-разному. Представим себе матрицу изначального оператора в этом базисе, это какая-то матрица $M_n(K) \subseteq M_n(L)$ - можем "расширить", и получим, что первое - подкольцо второго. И тогда можно написать оператор с точно такой же матрицей на L . Можно также сказать, что мы рассматриваем $A(\alpha_1 e_1 + \dots + \alpha_n e_n)$, тогда раскроем

по линейности $\alpha_1 A(e_1) + \dots + \alpha_n A(e_n)$, и посчитаем необходимые элементы внутри первого кольца.

Что же меняется при переходе от одного поля к другому? У нас есть инвариантные факторы, например, если у нас есть оператор A , то для него есть многочлены $f_1, \dots, f_m \in K[t]$ (последний - минимальный). Тогда для A_L они также инвариантны, причём даже минимальный многочлен такой же. Давайте вспомним, как они строятся в терминах оператора A .

Пусть у нас имеется матрица a (перехода A), рассмотрим матрицу $a - t \cdot I$, тогда инвариантные факторы - $\frac{\text{НОД}(\text{все миноры порядка } i-1)}{\text{НОД}(\text{все миноры порядка } i)}$. А наибольший общий делитель не зависит от того, в каком поле мы его рассматривали. Значит, инвариантные факторы не изменятся.

Мы знаем, что в каком-то базисе матрицу A можно привести к фробениусовой форме (на диагонали - квадратики, последняя клетка - соответствующая f_m).

Определение 4. $\text{End}(V) = \{A : V \rightarrow V\}$ - множество всех линейных операторов (эндоморфизмы V). Кстати, это кольцо (поточечное сложение и композиция), которое изоморфно $M_n(K)$, посредством выбора базиса.

Пусть c - матрица перехода при изменении базиса и A - оператор с матрицей a , тогда в новом базисе у него будет матрица $c^{-1}ac$ - сопряжённая к a матрица.

Определение 5. A, B - сопряжённые, если существует C - обратимый $B = C^{-1}AC$.

Сформулируем такую теорему, которую мы уже по сути доказали:

Теорема 4. A, B сопряжены тогда и только тогда, когда у них одинаковые инвариантные факторы.

Доказательство. Найдём базис, в котором матрица A записывается в фробениусовой нормальной форме. Существует какой-то другой базис, в котором матрица B записывается точно также. Тогда нужно взять просто матрицу, которая переведёт один базис в другой. В обратную сторону - если A известно в какой фробениусовой форме, то легко определить, что f_j - инвариантные факторы. \square

Следствие 2. A, B сопряжены тогда и только тогда, когда A_L, B_L сопряжены. Аналогично можно записать и для матриц из изоморфности колец.

Приведём другое доказательство второго пункта в случае бесконечного K . Мы хотим найти такую обратимую матрицу, что $ac = cb$. Пусть c - матрица с неизвестными коэффициентами. Тогда у нас имеется система однородных линейных уравнений на $x_{i,j}$, где $c = (x_{i,j})$. Она имеет нетривиальное решение над L , причём набор решений образует подпространство L^{n^2} размерности K . Тогда над базовым полем K размерность подпространства будет точно такая же, поскольку метод Гаусса не зависит от поля, над которым мы работаем, поэтому он выдаст одинаковые ответы для K и для L .

Возьмём базис в этом подпространстве: c_1, \dots, c_k . Рассмотрим всевозможные комбинации $\{\lambda_1 c_1 + \dots + \lambda_k c_k\}$, и будем искать такую линейную комбинацию, определитель которой не равен нулю. Мы знаем, что над L такие существуют, потому что над L у нас есть решение. Но определитель - суть многочлен от λ_i , причём ненулевой, поскольку над L можно найти такие λ_i , значение при которых не нуль. А поскольку поле K бесконечное, то можно такие коэффициенты найти и над K (индукция по k). Доказательство завершили.

Рассмотрим теперь за место L алгебраическое замыкание K , $K \leq \bar{K}$. Мы уже знаем, что есть фробениусова нормальная форма, но она не очень удобна. Рассмотрим оператор

$A_{\overline{K}}$. Применим для кольца $\overline{K}[t]$ теорему о строении модулей над кольцами главных идеалов, но сначала применим примарное разложение. То есть, возьмём какой-то неприводимый многочлен над алгебраически замкнутым полем, он линейный $(t - \lambda)$. И начинаем теперь образовывать блоки. У нас есть $V_{\overline{K}}[t - \lambda] = \{v : (t - \lambda)v = 0\} = \{v : Av = \lambda V\}$ - собственное подпространство, соответствующее собственному числу λ . $v \neq 0$ из этого множества - собственные векторы, соответствующие собственному числу λ .

Нас интересуют в качестве λ - корни минимального многочлена (корни характеристического) (чтобы мы получали ненулевые множества), но можно и проще, преобразуем к $(A - \lambda I)v = 0$, но это раносильно тому, что $\det(A - \lambda I) = 0$, что и равносильно первому. Далее мы смотрим на степени $V_{\overline{K}}[(t - \lambda)^2] = \{v : (t - \lambda)^2 v = 0\}$, и так далее, а затем берём объединение $V_{\lambda} = \bigcup_{i \geq 1} V_{\overline{K}}[(t - \lambda)^i]$, это - корневое подпространство, отвечающее собственному числу λ . Не стоит путать это с собственным подпространством (по сути, первый и последний член цепи).

Из общей теории мы теперь знаем, что $V_{\overline{K}} = \bigoplus V_{\lambda}$, где суммируем по λ - собственным числам. Мы получили корневое разложение. Посмотрим теперь, что происходит на каком-то корневом подпространстве. Ограничим $A|_{V_{\lambda}}$, тогда минимальный многочлен этого ограничения - $(t - \lambda)^k$. А если рассмотреть оператор $A - \lambda I$, то его минимальный многочлен будет t^k , то есть, ограничение такой вещи нильпотентное, то есть, матрица будет состоять из квадратиков по диагонали, на диагонали которых нули, а под ними - диагональ из единиц. А вот если мы вернёмся к изначальному сужению, то мы получим матрицу, состоящую из *жордановых блоков*, это то же самое, что и предыдущая матрица, только на главной диагонали везде λ .

Сама матрица A тогда будет состоять из кучи таких блоков для всех λ по диагонали, и целиком такое представление A будет называться *жордановой нормальной формой*. Таким образом, для любого оператора существует базис, в котором матрица выглядит в такой форме.

Рассмотрим такой важный частный случай. Пусть имеется характеристический многочлен $\chi_A(t)$ (по сути, $\det(\lambda I - A)$), и степень его тогда есть размерность пространства (n). Предположим, что он раскладывается в произведение линейных $(t - \lambda_1) \dots (t - \lambda_n)$ (это какое-то условие на характеристический многочлен ($\text{НОД}(\chi_A(t), \chi'_A(t)) = 1$)). Но всё же, если они все различны, то жорданова форма просто диагональная, так как на диагонали под ними просто ничего не поместится, квадратики единичные. В каком же базисе матрица имеет такой вид? Для того, чтобы это понять, достаточно решить $Av_i = \lambda_i v_i$, $v_i \neq 0$. Такой базис, который мы найдём, *диагонализует* матрицу. Пока что всё это происходило над алгебраическим замыканием.

Перейдём к случаю $K = \mathbb{R}$, $\overline{K} = \mathbb{C}$ и придумаем вещественную жорданову форму (именно её, а не фробениусову, потому что она удобнее). Для этого, нам нужно разобрать немного подробнее процедуру перехода из поля в замыкание с одним и тем же базисом ($V \rightarrow V_{\mathbb{C}}$). Как нам тогда восстановить $V_{\mathbb{C}}$? Вообще, никак, но если ввести некую дополнительную структуру это можно сделать. Хочется ввести на $V_{\mathbb{C}}$ какую-то инволюцию - аналог комплексного сопряжения. Если у нас уже есть базис, то пусть $\overline{z_1 e_1 + \dots + z_n e_n} = \overline{z_1} e_1 + \dots + \overline{z_n} e_n$, это операция из $V_{\mathbb{C}}$ в $V_{\mathbb{C}}$, которая не будет линейной, а будет *полулинейной*, то есть, выполнено $\overline{\overline{v}} = v$, а не $\overline{\overline{v}} = \overline{v}$. С суммой же всё нормально. Получили мы *полулинейный оператор*, который является инволюцией.

А само V тогда восстанавливается: $V = \{v \in V_{\mathbb{C}} : \overline{v} = v\}$. Это уже пространство над \mathbb{R} такой же размерности.

Итого, вещественные векторные пространства по сути есть комплексные векторные пространства такой же размерности с полулинейной инволюцией. Придумаем теперь вещественный аналог жордановой формы. Пусть есть V , $A : V \rightarrow V$, тогда $V_{\mathbb{C}}$ назовём *комплекс-*

сификацией V , а наоборот - *овеществлением*. Также мы можем рассмотреть и комплексификацию $A_{\mathbb{C}} : V_{\mathbb{C}} \rightarrow V_{\mathbb{C}}$. Есть базис, в котором он представляется жордановой начальной формой. У A есть характеристический многочлен $f(t) \in \mathbb{R}[t]$, у которого есть вещественные корни α_i и мнимые λ_j вместе со своими сопряжёнными парами. Пусть λ - комплексный корень этого многочлена, тогда у нас есть корневые пространства V_{λ} и $V_{\bar{\lambda}}$, тогда их сумма устойчива относительно нашей полулинейной инволюции. Потому что, допустим, $Av = \lambda v$, тогда $\overline{Av} = \bar{\lambda} \bar{v}$, но про A мы знаем, что у его матрицы коэффициенты вещественные, поэтому $\overline{Av} = A\bar{v}$ (можно расписать умножение матрицы на столбец для наглядности).

Таким образом, если v - собственный вектор, отвечающий λ , то \bar{v} - собственный вектор, отвечающий $\bar{\lambda}$, и со степенью, конечно, то же самое: $(A - \lambda I)^i v = 0$, тогда $(A - \bar{\lambda} I)^i \bar{v} = 0 = (A - \bar{\lambda} I)^i v$. То есть, вся эта прямая сумма относительно λ и его сопряжённого, будет устойчивой относительно нашей полуинволюции. Мы знаем, что вещественное векторное пространство это то же самое, что и комплексное с полуинволюцией, тогда все пары λ_i и их сопряжённый будут объединяться в пары и давать вещественные подпространства.